



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت

دفتر سلامت خانواده و جمعیت

اداره سلامت کودکان

۱۴۰۰

مقدمه

۶	بخش اول – مهارت های مشاوره با مادر :
۷	- مهارت های گوش دادن و آموختن
۸	- مهارت های ایجاد اعتماد بنفس و حمایت مادر
۱۱	- کنترلی درک مادر و ترتیب دادن ارجاع یا پیگیری
۱۳	بخش دوم – مشاوره با مادر در مورد تغذیه با شیرمادر :
۱۳	فصل ۱ اهمیت تغذیه با شیرمادر :
۱۳	- مزایای شیرمادر
۱۸	- مضرات تغذیه مصنوعی
۱۸	- شیرمادر در سال دوم زندگی
۲۰	فصل ۲ روش های مراقبت بهداشتی :
۲۰	- ده اقدام بیمارستانهای دوستدار کودک
۲۱	- آماده نمودن مادر در دوران بارداری برای شیردهی
۲۲	- برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد و شروع شیرمادر در ساعت اول تولد
۲۲	- خطرات تغذیه با مواد دیگر قبل از اولین نوبت شیرمادر، تداوم تغذیه انحصاری با شیرمادر
۲۳	- مزایای هم اتاقی مادر و نوزاد
۲۳	- مزایای تغذیه بر حسب تقاضای شیرخوار
۲۵	فصل ۳ چگونگی تولید و ترشح و انتقال شیر از پستان به شیرخوار
۲۵	- آناتومی پستان
۲۹	- کنترل تولید شیر در پستان
۳۱	فصل ۴ وضعیت صحیح شیردهی :
۳۱	- وضعیت در آغوش گرفتن شیرخوار برای شیردهی
۳۱	- وضعیت نگه داشتن پستان هنگام شیر دادن
۳۲	- چگونگی عرضه پستان به شیرخوار
۳۲	- وضعیت پستان گرفتن شیرخوار
۳۳	- وضعیت مکیدن شیرخوار
۳۴	- وضعیت های مختلف شیردهی
۳۶	فصل ۵ ارزیابی یک وعده تغذیه با شیرمادر و گرفتن شرح حال
۳۶	- چگونگی ارزیابی تغذیه با شیرمادر
۳۸	- گرفتن شرح حال تغیه با شیرمادر
۳۹	- چگونگی کمک به مادر برای در آغوش گرفتن و شیردادن
۴۰	فصل ۶ حفظ و تدام شیردهی
۴۰	- نکات مهم برای مشاوره با مادر در مورد حفظ و تداوم شیردهی
۴۱	- مادران با شرایط خاص نیازمند مراقبت ویژه
۴۶	- رفتارهای تغذیه ای شیرخوار

۴۶	- نحوه از شیرگیری کودک در پایان ۲ سالگی یا بیشتر
۴۹	فصل ۷ وضعیت های پستان و مشکلات شایع پستانی
۴۹	- اشکال مختلف پستانی
۵۰	- نوک پستانهای صاف و فرو رفته
۵۱	- پستان های پر و محتقن
۵۳	- ماستیت و انسداد مجرا
۵۶	- آبسه پستان
۵۶	- شقاق نوک پستان
۵۷	- عفونت کاندیدایی (برفک)
۵۷	- درمان مشکلات پستانی مادران HIV مثبت
۵۹	فصل ۸ مشکلات شایع شیردهی
۵۹	- ناکافی بودن شیرمادر
۶۱	- گریه کردن شیرخوار
۶۳	- امتناع شیرخوار از گرفتن پستان
۶۸	فصل ۹ تغذیه با شیرمادر در نوزادان با شرایط خاص
۶۸	- نوزادان کم وزن هنگام تولد (LBW)
۷۰	- تغذیه نوزاد مبتلا به زردی
۷۱	- تغذیه شیرخواران دو یا چندقلو با شیرمادر
۷۵	- تغذیه نوزادان با شکاف کام و لب
۷۸	فصل ۱۰ سلامت، تغذیه ، بیماری مادر و مصرف دارو
۷۸	- نیازهای تغذیه ای مادران شیرده
۷۹	- تدابیر شیردهی هنگام بیماری مادر
۸۰	- بیماری مادر و شیردهی
۸۱	- دارو ها و شیردهی
۸۳	- روش پیشگیری از بارداری متناسب با شیردهی
۸۴	فصل ۱۱ دوشیدن شیرمادر
۸۴	- تحریک رفلکس اکسی توسین
۸۶	- چگونگی دوشیدن شیر با دست
۸۷	- دفعات دوشیدن
۸۸	- نحوه و مدت ذخیره کردن شیردوشیده شده
۸۹	- دوشیدن با استفاده از بطری آب گرم
۸۹	- شیر دوش برقی / پمپ دستی
۹۱	فصل ۱۲ تغذیه با فنجان
۹۱	- مزایای تغذیه با فنجان
۹۱	- چگونگی تغذیه با فنجان
۹۲	- مقدار شیری مورد نیاز شیرخوار
۹۳	فصل ۱۳ تغذیه جایگزین شیرخوار

۹۳	- مضرات شیرمصنوعی تجاری
۹۴	- معایب شیر دام برای تغذیه شیرخوار
۹۵	- نکات مورد توجه در بسته بندی شیرمصنوعی
۹۵	- مقدار شیرمصنوعی مورد نیاز
۹۶	- چگونگی آماده کردن شیرمصنوعی
۹۸	فصل ۱۴ باورهای غلط در مورد تغذیه با شیرمادر
۹۸	- باورهای غلط و واقعیت های امر درباره شیرمادر
۱۰۵	<u>بخش سوم - تغذیه تکمیلی شیرخواران :</u>
۱۰۵	فصل ۱۵ اهمیت تغذیه تکمیلی
۱۰۵	- حفظ تداوم تغذیه با شیر مادر
۱۰۵	- تعریف تغذیه تکمیلی
۱۰۶	- کمبود انرژی
۱۰۸	فصل ۱۶ غذاهایی که کمبود انرژی را جبران می کنند
۱۰۹	- چربی ها و روغن ها
۱۱۰	فصل ۱۷ نقش مواد مغذی در رشد و تکامل کودکان
۱۱۳	- مایعات مورد نیاز کودک خردسال
۱۱۴	فصل ۱۸ مقدار، تنوع و دفعات غذا
۱۱۴	- اهمیت استفاده از غذاهای متنوع
۱۱۵	- مقدار غذاهای کمکی مورد نیاز شیرخوار
۱۱۹	فصل ۱۹ روش های تغذیه کودک
۱۱۹	فصل ۲۰ آماده کردن بهداشتی غذا
۱۲۲	فصل ۲۱ نحوه شروع و ادامه غذای کمکی
۱۲۵	<u>بخش چهارم - تغذیه کودک ۱ تا ۵ سال</u>
۱۲۵	فصل ۲۲ تغذیه کودک ۱ تا ۲ سال
۱۲۷	فصل ۲۳ تغذیه کودک در سنین ۲ تا ۵ سال
۱۳۱	فصل ۲۴ تغذیه در بیماری های شایع
۱۳۶	<u>بخش پنجم - سلامت دهان و دندان</u>
۱۵۰	<u>بخش ششم - پیشگیری از حوادث و سوانح</u>
۱۵۴	<u>بخش هفتم - توصیه هایی برای مراقبت از تکامل کودک</u>
۱۵۹	- رابطه متقابل کودک و والدین
۱۶۷	- توانمندی های تکاملی قابل انتظار در کودکان ۶ هفته تا ۵ ساله
۱۷۰	<u>بخش هشتم - ابزارهای کمکی برای مشاوره با مادر</u>

سوء تغذیه بطور مستقیم یا غیر مستقیم عامل مرگ ۵۰٪ از ۱۰/۶ میلیون موارد مرگ سالانه کودکان زیر ۵ سال جهان می باشد. بیش از دو سوم این مرگ ها که اغلب همراه با روش های نامناسب تغذیه ای است ، طی یک سال اول زندگی اتفاق می افتند.

تغذیه با شیر مادر روش بی نظیر تامین غذای ایده آل برای رشد و نمو سالم شیرخواران می باشد. مطابق توصیه های جهانی بهداشت عمومی ، شیرخواران در ۶ ماه اول عمر به منظور تامین رشد و تکامل و سلامتی مطلوب باید تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته باشند. مادران به کمک های عملی افراد ماهری مثل شما نیاز دارند تا آنان را برای ایجاد اعتماد به نفس و ارتقاء روش های تغذیه و پیشگیری یا حل مشکلات تغذیه با شیر مادر کمک کرده و در تغذیه انحصاری شیرخواران شان با شیر مادر موفق گردانید. تغذیه انحصاری با شیر مادر یعنی به شیرخوار فقط شیر مادر داده شود و او هیچ نوع مایعات یا غذای جامد دیگری (بجز قطره یا شربت مکمل های ویتامین ها و مواد معدنی و در صورت لزوم دارو) دریافت نکند.

مراقبین سلامت می توانند به مادران و مراقبین کودک کمک کنند تا روش مناسب تغذیه کودک را انتخاب کرده و آنان را با موفقیت تغذیه نمایند. بسیار مهم است که مادران را از دوران بارداری برای تغذیه با شیرمادر آماده کنید و این کمک را در تمام طول سال اول و دوم زندگی کودک ارائه کنید. شما می توانید توصیه های خوبی به مادران درباره تغذیه کودکان شان اعم از اینکه سالم و یا بیمار باشند ، ارائه دهید.

همچنین باید برای رشد مطلوب، سلامت بینایی، شنوایی، دهان و دندان کودک و در مورد عوامل محیطی مؤثر بر سلامت کودک از جمله: (دخانیات (دود دست دوم)، تماس با آفتاب، آلودگی هوا، تلویزیون، موبایل، تبلت) با مادر بخوبی مشاوره کنید و روش های پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان و راه کارهای عملی برای ارتقای تکامل کودکان ارائه دهید.

ممکن است احساس کنید که خود ، آموزش کافی برای ارائه این نوع کمک ها ندیده اید . در گذشته ، برنامه تحصیلی پزشکان، پرستاران و یا ماماها بندرت مهارت های حمایتی و مشاوره ای را شامل می شد . هدف این راهنما آموزش مهارت های اساسی مشاوره است به نحوی که بتوانید مادران را به گونه ای که نیاز دارند برای مواردی که در بالا ذکر شد مورد حمایت و تشویق قرار دهید.

بخش اول – مهارت‌های مشاوره با مادر

مشاوره روشی برای ارتباط با مردم است تا احساس آنها را درک کنید و به آنها کمک کنید که در موقعیت های خاص خود بهترین تصمیم را بگیرند. در این بخش ، شما با مادران گفتگو می کنید و با نحوه احساس آنها آشنا می شوید .

هنگامی که شما با بیماران یا سایر مراجعین در موقعیت های دیگر صحبت می کنید نیز بکارگیری مهارت های مشاوره مفید است . حتی در ارتباط با خانواده ، دوستان یا همکاران تان نیز کارگشا خواهد بود .اگر برخی از این فنون را با آن ها تمرین کنید، به نتیجه شگفت انگیز و مفید آن پی می برید.

اولین بخش از فصل مهارت های مشاوره، در باره مهارت "گوش دادن و آموختن" است. مادر بویژه اگر خجالتی باشد شاید نتواند به راحتی در باره احساس خود با شما یا هر فرد غریبه دیگری صحبت کند. برای این که مادر ، علاقمندی شما را نسبت به رفع مشکل خود حس کند به مهارت گوش دادن نیاز دارید . به این ترتیب مادر تشویق می شود تا بیشتر با شما صحبت کند و کمتر خاموش بنشیند. بسیار مهم است که هنگام مشاوره با مادر از مهارت های ارتباطی زیر استفاده کنید:

سوال کرده و گوش کنید:

به دقت گوش کنید تا آنچه را که مادر هم اکنون برای کودکش انجام می دهد، دریابید. سپس خواهید دانست که مادر چه کارهایی را درست انجام داده و چه اقداماتی باید تغییر داده شود.

تحسین کنید:

این احتمال وجود دارد که مادر کارهای سودمندی برای کودک انجام بدهد مثلا کودکش را با شیر خودش تغذیه کند. مادر را به خاطر انجام این اقدامات مفید تحسین نمایید. دقت کنید که این قدردانی صادقانه بوده و فقط برای اقداماتی صورت گیرد که واقعا به نفع شیرخوار بوده است.

توصیه کنید:

توصیه خود را به آنچه که در حال حاضر لازم است به مادر گفته شود محدود کنید. مطالب را به زبان ساده بیان کنید تا برای مادر قابل فهم باشد در صورت امکان از تصاویر و یا اشیاء واقعی به عنوان وسیله کمک آموزشی استفاده کنید. برای مثال مقدار مایع درون فنجان یا ظرف دیگر را برای مادر مشخص کنید.

هر کار مضرى را که مادر انجام می دهد، توصیه کنید که از انجام آن اقدام خودداری کند. هنگامی که یک اقدام زیان آور او را اصلاح می کنید دقت کنید و هوشیار باشید که مادر احساس تقصیر و یا ناشایستگی نکند. برای او توضیح دهید که چرا این اقدام ضرر دارد.

میزان درک مادر از مطالب ذکر شده را کنترل کنید:

از مادر سوالاتی بپرسید تا پی ببرید تا چه حد مطالب ذکر شده را درک کرده است و چه مواردی را باید بیشتر برایش توضیح دهید. از پرسیدن سوالات جهت دار اجتناب کنید (منظور سوالاتی است که مادر می تواند جواب درست را از نوع سوال حدس بزند) و سوالاتی نپرسید که جواب آنها با کلمات ساده مثل بله یا خیر بیان می شود. نمونه هایی از سوالات کنترلی مناسب عبارتند از : چه غذاهایی به کودکتان خواهید داد؟ چند بار به او خواهید داد؟ چنانچه پاسخ مادر واضح نیست، سوالات کنترلی

دیگری پرسید. مادر را به خاطر آنچه درست متوجه شده است تحسین کنید و در صورت نیاز توصیه های خود را شفاف تر کنید.

• مهارت گوش دادن و آموختن

برای گوش دادن فعال و آموزش به مادر لازم است مهارت‌های ۶گانه زیر را کسب کنید:

مهارت ۱: ارتباط غیر کلامی مفید و مناسب با مخاطب خود برقرار کنید.

ارتباط غیر کلامی، به معنی نشان دادن نگرش و تمایل خود از طریق تغییر حالت و وضعیت چهره و هر چیز دیگری غیر از صحبت کردن می باشد. ارتباط غیر کلامی صحیح باعث می شود مادر علاقمندی شما را نسبت به رفع مشکلش احساس کند و در نتیجه با شما صحبت می کند.

مهارت ۲: سؤالات باز پرسید.

سؤالات باز بسیار مفید هستند. مادر هنگام پاسخ دادن به این گونه سؤالات، اطلاعات بیشتری به شما می دهد. این سؤالات معمولاً با "چطور، چه چیزی، چه وقت، کجا و چرا" شروع می شوند. مثلاً: "شما کودکان را چطور تغذیه می کنید؟" سؤالات بسته معمولاً کمتر مفید واقع می شوند چون مادر، اغلب جوابی را می دهد که شما انتظار دارید و فقط بله و خیر است. این نوع سؤالات با کلمه "آیا شما" و "آیا او" شروع می شوند، مثلاً: "آیا آخرین فرزندتان را با شیر مادر تغذیه کرده اید؟" اگر پاسخ مادر مثبت باشد، هنوز نمی دانید که آیا تغذیه با شیر مادر به صورت انحصاری بوده یا همراه تغذیه با بطری بوده است.

برای شروع گفتگو معمولاً مطرح کردن سؤالات باز و کلی مفیدتر هستند؛ مثلاً: "آیا می توانید راجع به کودک خود صحبت کنید؟"

برای ادامه گفتگو بهتر است سؤالات باز اختصاصی تری مطرح کنید. مثلاً: "شیرخوار شما چند ماهه است؟"

گاهی برای حصول اطمینان از واقعیتی پرسیدن سؤالات بسته مفید است. مثلاً: "غذا یا مایعات دیگری هم به کودک می دهید؟ اگر مادر پاسخ داد: بله، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با پرسیدن یک سؤال باز ادامه دهید. مثلاً: "تصمیم دارید چه کار کنید؟"

مهارت ۳: از عکس العمل ها و حرکاتی که علاقمندی شما را نشان می دهد استفاده کنید.

راه دیگر برای تشویق مادر به صحبت کردن این است که برای تصدیق گفته های او لبخند بزنید و سرتان را تکان دهید و نیز پاسخ های ساده مثل "خوب" و "آها" بدهید. این واکنش ها علاقمندی شما را به مادر نشان می دهد.

مهارت ۴: گفته های مادر را تکرار و بازگو نمایید.

بازگو کردن یعنی تکرار صحبت های مادر برای این که نشان دهید مطالب او را گوش کرده اید و او را تشویق کنید که هر چه بیشتر صحبت کند. سعی کنید جملات را با اندکی تغییر بازگو کنید. مثلاً اگر مادر می گوید: "کودکم از خوردن هر چیزی طفره می رود؛ نمی دانم چه چیزی به او بدهم؟" شما می توانید بگویید: "یعنی کودک تان از خوردن هر چیزی امتناع می ورزد؟"

مهارت ۵: با همدلی نشان دهید احساسات مادر را درک می کنید .

همدلی یعنی نشان دهید احساسات مخاطب خود را درک می کنید . مثلاً " اگر مادر می گوید : " کودکم اغلب اوقات می خواهد شیر بخورد ؛ این مسئله مرا خسته می کند . " شما می توانید بگویید " پس شما اغلب خیلی احساس خستگی می کنید . " این نشان می دهد که شما احساس خستگی او را درک کرده و با او همدلی می کنید . اگر شما در جواب مادر سؤال دیگری را مطرح کنید ، مثلاً : " چند وقت یکبار شیر می خورد ؟ یا چه چیز دیگری به او می دهید ؟ " در واقع با او همدلی نکرده اید .

مهارت ۶: از بکارگیری کلماتی که بیانگر قضاوت و انتقاد باشند اجتناب کنید .

کلماتی که نشانگر قضاوت شماسست عبارتند از : درست ، غلط ، خوب ، بد ، کافی ، صحیح .

اگر هنگام طرح سؤال از این کلمات استفاده کنید ممکن است مادر فکر کند که اشتباه کرده و یا در مورد کودکش دچار خطا شده است . به هر حال گاهی اوقات بهتر است از کلمات قضاوت کننده " خوب " استفاده کنید تا در مادر اعتماد به نفس ایجاد کنید .

ارتباط غیر کلامی مفید

- با مادر در یک سطح بنشینید .
- توجه نشان دهید .
- موانع را بردارید .
- وقت صرف کنید .
- کودک یا مادر را به نحو مقتضی لمس کنید .

مهارت های گوش دادن و آموختن:

- از ارتباط غیر کلامی مفید استفاده کنید .
- سؤالات باز مطرح کنید .
- از واکنش ها و حرکات برای نشان دادن علاقمندی خود استفاده کنید .
- صحبت های مادر را تکرار کنید .
- همدلی کنید : نشان دهید احساسات او را درک می کنید .
- از بکارگیری کلماتی که نشان دهنده قضاوت شماسست اجتناب ورزید .

• مهارت ایجاد اعتماد به نفس و حمایت از مادر

از دیگر مهارت های مشاوره، مهارت حمایت و ایجاد اعتماد به نفس در مادر است. مادر به راحتی اعتماد به نفس خود را از دست می دهد. در این صورت ممکن است احساس کند که کوتاهی کرده و از طرف خانواده و دوستانش نیز تحت فشار قرار گیرد. با بکارگیری این مهارت ها می توانید به مادر کمک کنید که نسبت به خود احساس خوبی پیدا کرده و اعتماد به نفس پیدا کند.

این نکته حائز اهمیت است که موجب نشویم مادر احساس کند کارش اشتباه است. مادر خیلی راحت باور می کند که در ارتباط با خودش ، نحوه شیردهی فرزندش و تغذیه او با شیر مادر مرتکب اشتباه شده و این احساس ، اعتماد به نفس او را پایین می آورد .

از اینکه به مادر بگوئید چه کاری بکند، **بپرهیزید**. این امر مهمی است. شما باید به مادر کمک کنید تا تصمیم بگیرد چه چیزی برای او و فرزندش بهتر است. این کار اعتماد به نفس او را بالا می برد.

مهارت ۱. آنچه را که مادر فکر و احساس می کند بپذیرید :

بعضی اوقات مادر تصور اشتباهی دارد که شما با آن موافق نیستید. چنانچه با او مخالفت کنید یا از او انتقاد نمایید باعث می شود که مادر احساس کند کارش اشتباه است و این امر اعتماد به نفس او را پایین می آورد. در مقابل اگر او را تایید نمایید، بعداً پیشنهاد کردن روش های متفاوت مشکل خواهد بود.

خیلی خوب است آنچه را که مادر فکر می کند ، **بپذیرید**. پذیرش عبارت است از : نشان دادن عکس العمل طبیعی ، نه موافقت و نه مخالفت. "تکرار برخی از گفته های مادر" ، "واکنش ها و اشاراتی که علاقمندی شما را نشان می دهد" ، هر دو برای نشان دادن پذیرش گفته های مادر ، همانند مهارت گوش کردن و آموختن، روش های مفیدی هستند.

گاهی مادر در باره بعضی از مسائلی که به نظر شما جدی نیستند، بسیار نگران به نظر می رسد. اگر چیزی نظیر " نگران نباش، چیز نگران کننده ای نیست " به مادر بگوئید، این احساس را در او ایجاد می کنید که کارش اشتباه بوده است و شما هم او را درک نمی کنید. در نتیجه اعتماد به نفس او پایین می آید. اما اگر نگرانی وی را بپذیرید ، او احساس می کند راهی را که برگزیده ، درست است و اعتماد به نفس او هم پایین نخواهد آمد. همدلی نیز روش مفیدی برای نشان دادن پذیرش احساس مادر می باشد.

مهارت ۲. آنچه را که مادر و کودک به درستی انجام می دهند ، شناسایی و تحسین کنید :

ما بعنوان کارکنان بهداشتی و درمانی آموزش دیده ایم که مشکلات را بیابیم. ما فقط به آنچه که فکر می کنیم مردم اشتباه انجام می دهند ، توجه می کنیم و سعی در اصلاح آنها داریم. اما به عنوان مشاور باید یاد بگیریم به آنچه که مادر و کودک به درستی انجام می دهند، توجه کنیم و آنها را شناسایی کنیم. سپس آنها را تحسین کرده و یا رفتاری مبنی بر تایید کارهای درست آنها نشان دهیم.

تمجید و تحسین رفتارهای درست مادر مزایای زیر را دارد :

- اعتماد به نفس در مادر ایجاد می کند.
- او را تشویق به ادامه رفتارهای صحیح می کند.
- پذیرش پیشنهاد های بعدی را برای او آسان تر می سازد.

مهارت ۳. مادر را بطور عملی کمک کنید :

گاهی اوقات کمک عملی بهتر از هر نوع سخن گفتن است. برای مثال:

- هنگامی که مادر احساس خستگی یا ناراحتی می کند و یا تمیز نیست.
- هنگامی که او گرسنه یا تشنه است.
- هنگامی که از قبل اطلاعات زیادی دارد.
- هنگامی که مشکل عملی مشخصی دارد.

کمک های عملی را می توان به طرق مختلف ارائه کرد. از جمله :

- به او کمک کنید نظافت کرده و احساس راحتی کند.
 - چیزی برای خوردن یا آشامیدن به وی بدهید.
 - تا زمانی که نظافت کند ، دستشویی برود و احساس راحتی کند، کودکش را نگه دارید.
- کمک عملی شامل این موارد نیز می شود: به جای ارائه لیست بلند بالایی از دستورات غذایی ، چگویی تهیه غذا را به مادر نشان دهید. یا مادر را برای شیردهی، مثلا قرار گرفتن شیرخوار در وضعیت صحیح ، پستان گرفتن شیرخوار ، دوشیدن شیر ، برطرف کردن احتقان پستان ، آماده کردن تغذیه تکمیلی عملا کمک کنید.

اگر مادری بگوید : شیر ندارم، پستان هایش خالی و وضعیتش برای نشستن و شیر دادن خیلی دردناک است.

کدام پاسخ مناسب تر است؟

- "شما باید بگذارید شیرخوار پستان تان را بمکد تا شیر جریان یابد ."
- "اجازه بدهید کمک تان کنم تا راحت تر شوید و یک نوشیدنی هم برایتان می آورم ."

مهارت ۴. ۱.۴ اطلاعات کم، مربوط و مناسب به مادر بدهید :

اطلاعات مربوط ، اطلاعاتی هستند که مادر در حال حاضر فقط به آن ها نیاز دارد :

- هنگامی که به مادر اطلاعاتی می دهید نکات زیر را در نظر داشته باشید:
- به مادر کارهایی را بگویید که امروز می تواند انجام دهد نه هفته های بعد.
 - اغلب توضیح در مورد دلیل یک مشکل، مناسب ترین اطلاعاتی است که به مادر کمک می کند که بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
 - هر بار ، خصوصا " اگر مادر خسته است و قبلا" نیز آموزش زیادی دیده است فقط یک یا دو جزء اطلاعات به وی بدهید.
 - با پذیرش گفته های مادر و تحسین او و کودکش بخاطر آنچه که درست انجام داده اند، در مادر اعتماد به نفس ایجاد کنید. ضرورتی ندارد که بلا فاصله اطلاعات جدید در اختیار او قرار داده و یا تصور اشتباه او را اصلاح نمایید.
 - اطلاعات را با نگرش مثبت به او بدهید تا جنبه انتقادی نداشته باشد. این نکته بویژه هنگامی اهمیت دارد که می خواهید تصور اشتباهی را تصحیح کنید.

مهارت ۵. از زبان ساده و محاوره ای استفاده کنید :

برای توضیح مطالب به مادر از عبارات و واژه های ساده و رایج استفاده کنید. یادتان باشد که بیشتر مردم اصطلاحات فنی مورد استفاده کارکنان بهداشتی درمانی را متوجه نمی شوند.

مهارت ۶. یکی دو پیشنهاد به مادر بدهید ، دستور ندهید :

مراقب باشید که برای انجام کار به مادر دستور ندهید. این امر به ایجاد اعتماد به نفس او کمک نمی کند. بلکه هنگام مشاوره ، به او پیشنهاد کنید که روش مختلفی را نیز می تواند بکار گیرد. به این ترتیب، در صورت تمایل خود می تواند تصمیم به انجام آن بگیرد. این کار احساسات او را کنترل و به اعتماد به نفس او کمک می کند.

مهارت های حمایت و ایجاد اعتماد به نفس

- آنچه که مادر فکر و احساس می کند را بپذیرید.
- آن چه که مادر و کودک به درستی انجام می دهند را شناسایی کرده و تحسین کنید.
- کمک های عملی به مادر بدهید.
- اطلاعات کم و مناسب به مادر بدهید.
- زبان ساده و محاوره ای بکار ببرید.
- یک یا دو پیشنهاد به مادر بدهید ، دستور ندهید.

• کنترل درک مادر و ترتیب دادن ارجاع یا پیگیری

کنترل درک مطالب

اغلب لازم است که شما کنترل کنید آیا مادر روش یا اقدامی را که قرار است انجام دهد ، درک کرده است. برای این که بدانید او نیاز به توضیحات بیشتری دارد یا خیر ، سؤالات باز مطرح کنید . از پرسیدن سؤالات بسته بپرهیزید چون پاسخ این سؤالات بله یا خیر خواهد بود و نمی توانند برای شما مشخص کنند که آیا مخاطب واقعا مطلب را درک کرده است یا خیر . کنترل درک مطالب هم چنین به شما کمک می کند که صحبت های خود را خلاصه کنید .

• ترتیب دادن ارجاع یا پیگیری

تمامی کودکان برای کنترل تغذیه و سلامت عمومی شان باید به طور منظم مراقبت شوند . اگر کودک مشکلی دارد که شما نمی توانید آن را حل کنید ، لازم است او را برای مراقبت تخصصی تر ارجاع دهید. به عنوان مثال اگر کودک مشکلی در ارتباط با تغذیه دارد ، پیگیری او بویژه اهمیت دارد، یعنی از مادر بخواهید طی ۵ روز آینده کودک را برای پیگیری بیاورد. در مراقبت پیگیری شما کنترل می کنید که کودک چه غذاهائی می خورد و چگونه این غذاها به او داده می شود، وزن کودک و تکامل عمومی او را کنترل کرده و وی را مراقبت می نمائید. مراقبت های پیگیری همچنین فرصتی برای تشویق و تقویت روش های مناسب و بنابراین ایجاد اعتماد به نفس در مادر ، و ارائه اطلاعات مناسب و بحث در مورد پیشنهادات مورد نیاز را فراهم می کند. به ویژه این نکته برای کودکانی که مشکل خاصی دارند مثل

کودکانی که مادر مبتلا به HIV دارند ، حائز اهمیت است که توسط کارکنان بهداشتی به طور منظم پیگیری شوند . این کودکان در معرض خطر ویژه هستند . بعلاوه پیگیری این نکته نیز مهم است که مادر چگونه با سلامتی و مشکلات خودش کنار می آید.

بخش دوم – مشاوره در مورد تغذیه با شیر مادر

فصل ۱

اهمیت تغذیه با شیر مادر:


تغذیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر در ۶ ماه اول عمر توصیه می شود. برای این که بتوانید به مادرانی که در مورد ارزش شیر مادر تردید دارند کمک کرده و آنان را حمایت کنید، باید بدانید چرا تغذیه با شیر مادر اهمیت دارد. هم چنین لازم است تفاوت های بین شیر مادر و شیر مصنوعی را بدانید.

مزایای شیر مادر:

تصویر زیر مزایای عمده تغذیه با شیر مادر را به طور خلاصه بیان می کند. فکر کردن در مورد مزایای شیر مادر (سمت راست) و مزایای تغذیه با شیر مادر (سمت چپ) مفید خواهد بود.

مزایای تغذیه با شیر مادر:		مزایای شیر مادر:
<ul style="list-style-type: none">• به پیوند عاطفی مادر و کودک و تکامل وی کمک می کند .• حاملگی مجدد را به تاخیر می اندازد.• از سلامت مادر محافظت می کند .• بهترین الگوی رشد و تکامل را برای کودکان فراهم می کند.• سبب افزایش ضریب هوشی کودکان می شود.	بسیار ارزان تر از شیر مصنوعی است	<ul style="list-style-type: none">• مواد مغذی کامل را داراست.• سهل الهضم بوده و با کفایت به مصرف می رسد .• شیرخوار را در مقابل ابتلا به عفونت ها، بیماریهای دوران کودکی و پس از آن محافظت می کند .

مواد مغذی شیر مادر و شیرهای دام



شیرهای مصنوعی (فرمولا) از مواد مختلفی شامل شیرهای دام ، سویا و روغن های نباتی ساخته می شوند. گر چه برای این که این محصولات هر چه بیشتر شبیه شیر مادر شوند تلاش زیادی صورت گرفته است ، اما هنوز فاصله زیادی وجود دارد تا بتوان از آن ها به عنوان یک غذای کامل برای شیرخواران استفاده کرد .


برای اینکه ترکیب شیر مصنوعی را درک کنیم، لازم است تفاوت های بین شیرهای دام و شیر مادر و هم چنین چگونگی اصلاح شیرهای دام برای تبدیل شدن به شیر مصنوعی (فرمولا) را بدانیم.

این نمودار مواد مغذی شیر مادر را با شیر تازه گاو و بز مقایسه می کند. همه شیرها حاوی چربی برای تامین انرژی ، پروتئین برای رشد و قند شیر بنام لاکتوز برای تامین انرژی می باشند .

شیرهای دام پروتئین بیشتری نسبت به شیر مادر دارند و برای کلیه های تکامل نیافته شیر خوار دفع این مقادیر زیاد پروتئین بسیار دشوار است.

شیر مادر هم چنین حاوی اسیدهای چرب ضروری مورد نیاز برای رشد مغز و چشم و سلامت عروق خونی می باشد . این اسید های چرب در شیرهای دام موجود نبوده ولی ممکن است به شیر مصنوعی اضافه شده باشند .

کیفیت پروتئین ها در شیرهای مختلف :



کیفیت پروتئین همانند کمیت آن در شیرهای مختلف متفاوت است . درست است که مقدار پروتئین شیر گاو برای تولید شیر مصنوعی قابل اصلاح است اما کیفیت پروتئین ها غیر قابل تغییر اند.

نمودار فوق نشان می دهد که بیشتر پروتئین موجود در شیر گاو ، کازئین است که در معده شیرخوار به صورت لایه ای ضخیم و غیر قابل هضم دلمه می شود.

پروتئین شیر انسانی بیشتر از نوع WHEY می باشد که حاوی پروتئین های ضد عفونت است و شیرخوار را در مقابل عفونت ها محافظت می کند.

کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه می شوند، ممکن است نسبت به پروتئین های شیر گاو عدم تحمل پیدا کنند و حتی وقتی با شیرهای حاوی پروتئین های مختلف تغذیه می شوند، ممکن است اسهال ، دل درد ، بثورات جلدی و علائم دیگر پیدا کنند.

محافظت در برابر عفونت ها :

۱- مادر به عفونت آلوده شده



۲- گلبول‌های سفید در بدن مادر برای حفاظت وی آنتی بادی می‌سازند

۴- آنتی‌بادی‌های مادر مبتلا به عفونت برای حفاظت شیرخوار در شیر ترشح می‌شوند

۳- تعدادی از گلبول‌های سفید به پستان مادر می‌روند و در آنجا آنتی

شیر مادر حاوی گلبول‌های سفید و عواملی بر ضد عفونت‌ها می‌باشد که به حفاظت شیرخوار در مقابل بسیاری از عفونت‌ها کمک می‌کند. تغذیه با شیر مادر، شیرخوار را در مقابل بسیاری بیماری‌ها از جمله: بیماری‌های اسهالی و تنفسی، عفونت گوش، مننژیت و عفونت مجاری ادراری حفاظت می‌کند.

تصویر فوق نشان می‌دهد که وقتی مادر با عفونتی مواجه می‌شود (۱)، گلبول‌های سفید در بدن او فعال شده و برای حفاظت وی علیه عفونت آنتی‌بادی تشکیل می‌دهند (۲)، برخی از این گلبول‌های سفید به پستان مادر رفته و آنتی‌بادی تولید می‌کنند (۳)، آنتی‌بادی‌های مادر برای حفاظت شیرخوار به داخل شیر مادر ترشح می‌شوند (۴).

بنابراین وقتی مادر با عفونتی مواجه می‌شود نباید شیرخوار را از مادر جدا کرد، چون شیر مادر او را در مقابل عفونت محافظت می‌کند.

تغذیه با شیرمادر علاوه بر بیماری‌های عفونی، کودکان را در برابر بیماری‌های مزمن سال‌های بعد مثل بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، چاقی و سرطان‌ها محافظت می‌کند.

تغییرات در ترکیب شیر مادر

کلستروم (آغوز) : شیری است که پستان‌ها در روزهای اول پس از زایمان تولید می‌کنند که غلیظ، زرد رنگ و یا به رنگ روشن است. آغوز حاوی پروتئین بیشتری نسبت به شیر رسیده است.

شیر رسیده : شیری است که بعد از روزهای اول تولید می‌شود. سپس میزان آن زیادتر می‌شود و پستان‌ها پر، سفت و سنگین می‌شوند و اصطلاحاً بعضی از مادران می‌گویند که به شیر آمده‌اند.

شیر پیشین یا foremilk : شیری است که در ابتدای هر وعده شیردهی از پستان‌ها خارج می‌شود.

شیر پسین یا hindmilk : شیری است که در انتهای هر وعده شیردهی از پستان‌ها خارج می‌شود.

شیر پسین سفیدتر از شیر پیشین بنظر می رسد چون سرشار از چربی می باشد. این چربی ها انرژی زیاد شیر مادر را فراهم می کنند. به همین دلیل تغذیه با شیر مادر را در هر وعده نباید به سرعت خاتمه داد و شیرخوار را از پستان جدا کرد ، بلکه باید اجازه داد تغذیه با شیر مادر تا زمانی که کودک می خواهد ، ادامه یابد تا شیر چرب انتهایی را دریافت کند .

شیر پیشین رقیق تر از شیر پسین بنظر می رسد و مقدار آن نیز بیشتر است و حاوی مقادیر فراوان پروتئین ، لاکتوز و سایر مواد مغذی است . چون شیرخوار با مقدار زیادی شیر پیشین تغذیه می شود ، بنابراین آب مورد نیازش را دریافت می کند و تا سن ۶ ماهگی ، حتی در هوای گرم نیز نیازی به مصرف سایر مایعات ندارد. اگر احساس عطش شیرخوار را با دادن آب یا سایر مایعات بر طرف نمایند، سبب می شود که شیرخوار کمتر شیر مادر بخورد .

کلستروم (آغوز)

خواص	اهمیت
سرشار از آنتی بادی	در برابر ابتلا به عفونت و آلرژی محافظت کننده است
حاوی گلبول های سفید بسیار	در برابر ابتلاء به عفونت محافظت کننده است
ملین	به دفع سریع مکونیوم و پیشگیری از یرقان نوزادی کمک می کند .
حاوی فاکتورهای رشد	به تکامل روده کمک می کند واز آلرژی و عدم تحمل به غذا جلوگیری می کند .
سرشار از ویتامین A	شدت عفونت را کاهش می دهد .

کلستروم ، آنتی بادی و پروتئین های بیشتری نسبت به شیر رسیده علیه عفونت ها دارد. هم چنین گلبول های سفید آن نیز بیشتر است . آغوز به پیشگیری از عفونت های باکتریال که برای نوزادان خطرناک است ، کمک می کند و در مقابل بسیاری از بیماری هائی که پس از زایمان ، نوزادان با آن مواجه می شوند ایمنی اولیه ایجاد می کند . مختصری اثرات ملین نیز دارد که به پاک کردن روده نوزاد از مکونیوم کمک می کند . این کار بیلی روبین را از روده دفع کرده و از تشدید زردی جلوگیری می کند .

بعلاوه ، آغوز حاوی فاکتورهای رشد بسیاری می باشد که به تکامل روده نابالغ شیرخوار بعد از تولد کمک می کند و از ایجاد آلرژی و عدم تحمل به سایر غذاها پیشگیری می نماید.

کلستروم ، سرشار از ویتامین A است که شدت عفونت های احتمالی شیرخواران را کاهش می دهد. لذا خیلی مهم است که شیرخوار حتماً آغوز را مصرف کند . نوزاد وقتی متولد می شود آغوز در پستان مادر آماده می باشد .قبل از شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر نباید هیچ ماده غذائی یا مایعات دیگری به او داده شود . تغذیه مصنوعی قبل از دریافت آغوز ، احتمالاً منجر به ایجاد آلرژی و عفونت می گردد .

مزایای روانی تغذیه با شیر مادر

تغذیه با شیر مادر به ایجاد رابطه عاشقانه و صمیمی میان مادر و شیرخوار کمک می کند و باعث می شود که مادر از لحاظ عاطفی ارضاع شود. تماس نزدیک بین مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان به استحکام این رابطه کمک می کند. این رابطه پیوند عاطفی (Bonding) نامیده می شود .

اگر شیرخوار با شیر مادر تغذیه شود ، کمتر گریه می کند و امنیت روانی بیشتری خواهد داشت . برخی مطالعات نشان داده اند که تغذیه با شیر مادر به ارتقاء ضریب هوشی کودکان کمک می کند . نوزادان کم وزن که در هفته های اول زندگی با شیر مادر تغذیه می شوند ، در سال های بعد نسبت به کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه شده اند، از بهره هوشی بالاتری برخوردارند .


مضرات تغذیه مصنوعی

- اختلال در پیوند عاطفی مادر و کودک
- ابتلا بیشتر به اسهال و اسهال پایدار
- ابتلا بیشتر به عفونت های تنفسی
- سوء تغذیه و کمبود ویتامین A
- افزایش آلرژی و عدم تحمل به غذا
- افزایش خطر ابتلاء به برخی بیماری های مزمن
- چاقی
- ضریب هوشی کمتر
- احتمال حاملگی زودرس مادر
- افزایش خطر کم خونی ، سرطان پستان و تخمدان در مادر

شیر مادر در سال دوم زندگی

در ۶ ماه اول زندگی ، تغذیه انحصاری با شیر مادر تمام مواد غذایی و آب مورد نیاز شیرخوار را تامین می کند ولی از ۶ ماهگی به بعد شیر مادر به تنهایی برای تأمین نیازهای شیرخوار کفایت نمی کند. شیرخوار از ۶ ماهگی به بعد ، علاوه بر شیر مادر به تغذیه کمکی نیز نیاز دارد اما تداوم تغذیه با شیر مادر همچنان منبع مهم انرژی و مواد مغذی با کیفیت محسوب می شود. در سال دوم عمر شیرخوار باید همراه با تداوم شیرمادر با غذاهای خانواده هم تغذیه شود و شیرمادر تا یک سوم نیاز انرژی و اکثر مواد مغذی مورد نیاز او را تامین می کند و حفاظت شیرخوار در برابر بیماریها نیز تداوم دارد.

Breast milk in second year of life



روش های مراقبت بهداشتی

روش های مراقبت بهداشتی می توانند تاثیر عمده ای بر تغذیه شیرخواران با شیر مادر داشته باشند. روش های نامناسب در تغذیه با شیر مادر تداخل ایجاد می کنند و موجبات ترویج تغذیه مصنوعی را فراهم می سازند. برعکس روش های خوب ، تغذیه با شیر مادر را حمایت می کنند و احتمال موفقیت مادران در امر شیردهی و تداوم تغذیه با شیر مادر برای مدت طولانی تر را افزایش می دهند.

ده اقدام بیمارستانی های دوستدار کودک

تلاش برای تغذیه موفق با شیرمادر از بیمارستان آغاز می شود و سپس توسط شما بعنوان مراقب سلامت در مراکز ادامه می یابد. لازم است از اقدامات بیمارستان های دوستدار کودک برای ترویج تغذیه با شیرمادر آگاه باشید و مادران باردار را آگاه کرده و برای تغذیه با شیرمادر آماده سازید.

در سال ۱۹۸۹ ، WHO و UNICEF بیانیه مشترکی تحت عنوان "حفظ ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر" (نقش ویژه زایشگاهها) منتشر ساختند. این بیانیه نقش زایشگاه ها را در حمایت از ترویج تغذیه با شیر مادر نشان می دهد. توصیه های این بیانیه تحت عنوان " ده اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادر " خلاصه شده و اجرای آن مبنای راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودک می باشد که در سال ۱۹۹۱ توسط WHO و UNICEF بعنوان یک اقدام جهانی پایه گذاری گردید. برای اینکه یک زایشگاه به عنوان بیمارستان دوستدار کودک شناخته شود ؛ باید این ده اقدام را به اجرا درآورد .

ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر *

- ۱- سیاست مدون ترویج تغذیه با شیرمادر در معرض دید کلیه کارکنان نصب و به آنها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر پایش شود.
- ۲- کلیه کارکنان به منظور کسب مهارتهای لازم برای اجرای این سیاست آموزش های قبل از خدمت و مکرر حین خدمت ببینند.
- ۳- مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن ، عوارض تغذیه مصنوعی ، بطری و گول زنگ آموزش دهند.
- ۴- به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیرمادر را در ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکنند.
- ۵- به مادران روش تغذیه با شیرمادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادر یا شیرخوار، اشتغال مادر) آموزش دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.
- ۶- به شیرخواران سالم در ۶ ماه اول عمر بجز شیرمادر و قطره ویتامین ، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) ندهند. (مگر در صورت ضرورت پزشکی)
- ۷- برنامه هم اتافی مادر و شیرخوار را در طول شبانه روز اجرا کنند و در بخش های اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تامین نمایند.
- ۸- مادران را به تغذیه برحسب میل و تقاضای شیرخوار با شیرمادر تشویق ، کمک و حمایت کنند.
- ۹- مطلقاً از شیشه شیر و پستانک (گول زنگ) استفاده نکنند.
- ۱۰- تشکیل گروههای حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی در مورد گروههای حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار دهند.

*توجه: این اقدامات در کشور ما بازنگاری شده و علاوه بر بخش های زنان و زایمان ، برای اجرا در بخش های کودکان نیز تکمیل گردیده و به عنوان دستورالعمل اجرایی بیمارستان های دوستدار کودک ابلاغ گردیده است.

آماده نمودن مادر در دوران بارداری برای شیردهی :

صحبت کردن درباره تغذیه با شیر مادر با تمام زنانی که برای مراقبت های دوران بارداری مراجعه می کنند، اهمیت دارد. به مادران نشان دهید که از تغذیه با شیر مادر حمایت می کنید و می خواهید به آن ها کمک کنید.

صحبت کردن با مادرانی که برای اولین بار باردار شده اند، اهمیت خاصی دارد و این گروه بیش از همه به کمک شما نیاز دارند. برخی مطالب را در کلاس های دوران بارداری می توانید به صورت بحث گروهی با مادران مطرح نمایید. بعضی مطالب را هم بهتر است به صورت انفرادی با تک تک مادران درمیان بگذارید.

آماده نمودن مادر در دوران بارداری برای شیردهی

آموزش گروهی مادران :

- مزایای تغذیه با شیر مادر بخصوص تغذیه انحصاری با شیرمادر را شرح دهید.
- بیشتر مادران خیلی زودتر از اینکه بچه دار شوند و حتی قبل از حاملگی در مورد تغذیه کودکان شان تصمیم می گیرند. اگر مادری تصمیم به تغذیه مصنوعی فرزندش گرفته است، احتمال دارد با آموزش های شما نظرش را عوض کند، می توانید به مادرانی که هنوز تصمیم نگرفته اند کمک کنید و به آنها هم که قصد شیردهی دارند اعتماد به نفس بدهید. می توانید مادر را تشویق نمایید به تغذیه انحصاری فرزندش با شیرمادر بپردازد.
- درباره شروع زودرس تغذیه نوزاد با شیر مادر پس از تولد و اتفاقات پس از زایمان با مادر صحبت کنید و در مورد اولین شیردهی ، روش ها یا مراقبت های بیمارستانی توضیح دهید تا مادران بدانند که چه انتظاراتی داشته باشند.
- اطلاعات ساده و مناسبی در باره نحوه تغذیه با شیر مادر در اختیار مادران قرار دهید مانند : تغذیه شیرخوار بر اساس تقاضای وی و وضعیت صحیح شیرخوار هنگام شیردهی.
- درباره سؤالات مادران بحث کنید.
- اجازه بدهید مادر تصمیم بگیرد که مایل به دانستن چه چیزهایی است. مثلاً "برخی مادران درمورد اثرات شیردهی روی اندام شان نگران هستند. این فرصت به آن ها کمک می کند که در مورد نگرانی های خود بحث کنند.

آموزش انفرادی مادران :

- درباره تجربه های قبلی شیردهی مادر سؤال کنید.
- اگر مادر تجربه موفقی از شیردهی داشته باشد، دوست دارد آنرا دوباره تکرار کند. اما اگر مشکلاتی در شیردهی داشته و یا فرزندش را با شیر مصنوعی تغذیه کرده باشد به او آموزش دهید که این بار چگونه شیردهی موفقیت آمیزی داشته باشد. به او اطمینان بدهید که به وی کمک خواهید کرد .
- از او بپرسید: آیا هیچ سؤال یا نگرانی ندارد .
- پستان هایش را فقط در صورتی معاینه کنید که او نگران آن ها باشد.
- ممکن است مادر نگران اندازه پستان ها و یا شکل نوک آن ها باشد. اما اگر نگران نیست ضرورتی ندارد بطور معمول پستان های او را معاینه کنید.
- به مادر اعتماد به نفس و توضیح دهید که شما به او کمک می کنید.

غالباً می‌توانید به وی اطمینان خاطر بدهید که پستان‌هایش مشکلی ندارند و تغذیه شیرخوار نیز با مشکلی مواجه نخواهد شد. توضیح دهید که شما یا مشاور دیگری به او کمک خواهید کرد. توجه: آموزش‌های دوران بارداری نباید شامل آموزش گروهی تهیه شیرمصنوعی شود.

برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد شروع تغذیه با شیر مادر(اقدام ۴) :

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد به استحکام پیوند عاطفی میان مادر و کودک و شروع موفق تغذیه با شیر مادر طی ساعت اول تولد کمک می‌کند .

مادر باید نوزادش را بلافاصله پس از زایمان بغل کرده و تماس پوست با پوست بین آن‌ها برقرار شود و تا حد امکان در یک ساعت اول ادامه یابد. نوزاد را خشک کرده و مادر و نوزاد را با یک پتو می‌پوشانند.

هرگاه نوزاد آماده به نظر آید به مادر کمک می‌کنند او را به پستان بگذارد. بطور طبیعی، نوزادان در ۲-۱ ساعت اول تولد بسیار هشیار بوده و عکس‌العمل نشان می‌دهند. اکثر نوزادان در فاصله نیم تا یک ساعت اول تولد تمایل به شیرخوردن دارند ولی زمان ثابت و دقیقی برای شروع شیرخوردن وجود ندارد. اقدامات پزشکی روتین و غیر اورژانس را اقلاناً به مدت یک ساعت به تاخیر می‌اندازند .

اگر اولین نوبت تغذیه با شیر مادر بیش از یک ساعت به تاخیر بیافتد، احتمال موفقیت شیردهی کمتر می‌شود و احتمال قطع زودرس شیردهی بیشتر خواهد بود.

خطرات تغذیه با مواد دیگر قبل از اولین نوبت تغذیه با شیرمادر(PRELACTEAL FEED)و تداوم تغذیه انحصاری با شیرمادر (اقدام ۶) :

تغذیه PRELACTEAL یعنی تغذیه نوزاد با شیر یا نوشیدنی‌های دیگر قبل از آنکه اولین نوبت تغذیه با شیرمادر شروع شود. تغذیه PRELACTEAL در واقع به عنوان اولین تغذیه نوزاد جایگزین آغوز می‌گردد و احتمال ابتلا به عفونت‌هایی نظیر اسهال را افزایش می‌دهد.

اگر به نوزاد شیر دیگری غیر از شیر مادر داده شود، احتمال بیشتری وجود دارد که نسبت به پروتئین‌های شیر عدم تحمل پیدا کند.

تغذیه نوزاد با مواد دیگر قبل از شروع تغذیه با شیرمادر، احساس گرسنگی نوزاد را ارضاع نموده و او تمایل کمتری برای تغذیه با شیر مادر خواهد داشت.

اگر حتی یک بار تغذیه نوزاد با مواد جایگزین انجام شود، احتمال بروز مشکلات شیردهی مثل احتقان پستان‌های مادر بیشتر خواهد بود. بعلاوه در این صورت، احتمال بیشتری هم برای توقف زودرس شیردهی، درمقایسه با تغذیه انحصاری با شیرمادر از ابتدای تولد وجود دارد.

اکثر مردم تصور می کنند که آغوز تا زمانی که شیر رسیده جریان یابد ، برای تغذیه نوزاد کفایت نمی کند . اما حجم معده نوزاد کاملاً با مقدار آغوزی که پستان مادر تولید می کند ، متناسب است.

مزایای هم اتاقی مادر و کودک (اقدام ۷) :

- مادر می تواند نسبت به نیازهای شیرخوار هر زمان که او گرسنه باشد، پاسخ داده و او را شیر بدهد. بدین ترتیب به پیوند عاطفی بین آن دو و تغذیه با شیرمادر کمک می شود.
- کودک کمتر گریه می کند بنابر این تمایل کمتری برای تغذیه کودک با بطری وجود خواهد داشت.
- مادر اطمینان بیشتری نسبت به شیردهی خواهد داشت.
- شیردهی به مدت طولانی تری پس از ترخیص از بیمارستان ادامه پیدا خواهد کرد.

تمام شیرخواران سالم از مزایای قرار گرفتن در کنار مادران خود خواه به صورت هم اتاقی و یا هم تختخوابی بهره مند می شوند . حتی ضرورتی ندارد که مادران HIV مثبت نیز از شیرخوار خود جدا باشند ، چون تماس عادی مادر و کودک سبب انتقال HIV نمی شود .

مزایای تغذیه با شیرمادر برحسب تقاضای شیرخوار (اقدام ۸) :

تغذیه با شیرمادر برحسب تقاضا یعنی تغذیه شیرخوار با شیرمادر در هر زمانی که مادر یا شیرخوار بخواهند بدون هیچ محدودیتی از نظر طول مدت و دفعات شیردهی.

این مزایا عبارتند از :

- مکونیوم زودتر دفع می شود.
- شیرخوار سریع تر افزایش وزن پیدا می کند .
- شیرمادر زودتر به جریان می افتد و شیرخوار در روز سوم ، حجم زیادتری شیر دریافت می کند.
- مشکلاتی نظیر احتقان پستان ها برای مادر کمتر ایجاد می شود .
- زردی با شیوع کمتری اتفاق می افتد .

باید اجازه داد تا هر مدتی که کودک تمایل دارد، به مکیدن پستان ادامه دهد مشروط بر آن که پستان را خوب گرفته باشد. بعضی از شیرخواران در عرض چند دقیقه تمام شیر مورد نیاز خود را دریافت می کنند ، درحالی که برخی دیگر به خصوص در یک تا دو هفته اول برای دریافت همین مقدار شیر نیم ساعت زمان نیاز دارند ، که البته هر دو گروه طبیعی هستند .

شیرخوار باید شیرخوردن از یک پستان را تمام کند تا قسمت آخر شیر را که سرشار از چربی است ، دریافت کند. سپس مادر پستان دوم را به او عرضه کند تا در صورت تماسل بمکد. اگر کودک پستان دوم را نگرفت ، مادر در نوبت بعدی ابتدا از آن پستان شیردهی را شروع کند. به این ترتیب هر دو پستان ها به یک اندازه تحریک خواهند شد.


فصل ۳

چگونگی تولید و ترشح و انتقال شیر از پستان به شیرخوار

شما برای کمک به مادران باید بدانید که پستان ها چگونه کار می کنند

شما نمی توانید روش خاصی برای مشاوره در هر موقعیت و یا هر مشکلی یاد بگیرید، اما چنانچه با چگونگی کار پستان آشنا شوید، می توانید تحلیل کنید که چه اتفاقی در پستان ها رخ می دهد و قادر خواهید بود به هر مادری کمک کنید تا بتواند درباره آنچه که برای او بهترین است، تصمیم بگیرد.


آناتومی پستان: تصویر زیر آناتومی پستان را نشان می دهد.



پوست تیره اطراف نوک پستان، آرئول(هاله) نامیده می شود. غدد مونتگمری در آرئول وجود دارند و ماده چربی ترشح می کنند که پوست را سالم نگه می دارد. در داخل پستان آلئوئول ها وجود دارند و در واقع حفرات خیلی کوچکی هستند که از سلول های ترشح کننده شیر تشکیل شده اند. در هر پستان میلیون ها آلئوئول وجود دارد که در تصویر فقط تعداد کمی از آنها نشان داده شده اند. داخل کادر تصویر بزرگ شده سه آلئوئول نشان داده شده است. هورمونی به نام پرولاکتین این سلول ها را وادار به ترشح شیر می کند.

اطراف آلئوئول ها سلول های عضلانی وجود دارند که منقبض شده و باعث خروج شیر می شوند. هورمونی به نام اکسی توسین این سلول های عضلانی را منقبض می کند. لوله ها یا مجاری کوچک، شیر را از آلئوئول ها خارج می کنند. شیر در فاصله بین دفعات شیردهی در آلئوئول ها و مجاری کوچک ذخیره می شود. مجاری بزرگ تر در زیر آرئول در هنگام شیردهی متسع می شوند و شیر را به طور موقت در خود نگه می دارند.

آلوتول های ترشحي و مجاری توسط چربی و بافت محافظتی احاطه شده اند. در واقع همین چربی و سایر بافت ها، پستان را شکل می دهند و تفاوت اندازه پستان های کوچک و بزرگ هم ناشی از آن است. پستان های کوچک و بزرگ هر دو تقریباً به مقدار مشابهی بافت غددي دارند بنا بر این هر دو می توانند به مقدار قابل توجهی شیر تولید کنند .




وقتی که شیرخوار شروع به مکیدن پستان می کند پیام های حسی از نوک پستان به مغز فرستاده می شوند . در پاسخ به آن، غده هیپوفیز که در قاعده مغز قرار دارد، پرولاکتین ترشح می کند. پرولاکتین از طریق خون به پستان ها رفته و سلول های ترشح کننده شیر را وادار به تولید شیر می کند . هرچه شیرخوار بیشتر بمکد پستان ها نیز شیر بیشتری تولید خواهند نمود .

تا ۳۰ دقیقه بعد از شیردهی بیشترین مقدار پرولاکتین در خون وجود دارد. بنابراین پستان ها را وادار به تولید شیر برای وعده بعدی شیردهی می کند. در هر وعده شیردهی، شیرخوار شیری را دریافت می کند که قبلاً در پستان ها آماده شده است

اکسی توسین

اکسی توسین قبل از تغذیه شیرخوار و در طول تغذیه او برای جاری شدن شیر فعالیت می کند.



وقتی شیرخوار شروع به مکیدن می کند پیام های حسی از نوک پستان به مغز منتقل می شوند و غده هیپوفیز که در قاعده مغز قرار دارد، در پاسخ به آن شروع به ترشح هورمون اکسی توسین می کند. اکسی توسین از طریق خون به پستان ها می رسد و سلول های عضلانی اطراف آلوئول ها را منقبض می کند.


این عمل باعث می شود شیرری که در آلوئول ها تجمع یافته است از طریق مجاری به مجاری بزرگ تر که در زیر آرئول قرار دارند جریان یابد و هنگام تغذیه، به طور موقت در آنجا ذخیره گردد. این پدیده، رفلکس اکسی توسین یا رفلکس رگ کردن یا جاری شدن شیر نامیده می شود.

اکسی توسین بسیار سریع تر از پرولاکتین تولید می شود و این باعث به جریان افتادن شیر موجود در پستان ها در هر وعده تغذیه شیرخوار می گردد. اکسی توسین حتی قبل از این که شیرخوار شروع به مکیدن بکند، یعنی هنگامی که مادر می داند زمان شیردهی است شروع به فعالیت می کند. اگر این رفلکس به خوبی فعالیت نکند ممکن است شیرخوار برای دریافت شیر دچار مشکل شود و حتی ممکن است ظاهراً به نظر برسد که تولید شیر در پستان ها متوقف گردیده است. اما پستان ها شیر تولید می کنند ولی خروج آن مختل شده است.

اکسی توسین رحم مادر را بعد از زایمان منقبض کرده و خونریزی را کاهش می دهد. اما گاهی اوقات در چند روز اول هنگام شیردهی، درد رحمی و خونریزی ایجاد می کند. درد ممکن است شدید هم باشد.

رفلکس اکسی توسین به راحتی تحت تاثیر افکار و احساسات مادر قرار می گیرد. احساسات خوب مانند احساس خوشایند مادر نسبت به کودک، عاشقانه فکر کردن به کودک، احساس اطمینان از این که شیر مادر برای کودک بهترین است به رفلکس اکسی توسین کمک می کند و شیر را به جریان می اندازد. احساساتی مانند لمس یا دیدن کودک یا شنیدن صدای گریه او نیز

به این رفلکس کمک می کند . اما احساسات بد مانند درد ، نگرانی یا شک به کافی بودن شیر مانع فعالیت این رفلکس می شود و جریان شیر متوقف می گردد که خوشبختانه این اثر گذرا است .

عوامل کمک کننده و مهار کننده رفلکس اکسی توسین		
<p>عوامل کمک کننده :</p> <ul style="list-style-type: none"> • تفکر عاشقانه به کودک • صدای کودک • دیدن کودک • لمس کردن کودک • اعتمادبنفس 	<p>These help reflex</p> 	<p>عوامل مهار کننده :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نگرانی • استرس • درد • تردید

علائم و احساسات مادر به هنگام وجود رفلکس فعال اکسی توسین
<p>مادر ممکن است در هنگام رفلکس اکسی توسین متوجه موارد زیر شود :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◀ درست قبل از شیردادن و یا به هنگام شیردادن، احساس دوشیده شدن یا غلغلک در پستان هایش می کند. ◀ هنگامی که به کودکش فکر می کند و یا صدای گریه او را می شنود، شیر از پستان هایش خارج می شود. ◀ هنگامی که کودک پستان مادر را می مکد، قطرات شیر از پستان دیگرش خارج می شود. ◀ اگر کودک در حین تغذیه با شیر مادر پستان را رها کند ، جریان ظریف شیراز پستان ها دیده می شود . ◀ مادر احساس درد و انقباض در رحم و گاه همراه با خروج مختصر خون در طی تغذیه با شیر مادر در هفته اول پس از زایمان دارد. ◀ مکیدن های آرام و عمیق شیرخوار همراه با بلع شیر ، نشانگر جاری شدن شیر دردهان شیرخوار است .

کنترل تولید شیر در پستان

ممکن است تعجب کنید علیرغم اینکه پرولاکتین و اکسی توسین به هردو پستان به یک اندازه می رسند، چرا گاهی تولید شیر در یک پستان متوقف می شود، در حالیکه پستان دیگر به تولید شیر ادامه می دهد. تصویر زیر دلیل این پدیده را نشان می دهد.

پدیده ای در پستان ها وجود دارد که می تواند تولید شیر را در آن ها کاهش داده و یا حتی متوقف سازد. اگر مقدار زیادی از شیر تولید شده در پستان باقی بماند، از تولید شیر بیشتر توسط سلول ها جلوگیری بعمل می آورد و این مسئله به محافظت پستان ها در برابر آثار سوء ناشی از پر شدن زیاد پستان ها کمک می کند. ضرورت این پدیده هنگامی آشکار می شود که کودک شیرخوار فوت می کند و یا تغذیه با شیر مادر به دلایل دیگر متوقف می شود. اگر پستان بوسیله مکیدن و یا دوشیدن شیر تخلیه شود، این مانع برطرف خواهد شد و در نتیجه شیر بیشتری در پستان ها تولید می شود.


این پدیده کمک می کند تا دریابیم که چرا هرگاه کودک ، مکیدن از یک پستان را متوقف کند ، تولید شیر نیز در آن پستان متوقف می شود. هر گاه کودک یک پستان مادر را بیشتر می مکد، آن پستان شیر بیشتری تولید می کند و بزرگتر از پستان دیگر خواهد شد.

این پدیده همچنین کمک می کند تا دریابیم که چرا برای اینکه پستان به تولید شیر ادامه دهد، باید همواره تخلیه شود.

هر گاه کودک نتواند یک یا هر دو پستان را بمکد، پستان ها باید با دوشیدن شیر تخلیه شوند تا بتوانند به تولید شیر ادامه دهند.

مهار کننده شیرمادر :

اگر پستان ها پر از شیر باقی بمانندو تخلیه نشوند، ترشح شیرمتوقف می شود.



مادر نحوه بغل کردن و شیرخوار نحوه گرفتن پستان را می آموزد

رفلکس جستجو

وقتی لب های شیرخوار با چیزی تماس پیدا کند، او دهانش را باز کرده و زبانش را پایین و جلو می آورد

رفلکس مکیدن

وقتی کام شیرخوار با چیزی تماس پیدا کند او شروع به مکیدن می کند



رفلکس بلعیدن

وقتی دهان شیرخوار پر از شیر می شود، او آن را می بلعد

سه رفلکس اصلی شیرخوار عبارتند از : رفلکس **Rooting** یا بازتاب جستجو ، رفلکس **Sucking** یا بازتاب مکیدن ، رفلکس **swallowing** یا بازتاب بلعیدن

هنگامی که شئی با لب یا گونه نوزاد تماس پیدا کند نوزاد دهان خود را باز می کند و سر خود را برای پیدا کردن آن می چرخاند و زبان خود را پائین و جلو می آورد . این رفلکس ، **Rooting** یا بازتاب جستجو نامیده می شود . به طور طبیعی ، نوزاد پستان را جستجو می کند .

هنگامی که چیزی داخل دهان شیرخوار می شود و با کام او تماس پیدا می کند، او شروع به مکیدن آن می کند. این رفلکس ، **Sucking** یا بازتاب مکیدن نامیده می شود .

هنگامی که دهان شیرخوار با شیر پر می شود آن را می بلعد. این رفلکس ، **swallowing** یا بازتاب بلعیدن نامیده می شود .

تمامی این رفلکس ها به طور خودکار و بدون این که نوزاد هیچ آموزشی در این زمینه دیده باشد انجام می گیرند .

لازم به ذکر است که عمل مکیدن از پستان مادر **Suckling** نام دارد . هنگامی که شیرخوار مقدار زیادی از بافت پستان را به دهان می برد، قادر خواهد بود نوک پستان را به عقب دهان (کام نرم) برساند و حرکات فک و عضلات زبان، شیر را از مجاری داخل آرنول (هاله پستان) به داخل دهان می دوشند.

فصل ۴

وضعیت صحیح شیردهی

پس از آشنایی با قسمت های مختلف پستان و نحوه انتقال شیر از پستان مادر به شیرخوار متوجه می شوید در صورتی این انتقال بخوبی انجام می شود که شیرخوار به طرز صحیح پستان مادر را در دهان بگیرد و قرار گرفتن شیرخوار به درستی در آغوش مادر نیز لازمه آن می باشد.

وضعیت در آغوش گرفتن شیرخوار هنگام شیر دادن:



چهار نکته کلیدی وضعیت صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار عبارتند از :

- سر، گوش، گردن و تنه شیرخوار در یک امتداد
- بدن شیرخوار نزدیک بدن مادر و چسبیده به وی
- قرار گرفتن صورت شیرخوار روبروی پستان و بینی او مقابل نوک پستان
- حمایت سر و تنه شیرخوار و اگر نوزاد است حمایت تمام بدن او توسط مادر



وضعیت نگه داشتن پستان در هنگام شیر دادن

- انگشتان مادر روی قفسه سینه و زیر پستان قرار می گیرند بنابراین اولین انگشت قاعده پستان را حمایت می کند. انگشت شست در بالای پستان قرار می گیرد. انگشتان مادر نزدیک نوک پستان نباشد. (عقب تر از هاله باشد)

وضعیت درست	وضعیت نادرست
	

چگونگی عرضه پستان به شیرخوار


- لمس کردن لب های شیرخوار با نوک پستان
- منتظر شدن تا شیرخوار دهانش را باز کند
- بردن سریع شیرخوار به طرف پستان بطوری که لب پائینی زیر نوک پستان را هدف گیری کند. (نوک پستان در مقابل بینی قرار می گیرد nose to nipple)

وضعیت پستان گرفتن صحیح شیرخوار


شیرخوار علاوه بر نوک پستان باید تا حد امکان هاله قهوه ای پستان را نیز در دهان بگیرد تا بتواند مجاری شیر زیر آنرا با مکیدن در دهان خود بدوشد و شیر دریافت نماید.

چهار نکته کلیدی وضعیت پستان گرفتن درست عبارتند از :

۱. دهان کودک کاملا باز است .
۲. چانه کودک کاملا به پستان چسبیده است .
۳. لب تحتانی به بیرون برگشته است .
۴. قسمت بیشتری از آرئول بالای لب فوقانی کودک دیده می شود در مقایسه با لب پائینی .



وضعیت پستان گرفتن (نمای بیرونی)



پستان گرفتن درست

پستان گرفتن نادرست

نتایج پستان گرفتن نادرست

اگر شیرخوار پستان را نادرست گرفته باشد و نوک پستان را بمکد، مادر احساس درد خواهد کرد . نادرست گرفتن پستان مهم ترین علت زخم نوک پستان است . در این حالت شیرخوار پستان را برای شیر خوردن بیشتر می مکد و به سختی برای دریافت شیر تلاش می کند، لذا نوک پستان را بیشتر به داخل دهان کشیده و خارج می کند، در نتیجه پوست قسمتی از نوک پستان که در دهان کودک قرار می گیرد، سائیده می شود. اگر کودک به همین ترتیب به مکیدن ادامه دهد پوست نوک پستان آسیب دیده و ترک می خورد که شقاق نامیده می شود . به این ترتیب که کودک نمی تواند پستان را به طور مؤثری از شیر تخلیه کند، پستان ها دچار احتقان شده ، کودک احساس ناراضی کرده و خیلی گریه می کند . نهایتاً اگر پستان ها تخلیه نشوند شیر کمتری تولید خواهد شد و روند وزن گیری کودک مختل شده و ممکن است مادر احساس کند که توانایی شیردهی ندارد .

به منظور جلوگیری از چنین اتفاقی تمام مادران برای به پستان گذاشتن شیرخوار و رعایت وضعیت درست پستان گرفتن او نیاز به کمک دارند . شیرخواران را هم ، به خصوص قبل از برقراری تغذیه با شیر مادر نباید با بطری تغذیه کرد.

وضعیت مکیدن شیرخوار :

نکات کلیدی مکیدن موثر :

- مکیدن ها آهسته و عمیق است و صدای بلع به گوش می رسد
- گونه ها پر بنظر می رسد و به داخل کشیده نمی شود
- شیرخوار آرام شیر می خورد و مادر احساس درد نمی کند
- شیرخوار خودش تغذیه را به پایان می برد و راضی بنظر می رسد
- مادر احساس درد نمی کند.

وضعیت های مختلف شیردهی:

مادر باید وضع و حالت خود را در جای راحت و مناسبی، طوری انتخاب کند که بتواند به راحتی شیرخوار را در آغوش گرفته و به پستان بچسباند. می تواند روی صندلی یا مبل بنشیند یا روی تخت و یا هر وضعیتی که راحت است دراز کشیده و شیر بدهد.

در وضعیت نشسته، در صورتی که روی صندلی راحتی راست بنشیند و زیر بازو، پشت و زیرپای خود تکیه گاهی داشته باشد، معمولاً راحت ترین وضعیت است. ولی اگر می خواهد در رختخواب شیر بدهد، پیشنهاد می شود بالش سفتی در پشت و بالش دیگری زیر زانوی خود قرار دهد.

وضعیت گهواره ای (معمولی یا سنتی) یکی از مرسوم ترین طرق نگهداشتن کودک برای شیردهی است. سر شیرخوار در خم آرنج مادر قرار می گیرد و بدنش با ساعد مادر حمایت می شود.



وضعیت گهواره ای متقابل: روشی مفید برای شیرخوارانی است که در پستان گرفتن مشکل دارند. استفاده از این روش در نوزادان نارس و کوچک که عضلات شل دارند و مادرانی که نوک پستان شان آزرده شده بهترین روش شیردادن می باشد. اگر از پستان چپ می خواهید کودک را شیر بدهید، او را با دست راست نگهدارید و بالعکس. دست مادر سرو گردن شیرخوار را نگه می دارد و بدن شیرخوار در امتداد طول ساعد مادر قرار می گیرد. از دست طرف پستان مورد استفاده، برای نگهداری پستان استفاده می شود یعنی مثلاً دست چپ پستان چپ را نگه می دارد. دهان شیرخوار در سطح نوک پستان یا مختصری پایین تر قرار می گیرد و بدن او به پهلو رو به مادر است.



وضعیت زیر بغلی:

در این وضعیت، مادر می نشیند و سر نوزاد به طرف پستان و بدنش زیر بغل مادر در پهلو وی قرار می گیرد. باسن کودک روی بالشی نزدیک آرنج مادر است تا نوزاد را به سطح پستان برساند. در این وضعیت برای راحتی بیشتر، پشت شانه های خودتان هم بالش بگذارید و بعد از پستان گرفتن شیرخوار، تکیه دهید.

در شرایط خاص مثل بزرگ بودن پستان ها یا نوک پستان صاف یا فرورفته، این وضعیت ارجح است چون مادر دید بهتری بر شیرخوار و کنترل بیشتری بر سر او دارد. این وضعیت برای مادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته اند، و در مواردی که بچه خواب آلود است یا در یادگیری تغذیه با شیرمادر مشکل دارد، همچنین برای کودکان نارس و دو قلو و کودکانی که مکیدن ضعیف دارند، مفید می باشد.



وضعیت خوابیده به پهلو

در این وضعیت مادر و کودک به پهلو روبروی هم می‌خوابند. می‌توانید چند بالش زیر سر، پشت و زیر زانویی که به طرف بالا است بگذارید. بچه به پهلو و روبروی شما طوری قرار می‌گیرد که پشتش بر بازوی تان تکیه دارد و زانوهایش به طرف شما کشیده شده است. ممکن است لازم باشد که یک بالش کوچک، پتو یا حوله تا شده در پشت شیرخوار هم گذاشته شود. در مادرانی که سزارین شده‌اند گاهی لازم است برای محافظت بخیه‌ها، بین مادر و شیرخوار یک بالش کوچک یا یک حوله تا شده کوچکی قرار بگیرد.



وضعیت خوابیده به پشت

در وضعیت خوابیده به پشت می‌توانید به یک پهلو غلطیده و از یک پستان شیر بدهید، سپس به پهلو دیگرم غلطیده و از پستان دوم شیر بدهید. توصیه می‌شود راه‌های مختلف را تجربه کرده و آسان‌ترین وضعیت را برای خود و کودک تان پیدا کنید، گذاشتن یک بالش زیر سر معمولاً لازم است. بعضی از مادران ترجیح می‌دهند چندین بالش یا کوسن را زیر بالاتنه و سر خود بگذارند تا این قسمت از بدن آنها بالاتر باشد. یک بالش زیر ران نیز راحتی بیشتری را فراهم می‌کند.



ارزیابی یک وعده تغذیه با شیر مادر و گرفتن شرح حال

ارزیابی تغذیه با شیر مادر به شما کمک می کند تشخیص دهید که آیا مادر نیاز به کمک دارد یا نه و چگونه باید او را کمک کنید. از طریق مشاهده می توانید به اطلاعات زیادی در مورد بد یا خوب بودن روند شیردهی دست پیدا کنید. البته هنگامی که شیرخوار در حال شیر خوردن نیست، شما می توانید برخی موارد را مشاهده کنید ولی سایر موارد را فقط وقتی در حال شیر خوردن است می توانید ببینید و مادر نیازمند کمک را شناسایی کنید.

پس ارزیابی تغذیه با شیرمادر می تواند در موارد زیر به شما کمک کند:

- برای شناخت عملکرد خوب مادر و شیرخوار و تشویق آنها
- مشخص نمودن اشکالات موجود در تغذیه با شیرمادر
- مشخص کردن عملکردهایی که اگر تشخیص داده نشوند بعداً "منجر به مشکلاتی در شیردهی می شوند.

برای ارزیابی یک وعده تغذیه با شیرمادر از فرم مشاهده شیردهی استفاده می شود. فرم مشاهده چند بخش دارد: وضعیت عمومی (مادر، شیرخوار)، وضعیت بغل کردن، وضعیت پستان گرفتن، نحوه مکیدن، وضعیت پستان مادر. لازم به ذکر است که در بوکلت؛ بخش های مربوط به شیرخوار در بخش ارزیابی وضعیت تغذیه شیرخوار زیر ۶ ماه و بخش های مربوط به مادر (وضعیت عمومی مادر و پستانهای مادر) در بخش ارزیابی سلامت و تغذیه مادر در بوکلت بطور خلاصه تحت عنوان "مشاهده کنید" آورده شده است.

چگونگی ارزیابی تغذیه با شیرمادر:

- به مادر خوش آمد بگوئید و پرسید شیردهی چگونه پیش می رود.
- مطمئن شوید مادر راحت و آسوده باشد و خودتان هم در وضعیت راحت قرار بگیرید.
- یک وعده شیردهی را مشاهده کنید.
- به نکات مثبت توجه کنید و مادر را تشویق کنید.
- ارزیابی شیردهی شامل مشاهده شیردهی و گوش کردن به صحبت های مادر است. به مادر بگوئید می خواهید شیرخوردن فرزندش را مشاهده کنید تا احساس راحتی کند. اما نگوئید که می خواهید ببینید مادر چه می کند.
- چنانچه شیرخوار در پتوی ضخیمی پیچیده شده، از مادر بخواهید که بازش کند تا بتوانید وضعیت بغل کردن و شیر خوردن او را مشاهده کنید.
- بخش "مشاهده کنید" به شما کارکنان بهداشتی کمک می کند که هنگام تغذیه شیرخوار به چه چیزهایی توجه کنید و مشکلات را شناسایی نمائید.
- وضعیت عمومی: نگاه کلی به مادر
- نکات مهم در مورد مادر: به سن و ظاهر او توجه کنید، آیا بیمارگونه یا سالم، شاد یا محزون، راحت یا تحت فشار به نظر می رسد؟

- نکات مهم در مورد پیوند عاطفی مادر و شیرخوار شامل: تماس چشمی، لبخند، خوب بغل کردن و با اعتماد به نفس، یا بدون تماس چشمی و درست بغل نکردن شیرخوار

- وضعیت عمومی: نگاه کلی به شیرخوار
- نکات مهم در مورد شیرخوار: سلامت عمومی، هشیاریا خواب آلوده، آرام یا در حال گریه و هر شرایط دیگری مثل گرفتگی بینی یا شکاف کام که می تواند شیر خوردن او را مختل کند، وجود دارد؟
- نحوه واکنش شیرخوار: مثلاً "اگر گرسنه است دنبال پستان می گردد، خود را به مادر نزدیک می کند یا از او دور می شود؟

- همچنان که مادر آماده می شود که شیر بدهد به چه نکات مهمی در مورد پستان های او توجه می کنید؟
- پستانها و نوک آنها چگونه به نظر می رسند؟ آیا سالم یا قرمز، متورم یا زخمی هستند؟
- آیا مادر از درد شاکی است یا بخاطر درد می ترسد شیرخوار را به پستان بگذارد؟
- چطور پستان را برای شیردادن نگه می دارد؟ آیا قرار گرفتن انگشتان او به نحوی می باشد که شیرخوار حجم کافی از پستان را بگیرد

- به وضعیت شیرخوار برای شیر خوردن توجه کنید:
- وضعیت شیرخوار چگونه است: آیا سر و ستون فقرات او در امتداد یک خط واقع است، نزدیک مادر است و مادر بدنش را حمایت کرده و روبروی پستان قرار گرفته و بینی او مقابل نوک پستان است؟ یا بدنش چرخیده، نزدیک به مادر نیست، حمایت نشده و یا چانه او در مقابل نوک پستان قرار دارد؟

- علائم خوب گرفتن پستان را در طول تغذیه مشاهده کنید:
- می توانید نکات کلیدی پستان گرفتن خوب را مشاهده کنید که:

آرئول بیشتری در بالای پستان دیده می شود تا پائین، دهان کاملاً باز است، لب پائین به بیرون برگشته است، چانه شیرخوار در تماس با پستان است

- مکیدن شیرخوار را مشاهده کنید:

- آیا مکیدن عمیق و آهسته را مشاهده می کنید؟ ممکن است صدای بلع آرام یا قلوپ قلوپ خوردن یا تیک تاک (تق تق) بشنوید یا اینکه گونه برجسته شیرخوار را که در خلال تغذیه به داخل کشیده نمی شود، ببینید.

- توجه کنید تغذیه چگونه پایان می پذیرد: آیا شیرخوار خودش پستان را رها می کند و راضی به نظر می رسد؟

- از مادر بپرسید چه احساسی در هنگام شیردهی دارد:
- آیا علائم رفلکس اکسی توسین مثل نشت شیر یا حالتی شبیه غلغلک یا سوزن سوزن شدن دارد؟
- آیا درد یا ناراحتی حس می کند؟
• با مشاهده شیردهی مادر اگر متوجه مشکلی شدید، شرح دهید چه اقداماتی کمک کننده است و از مادر بپرسید که آیا دوست دارد به او نشان دهید.

گرفتن شرح حال تغذیه با شیرمادر :

گرفتن شرح حال تغذیه با شیر مادر (بخش "سوال کنید" در جدول ارزیابی تغذیه با شیرمادر بوکلت) به شما کمک می کند
سؤالات اصلی که باید در مورد هر شیرخوار بپرسید را به یاد آورید.

- با مادر با لحن دوستانه ای سلام و احوال پرسی کنید .
- از نام های مادر و کودک استفاده کنید
- از او بخواهید که درباره خود و کودکش هر طور که مایل است و در مورد چیزهایی که برای او مهم هستند ، شروع به صحبت کند.
- به منحنی رشد کودک توجه کنید.
- منحنی رشد ممکن است حقایق مهمی را برای شما بیان کند که دیگر نیاز به سؤال کردن نداشته باشید.
- سؤالات را بپرسید. مواظب باشید که لحن شما انتقادی نباشد. از مهارت های خود در زمینه حمایت و ایجاد اعتماد به نفس استفاده کنید.
- سعی کنید سؤالات را تکرار نکنید.
- اگر نیاز به تکرار سؤال داشتید ، ابتدا بگوئید " آیا درست فهمیده ام؟ " و بعد مثلاً: " شما گفتید که (اسم کودک) در ماه گذشته هم اسهال داشت؟ "
- برای پی بردن به مشکلات بیشتر و مهم تر و موارد حساس تر، بیشتر وقت صرف کنید.

بعضی مادران خود موارد فوق را برای شما بیان می کنند. برخی دیگر زمانی که همدلی شما را ببینند و وقتی نشان دادید که احساسات آنان را درک می کنید، برایتان شرح می دهند. اگر مادری حرفش را راحت بیان نکرد، صبر کنید و بعداً " یکبار دیگر یا روز دیگر از وی سؤال کنید. شاید هم لازم باشد که در محلی بدون حضور اشخاص دیگر به طور خصوصی سؤال هایتان را تکرار کنید.

هرگاه مادر بخواهد مطلبی را به شما بگوید که برای او اهمیت دارد ، اجازه دهید تا او اول حرفش را بزند و بعد در مورد چیزهای دیگر سؤال کنید .

وقتی می خواهید از مادر شرح حال بگیرید، استفاده از مهارت های مشاوره را به یاد داشته باشید. سعی کنید سؤالات باز مطرح کنید. گر چه برای کسب برخی اطلاعات می توانید چند سؤال بسته نیز بپرسید . به خاطر داشته باشید از سایر مهارت های مشاوره ای مانند تکرار گفته های مادر ، همدلی و تشویق ، بین سؤالات تان استفاده کنید تا مادر تشویق شود بیشتر صحبت کند و احساس اعتماد به نفس کند .

چگونگی کمک به مادر برای در آغوش گرفتن و شیردادن به شیرخوار

همیشه قبل از کمک به مادر شیردهی او را مشاهده نمائید. اگر وقت کافی برای مشاهده کارهائی که انجام می دهد، اختصاص دهید، شرایط او را کاملا درک خواهید کرد. هرگز برای وادار کردن مادر به انجام کاری متفاوت با عملکرد خودش ، عجله نکنید.

مادر را فقط در شرایطی که دچار مشکلی شده، کمک کنید و بپرسید مایل است که عملا به او نشان دهید. سپس نحوه بغل کردن شیرخوار، نزدیک کردن او به پستان، نحوه گرفتن پستان در دست مادر، و نحوه پستان گرفتن شیرخوار را عملا به مادر نشان دهید.

بعضی مادران و کودکان در وضعیت هائی تغذیه با شیرمادر را به نحو رضایت بخشی انجام می دهند که ممکن است برای دیگران مشکل باشد، این موضوع بخصوص، در مورد بچه های بزرگتر از ۲ ماه بیشتر صدق می کند. در این گونه موارد چنانچه کودک بخوبی شیر می خورد و مادر نیز احساس راحتی می کند هیچ دلیلی برای تغییر وضعیت کودک وجود ندارد.

اجازه بدهید مادر کارهایش را حتی الامکان خودش انجام دهد، فقط مراقب باشید که تسلیم محض او نباشید. یعنی به او توضیح دهید که می خواهید او چه کاری انجام دهد و در صورت امکان خواسته تان را روی بدن خود عملی کرده و به او نشان دهید که منظورتان چیست .

اطمینان پیدا کنید که مادر آنچه را که شما انجام می دهید، فهمیده است و می تواند خودش به تنهایی آن را انجام دهد. هدف شما در واقع کمک به مادر برای وضعیت صحیح شیرخوار هنگام شیرخوردن است. پس اگر شما می توانید کودک را وادار به مکیدن کنید اما مادر این توانایی را پیدا نکرده ، در واقع کمکی به او نکرده اید.

اگر پستان گرفتن شیرخوار خوب نبود به مادر کمک کنید تا مجددا تلاش نموده و آنرا اصلاح کند. برای اصلاح وضعیت باید پستان را از دهان شیرخوار به آرامی و به نحوی خارج کرد که ابتدا فشار مکیدن شیرخوار خنثی شود تا آسیبی به بافت پستان نرسد. پس مادر یک انگشت تمیز خود را وارد گوشه دهان شیرخوار کند یا روی قسمتی از پستان که نزدیک دهان شیرخوار است فشار بیاورد یا لپ او را به آرامی و چانه او را پایین بکشد.

فصل ۶

روش‌های حفظ و تداوم شیردهی

نکات مهم برای مشاوره با مادر در حفظ و تداوم شیردهی

رعایت وضعیت صحیح تغذیه با شیر مادر : در مورد وضعیت صحیح تغذیه با شیرمادر که در بالا توضیح داده شد پس از مشاهده شیردهی با مادر مشاوره کنید.

تکرار شیردهی: شیردهی مکررو برحسب میل و تقاضای شیرخوار باشد. در دفعات و مدت هر وعده شیردهی نباید محدودیتی قائل شد که بسته به رفتار تغذیه‌ای شیرخواران متفاوت است. و لذا باید رفتارهای مختلف تغذیه‌ای شیرخواران را بشناسید که در ذیل توضیح داده شده است. توصیه می‌شود دفعات شیر خوردن ۱۰-۱۲ بار در شبانه روز بوده و نباید کمتر از ۸ بار باشد. شیرخوار از هر دو پستان تغذیه شود. مدت شیر خوردن بستگی به میل شیرخوار دارد (۳۰-۵ دقیقه) ولی معمولاً هر پستان را ۱۰-۱۵ دقیقه می‌مکد. در صورت جدایی مادر و نوزاد، با تقلید از رفتار تغذیه‌ای شیرخوار، شیر مادر باید دوشیده شود.

شیردهی در شب: با توجه به بالا بودن سطح هورمون پرولاکتین در خون هنگام شب، توصیه می‌شود مادر شیرخوار را در طول شب نیز تغذیه نماید. در صورت خواب بودن شیرخوار باید او را در خواب به پستان گذاشت.

تخلیه کامل پستان: به شیرخوار اجازه دهید مدت شیر خوردن را خودش تنظیم کند، مطمئن شوید که شیر پسین را دریافت کرده و پستان کاملاً تخلیه شده است. به مادر آموزش دهید شیردادن با عجله می‌تواند از نظر روانی تأثیر منفی بر ترشح شیر بگذارد.

هم‌اتاقی مادر و شیرخوار: هم‌اتاقی مادر و شیرخوار به صورت تمام وقت و شبانه روزی رعایت گردد که موجب برقراری و بهبود روابط عاطفی، تغذیه مکرر شیرخوار برحسب تقاضای وی می‌شود.

عدم شروع زود هنگام تغذیه تکمیلی: اضافه کردن مواد غذایی غیر از شیر به رژیم غذایی شیرخوار باید در موقع مناسب (۶ ماهگی یا ۱۸۰ روزگی) و با مواد غذایی متناسب و به تدریج انجام گیرد.

جلوگیری از استرس و نگرانی مادر : انجام مشاوره با مادران شیرده جهت مشخص کردن علت استرس و نگرانی از جمله عدم حمایت از مادران شیرده توسط کارکنان بهداشتی و خانواده، عدم اعتماد به نفس مادر برای تغذیه شیرخوار و جدایی مادر و شیرخوار و.....

جلوگیری از سردرگمی شیرخوار: آموزش عدم استفاده از شیشه و پستانک در هر شرایط. آموزش عدم استفاده از مواد غذایی دیگر به جز شیر مادر در ۶ ماه اول زندگی مگر اندیکاسیون داشته باشد. در صورت اجبار به تغذیه شیرخوار با شیر دوشیده شده یا سایر شیرها، باید از قاشق، فنجان یا سرنگ استفاده نمود.

عدم استفاده از قرص پیشگیری از بارداری: به منظور جلوگیری از عدم ترشح شیر از قرص‌های هورمونی تا ۶ ماهگی شیرخوار نباید استفاده کرد. به منظور پیشگیری از بارداری در صورت قاعده نشدن مادر شیرده و تغذیه انحصاری شیرخوار با

شیر مادر می‌توان از روش شیردهی و قرص لاینسترنول و در غیر این صورت از آمپول دیومدروکسی پروژسترون استات و سایر روش‌های غیر هورمونی استفاده کرد.

جلوگیری از کار زیاد و خستگی مادر : حمایت همسر از شیردهی، دخالت دادن اعضای خانواده و به خصوص همسر در مراقبت از شیرخوار یا انجام کارهای دیگر، برای ادامه شیردهی از پستان، مادر باید برای دوشیدن پستان‌هایش برنامه‌ریزی نماید تا تولید شیر ادامه یابد و شیر ذخیره شده برای تغذیه شیرخوار در غیاب مادر استفاده گردد.

رژیم غذایی مادر شیرده: مادر باید مواد غذایی و مایعات را به مقدار کافی با رعایت تنوع و تعادل مصرف کند. (طبق جدول نکات مهم در مورد سلامت و تغذیه مادر)

مصرف مایعات: مصرف مایعات اثری بر حجم شیر مادر ندارد. میزان مصرف را تشنگی مادر تعیین می‌کند. نوشیدن شیر تأثیری در تولید شیرمادر ندارد و آب نوشیدنی مجانی بسیار خوبی است. مصرف زیاد مایعات لازم نیست ولی اگر شک دارید که مادر چقدر بنوشد باید مقداری بنوشد که ادرار او بی‌رنگ باشد. برای کمک به تولید شیر، مادر باید به تخلیه پستان‌ها با شیر دادن مکرر یا دوشیدن شیر بپردازد.

غذای مادر: تولید شیرمادر به رژیم غذایی مادر بستگی ندارد مگر اینکه دچار بیماری مزمن بوده و شدیداً دچار سوء تغذیه باشد. اگر رژیم غذایی او برای مدتی کوتاه مناسب نباشد کیفیت شیرمادر تغییر نمی‌کند ولی ممکن است ذخیره‌های بدن او تخلیه شود. مادر می‌تواند هر چه می‌خواهد بخورد مگر غذای خاصی که شواهد عدم تحمل یا تأثیر بر رشد شیرخوار را نشان می‌دهد. مادر نباید مجبور به خوردن غذا یا نوشیدنی خاصی شود که دوست ندارد. او می‌تواند یک جایگزین سالم را انتخاب کند. مادر نباید به این دلیل تحت استرس قرار گیرد.

مادران با شرایط زیر نیاز به مراقبت ویژه دارند:

- مادر برای فرزند قبلی مشکل شیردهی داشته واز شیردهی منصرف شده و شیر مصنوعی را زود شروع کرده وگول زنک یا بطری به شیرخوار داده است.
- مادر اصلاً به فرزند خود شیر نداده است.
- مادر شاغل بوده و ساعاتی از روز را از فرزندش دور باشد.
- مادر مشکل خانوادگی داشته باشد.
- مادر افسرده است.
- مادر ایزوله بوده وحمایت اجتماعی نداشته باشد.
- مادر جوان، تنها و مسن باشد.
- مادر قصد دارد فرزندش را به فرزند خواندگی بسپارد(چنانچه بارداری ناخواسته باشد، باید مادر را حمایت و امیدوار کرد تا بتواند بارداری و شیردهی را به سلامتی به پایان برساند)
- نازایی با علت هورمونی داشته باشد.
- هیپوتیروئیدی درمان نشده داشته باشد.
- دیابت درمان نشده داشته باشد.
- دچار بیماری مزمن است و یا نیاز به دارو دارد ویا کم خون است.
- مادر قبلاً جراحی پستان یا تروما داشته که مجرای شیر یا اعصاب نوک پستان او طوری صدمه دیده که در تولید شیر اختلال بوجود آمده باشد.
- عدم تقارن قابل ملاحظه پستان در طول دوره بارداری

- بزرگ نشدن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری
- نوک پستان صاف یا فرورفته
- پیش بینی اینکه نوزاد بعد از زایمان نیاز به مراقبت ویژه داشته باشد.
- مادر دارای فرزند دوقلو یا چند قلو باشد
- مادر سوء تغذیه داشته باشد.
- مادر دچار عوارض حوالی زایمان گردد (فشار خون، خونریزی و عفونت)
- مادر HIV-1 یا HIV مثبت باشد.
- مادر در بارداری به فرزند قبلی خود شیر می دهد.
- عدم توجه مادر شیرده به تغذیه و استراحت خود.
- گاه مادر احساس می کند تغذیه انحصاری با شیر مادر امکان ندارد. توصیه به شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد می شود.
- مادری که فکر می کند شیردهی وضعیت ظاهری او را تغییر می دهد، یا مزاحم کار او خواهد بود و یا اطرافیان توصیه به تغذیه با شیر مصنوعی می کنند، توصیه به مشاوره می شود.

آیا مادر جزو موارد نیازمند مراقبت ویژه در شیردهی است؟ برای مثال :

✓ سن مادر کمتر از ۱۸ سال است، تنها و بدون کمک است، اعتماد به نفس کافی ندارد، علایم مشکلات

روحي روانی دارد

مادران جوانی که از طرف خانواده و دوستان حمایت نمی شوند یا تجربه بدی در شیردهی داشته اند و اعتماد به نفس کافی ندارند. مادرانی که شیردهی را دوست ندارند بیشتر دچار تردید نسبت به موفقیت در شیردهی می شوند. رفتارهای نامناسب پرسنل و عدم مشاوره با مادر نیز می تواند تأثیر منفی داشته باشد. زود شروع کردن تغذیه به دلیل بیداری و هوشیاری نوزاد احتمال موفقیت را بیشتر کرده و اعتماد به نفس مادر را بیشتر می کند. اگر مادر به علت خستگی فراوان و یا افسردگی شدید از مراقبت شیرخوار خود چشم پوشی کند و یا مراقبت ها را بدون علاقه و با خشونت انجام دهد باید ضمن حمایت و برقراری تماس پوست با پوست با نوزاد با او مشاوره شده یا به روانپزشک ارجاع داده شود. در مشاوره هرگز نباید از مادر انتقاد شود بلکه با برقراری ارتباط نزدیک و همدلی با او، اعتماد به نفس او را باید افزایش داد.

✓ مادر شاغل است.

- بسیاری از مادران به دلیل برگشت به محل کار، شیر کمکی را زود شروع می کنند یا شیردهی خود را زود قطع می کنند. کارکنان بهداشتی درمانی می توانند به مادران شیرده کمک کنند که علاوه بر ادامه شیر مادر، شغل شان را نیز ادامه دهند. مادران شاغل اغلب به دلیل شاغل بودن نگران نحوه تغذیه شیرخوار با شیر مادر هستند که در حله اول باید اعتماد به نفس آنها را بالا برد و یک تا دو هفته قبل از اتمام مرخصی زایمان، مادر را با دوشیدن شیر و نحوه تغذیه شیرخوار در زمان غیبت او آشنا کرد.

- برای خانمی که در خارج از منزل کار می کند، شیر دهی با ارزش است. زیرا:

- فرزندش کمتر بیمار می شود لذا کمتر ناچار به ترک کار برای مراقبت کودک می شود.
- شب ها استراحت بیشتر دارد چون همین طور که خوابیده است فرزندش را شیر می دهد.
- فرصت گذراندن وقت با فرزند و نزدیکی با او را برای مادر فراهم می کند.
- شانس استراحت در حین شیردهی را فراهم می کند.
- برقراری ارتباط خاص و فردی و رابطه صمیمی مادر و کودک را تامین می کند.

- کارفرمایانی که از تداوم شیردهی مادران حمایت می کنند از منافع آن سود می برند از جمله:
 - مادران کمتر از سرکار غیبت می کنند زیرا فرزندشان کمتر بیمار می شود و سالم است.
 - مادر کارش را به خوبی انجام می دهد و می تواند روی کارش تمرکز نماید چون کمتر نگران بیمار شدن فرزندش می باشد.
 - کارفرماها شاغلین با مهارت را بیشتر نگر می دارند.
 - خانمی که بدین ترتیب حمایت شود بهتر کار می کند و نسبت به کار کردن بیشتر راغب است.
 - خانواده و جامعه قدردان کارفرمایان حامی هستند.
 - کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند خوب رشد می کنند و نیروهای سالم آینده هستند.
- چند هفته قبل از برگشت مادر به محل کار با او گفتگو کنید:
 - آیا می تواند فرزندش را با خود به محل کار ببرد؟
 - آیا می تواند فرزندش را در محلی نزدیک به محل کار نگهداری کند و در زمان های استراحت به ملاقات او برود و او را شیر بدهد یا کودک را نزد او بیاورند؟
 - آیا تا بزرگتر شدن کودک می تواند ساعات یا روزهای کمتری کار کند.
- چنانچه امکان شیردهی مستقیم در روزهای کاری وجود ندارد موارد زیر را به مادر پیشنهاد کنید:
 - در طول مرخصی شیردهی تغذیه انحصاری و مکرر با شیر مادر را ادامه دهد.
 - هر گاه مادر و کودک با هم هستند چه شب، چه صبح زود چه روزهای تعطیل شیردهی را ادامه دهد.
 - غذای کمکی یا سایر مواد غذایی را زودتر از آنچه که لازم است شروع نکند. در صورت لزوم ۲-۳ روز قبل از شروع به کار کافی است.
 - دوشیدن شیر را یاد بگیرد و شیر دوشیده شده را آماده کند تا فرد مراقب کودک از آن برای تغذیه طفل استفاده کند.
 - چنانچه ممکن است در محل کار هر ۳ ساعت شیرش را بدوشد تا علاوه بر تداوم تولید شیر، پستانها نیز تحت فشار نباشند. وقتی شیر برداشت شود، تولید شیر بیشتر خواهد شد.
 - به مراقب کودک یاد دهید که شیر دوشیده شده را با مهربانی و محبت و بطور ایمن بوسیله فنجان به کودک بدهد و از شیشه استفاده نکند تا وقتی که مادر در خانه است، علاقه شیرخوار برای مکیدن پستان باقی بماند.
 - با سایر مادران شاغل شیرده تماس داشته باشد و حمایت آنها را جلب کند.
- برای مادران دانشجو نیز باید حمایت در مورد تغذیه با شیر مادر وجود داشته باشد.
- اقداماتی نظیر تغذیه انحصاری با شیر مادر برحسب تقاضای طفل در سراسر مدت مرخصی زایمانی، عدم شروع زودرس تغذیه تکمیلی و عدم تغذیه با شیرمصنوعی هنگامی که مادر نزد کودک است، تغذیه بیشتر با شیر مادر در شب و تعطیلات، عدم تغذیه با بطری هنگام دور بودن مادر از کودک، دادن شیر دوشیده شده برای یک وعده به صورت یک باره، عدم استفاده از گول زنک (پستانک) در غیاب مادر، عدم ترک طفل غیر از ساعات کار و همراه او بودن در همه جا برای تغذیهها شیر مادر، شیردادن به طفل هنگام استراحت و دراز کشیدن مادر، آوردن شیرخوار به محل کار، نگهداری کودک در محلی نزدیک محل کار که مادر بتواند مستقیماً به شیرخوار خود شیر بدهد، دوشیدن شیر در محل کار ۲-۳ بار، تغذیه با شیر دوشیده شده مادر زمان دوری از طفل، صرف غذای کافی، مصرف مایعات کافی، آشنایی با سایر زنان شاغل شیرده و استفاده از تجربیات آنها، استراحت کافی مادر را توصیه کنید.

✓ مادر تجربه ناموفق شیردهی دارد

درباره تجربه های قبلی شیردهی مادر سؤال کنید. اگر مادر تجربه موفقی از شیردهی داشته باشد، دوست دارد آنرا دوباره تکرار کند. اما اگر مشکلاتی در شیردهی داشته و یا فرزندش را با شیر مصنوعی تغذیه کرده باشد به او آموزش دهید که این بار چگونه شیردهی موفقیت آمیزی داشته باشد. به او اطمینان بدهید که به وی کمک خواهید کرد. ممکن است به

علت جدایی مادر و نوزاد، باور غلط مادر، شرایط خاص مادر یا شیرخوار در زایمان‌های قبلی و... باشد. با دریافت اطلاعات دقیق درباره عواملی که باعث عدم شیردهی در فرزندان قبلی شده است باید مشاوره مناسب با مادر انجام گیرد. بایستی مادر را توجه کرد که عدم موفقیت در شیر دهی در زایمان‌های قبلی به معنی عدم توانایی شیر دهی در زایمان فعلی نمی‌باشد. از او بپرسید: آیا هیچ سؤال یا نگرانی ندارد. تعداد فرزندان قبلی، تعداد فرزندان که با شیر مادر تغذیه شده اند و هر کدام چه مدت، اگر با شیر مادر تغذیه شده اند انحصاری بوده یا توأم، سایر تجربیات در ارتباط با تغذیه از مادر پرسیده شود. پستان‌هایش را فقط در صورتی معاینه کنید که او نگران آن‌ها باشد. ممکن است مادر نگران اندازه پستان‌ها و یا شکل نوک آن‌ها باشد. اما اگر نگران نیست ضرورتی ندارد بطور معمول پستان‌های او را معاینه کنید. به مادر اعتماد به نفس و توضیح دهید که شما به او کمک می‌کنید. غالباً می‌توانید به وی اطمینان خاطر بدهید که پستان‌هایش مشکلی ندارند و تغذیه شیرخوار نیز با مشکلی مواجه نخواهد شد. توضیح دهید که به او کمک خواهید کرد.

✓ مادر اعتیاد به مواد مخدر، داروی مخدر، الکل، مصرف سیگار و سایر دخانیات دارد

اعتیاد به مواد مخدر، داروی مخدر، مصرف سیگار و سایر دخانیات با افزایش احتمال آنمی، سقط، پره‌اکلامپسی، مرگ جنین، نوزاد کم وزن، زایمان زودرس، دکلمان، پارگی زودرس کیسه آب، دیابت، آلودگی به هپاتیت و ایدز در معتادان تزریقی همراه خواهد بود. همچنین موجب افزایش احتمال عدم موفقیت شیردهی و کاهش ترشح شیر مادر می‌شود. تأثیر آن بر نوزاد شامل موارد سپتی سمی، شکاف کام، خونریزی داخل مغزی، هیپوگلیسمی، سندرم ترک، افزایش احتمال امتناع از شیرخوردن خواهد بود. همچنین در مادران سیگاری و در شیرخوارانی که در معرض دود سیگار قرار دارند، این عامل سبب کاهش تولید شیر و کاهش وزن‌گیری شیرخواران می‌شود. استفاده مادر از نیکوتین، الکل، اکستازی، آمفتامین، کوکائین و محرک‌های وابسته دارای اثر سوء بر شیرخوار هستند. الکل، اپیوئیدها، بنزودیازپین‌ها و وحشیش می‌توانند موجب تخدیر مادر و شیرخوار شوند.

● در این موارد توصیه اکید به ترک سیگار در بارداری و شیردهی می‌شود. تأکید بیشتر در مورد علایم خطر دوران بارداری نظیر علایم زایمان زود رس، سقط، دکلمان و... خواهد بود. لازم است بررسی دقیق آنمی، فشارخون، رشد جنین و توجه ویژه به رژیم غذایی (خطر سوء تغذیه) انجام شود. انجام زایمان در بیمارستان مورد تأکید است.

● در صورت اعتیاد به مواد مخدر لازم است :

مادر از نظر مواد افیونی و مصرف همزمان سایر مواد و داروها ارزیابی شود. علایم ترک، مسمومیت و سایر اختلالات روان پزشکی همزمان بررسی شود. عدم اقدام به ترک در سه ماهه اول بارداری: ارجاع به روان پزشک برای درمان جایگزین با متادون عدم اقدام به ترک در سه ماهه دوم بارداری: ارجاع به روان پزشک برای اقدام به ترک ارجاع به کارشناس ایدز مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری به منظور مشاوره و انجام آزمایش HIV در مادر معتاد تزریقی تأکید کارمند بهداشتی درمانی به مادر در مورد احتمال وابستگی نوزاد به داروهای مخدر بعد از تولد و اعلام این موضوع به بیمارستان.

در صورت مصرف الکل احتمال تولد نوزاد کم وزن، سندرم الکلی جنین و تأثیر سوء بر شیردهی خواهد بود. به مادر در مورد عدم مصرف الکل آموزش داده شود. همچنین مادر الکلی به متخصص زنان و روان پزشک ارجاع داده شود.

✓ مادر سزارین شده است.

- بیماری، احتمال عفونت، درد و ناراحتی روانی مانند افسردگی به مراتب بیشتر از زایمان طبیعی است و یکی دیگر از مشکلات عمل سزارین تأخیر در برقراری ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد است.
- مشکل دیگر شروع نشدن به موقع تغذیه با شیر مادر است.
- اگر جهت انجام عمل سزارین بی حسی نخاعی انجام گیرد، در هنگام تولد، مادر بیدار است و می تواند به کمک پرستار اطلاق عمل روی تخت عمل نوزادش را در آغوش بگیرد و او را شیر دهد ولی در بیهوشی عمومی به علت خواب آلود بودن مادر، شروع شیردهی به تأخیر می افتد (تا زمان پاسخگویی، معمولاً ۶-۲ ساعت). در این گونه موارد دادن آب قند و یا شیر خشک به نوزاد ضرورتی ندارد و مادر نیاز به حمایت و کمک اطرافیان دارد.

در سزارین اورژانس به دلیل این که مادر احساس می کند در نقش زنانگی خود شکست خورده است می تواند از نظر روانی تأثیر داشته باشد.

- نحوه زایمان تأثیر چشمگیری در زمان شروع ترشح شیر و غلظت آن ندارد.

بسته به نوع بیهوشی و شرایط همراه، مادر ممکن است احساس هوشیاری کامل کند و برای گذاشتن کودک روی پستان در ساعت اول آمادگی داشته باشد. باید تماس پوستی نوزاد با مادر توسط همراه در بخش تا به هوش آمدن و اعلام آمادگی مادر ادامه داشته باشد. نوزاد معمولاً ۶-۴ ساعت پس از سزارین در صورت هوشیاری مادر روی سینه گذاشته می شود.

بوپیواکائین در بلوک اپیدورال برای سزارین یا زایمان واژینال استفاده می شود.

بوپیواکائین و تتراکائین در شیر در غلظت کم ظاهر می شوند.

لیدوکائین و مرفین اپیدورال به میزان کم وارد شیر می شوند و میل مکیدن در نوزاد را کاهش می دهند.

در نوع اسپینال برای جلوگیری از سردرد مادر می تواند به یک طرف بچرخد و با قرار دادن نوزاد به یک طرف و تحریک دور دهان نوزاد با نوک پستان، پستان را در دهان نوزاد بگذارد.

- اگر مادر بتواند به سمت دیگر بچرخد نوزاد می تواند در هر دو طرف نگهداری شود

✓ فرزند بدون برنامه ریزی (با ناخواسته) بوده و یا مشکلاتی دارد.

ناهنجاری نوزاد، جنسیت، تعداد فرزند و حاملگی ناخواسته و... سبب تغییر در پیوند عاطفی مادر و شیرخوار می گردد.

شیرخواران مبتلا به ناهنجاری و مشکلات مغزی بیشتر به تغذیه از پستان و شیردهی نیاز دارند چرا که شیر مادر و آغوز غذای کامل و سرشار از عوامل ایمنی بخش بوده و در پیشگیری از عفونت ها نقش مؤثری دارد لذا تغذیه مکرر از پستان مادر به این

گونه کودکان کمک می‌کند که از بهره هوشی بیشتر و رشد جسمی و روانی بهتری بهره‌مند گردند. بر همه اطرافیان و پرسنل بهداشتی درمانی لازم است به چنین مادرانی کمک و از او حمایت کنند تا مادر بتواند تغذیه با شیر خود را آغاز کند و چون این نوزادان خواب‌آلود بوده و شلی عضلات دارند تغذیه این گروه نیاز به صبر و حوصله دارد. شیردهی به این کودکان باید به صورت زیر بغل انجام شود.

رفتارهای تغذیه‌ای شیرخواران:

- **شیرخواران هیجانی:** برخی از بچه‌ها هنگام مواجهه با پستان هیجان زده به نظر می‌رسند؛ به طور متناوب پستان را گرفته و ول می‌کنند و سپس شروع به جیغ زدن می‌نمایند. مادر چنین شیرخوارانی ابتدا باید نوزاد را بغل کرده، او را آرام نمایند؛ سپس شیرخوار را زیر پستان بگذارند. پس از چند روز مادر و نوزاد به هم عادت می‌کنند.
- **شیرخواران عجول:** بعضی از شیرخواران به شدت و با عجله و بی‌درنگ پستان را می‌گیرند و برای مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه، بسیار پر انرژی پستان را می‌مکند. این گروه از شیرخواران بازیگوشی نمی‌کنند و به ندرت به پستان صدمه می‌زنند و اگر هم مشکلی رخ دهد پس از مدتی برطرف خواهد شد.
- **شیرخواران سخت:** این شیرخواران منتظر جریان شیر می‌مانند و در روزهای اول علاقه و توانایی خاصی به مکیدن از خود نشان نمی‌دهند. نکته مهم این است که وقتی تمایل به شیر خوردن ندارند به زور و اجبار به شیر خوردن وادار نشوند زیرا دفعه بعد که به پستان گذاشته می‌شوند شیر خواهند خورد. مادران پس از هر بار تغذیه، شیر را دوشیده و ذخیره نمایند.
- **شیرخواران وسواسی:** این شیرخواران اصرار دارند نیپل را در دهان نگه دارند، کمی شیر بچشند و قبل از این که شروع به شیر خوردن کنند دهانشان را بکشند. اگر عجله کرده و یا به زور مجبورشان کنیم به شدت عصبانی شده و شروع به جیغ زدن می‌کنند. بعد از چند لحظه آرام شده و به خوبی شیر می‌خورند. این شیرخواران به مزه شیر بسیار حساس هستند و اگر مزه شیر فرق کند شیر نخواهند خورد. مادر باید غذاهای مختلف را کم‌کم به غذای خود اضافه نماید تا شیرخوار به طعم‌های مختلف شیر عادت کند. یعنی مادر هر چند وقت یک بار غذای جدید بخورد.
- **شیرخواران تنبل:** (تغذیه کننده در زمان طولانی): ترجیح می‌دهند چند دقیقه شیر بخورند و چند دقیقه استراحت نمایند. این شیرخواران عجله‌ای در شیر خوردن ندارند و اگر به حال خود گذاشته شوند معمولاً خوب شیر می‌خورند گر چه زمان بیشتری برای شیر خوردن صرف می‌کنند. صبر و حوصله مادر در این شیرخواران بسیار حایز اهمیت است.

نحوه از شیر گرفتن کودک در پایان ۲ سالگی:

پایان ۲ سالگی زمان مناسبی جهت از شیر گرفتن شیرخوار است. برای تسهیل در انجام این کار باید به تدریج دفعات غذاهای کودک افزایش یافته و سعی شود تا با دادن غذاهای مورد علاقه کودک، تمایل او را برای تغذیه با شیرمادر کاهش داد. سپس به تدریج برخی از وعده‌های شیردهی را قطع کرده و فاصله بین وعده‌های شیردهی را افزایش داد. بهتر است ابتدا برای یک هفته تا ۱۰ روز وعده‌های شیردهی صبح حذف شود و سپس وعده‌های شیردهی بعدازظهر حذف شود. وعده‌های شیردهی شب، آخرین وعده‌ای است که حذف می‌شود. با حذف تدریجی شیرمادر، نیاز کودک به شیر و لبنیات افزایش می‌یابد. البته مصرف شیر و ماست مجموعاً بیش از ۵۰۰ میلی لیتر در روز (۲ لیوان) توصیه نمی‌شود چون خطر کم خونی فقر آهن را در کودک افزایش می‌دهد.

برای از شیرگیری استفاده از برخی ترکیبات بمنظور تلخ و بدمزه کردن نوک پستان توصیه نمی شود زیرا تاثیر منفی بر روابط مادر و شیرخوار و همچنین سلامت شیرخوار دارد.

تصمیم در مورد از شیر گرفتن بستگی به شرایط جسمی روانی مادر و کودک و ویژگی های خانواده دارد:

- بهترین روش از شیر گرفتن، تدریجی است که همراه با عشق و علاقه و در طی چند ماه اتفاق افتد. بنابراین بعد از دو سال کامل که کودک از شیر مادر بهره مند شده و ۵ وعده در روز (۳ وعده غذای اصلی و ۲ میان وعده) غذا می خورد و مایعات را هم با لیوان می نوشد می توان ۲-۱ وعده شیر پاستوریزه یا آب میوه را جایگزین شیر مادر نمود که باید با لیوان یا فنجان به شیرخوار داده شود.
- هر ۲-۳ روز یک بار، نباید بیش از یک وعده شیردهی را حذف کنید.
- در این زمان خودتان پیشنهاد شیر دادن نکنید و اگر زمانی هم کودک تمایل به شیر خوردن داشت از او دریغ ننمایید، به ویژه هنگام بیماری کودک که فقط اشتها به خوردن شیر دارد و غذای دیگری را تحمل نمی کند.
- از شیر گرفتن نباید در زمان بیماری و استرس باشد.
- در این روش چون از شیر گرفتن آرام آرام است مشکلات عصبی روانی و تغییرات هورمونی مادر که در یکباره از شیر گرفتن اتفاق می افتد به وجود نمی آید و کودک نیز دچار ضربه روانی نمی شود. به این ترتیب کودک کم کم علاقه به شیر خوردن را از دست می دهد و ممکن است خودش یک باره آن را کنار بگذارد.

- رعایت این توصیه ها هنگام از شیر گرفتن کمک کننده است :

- نسبت به از شیر گرفتن انعطاف پذیر باشید. اگر کودک اصرار دارد موقع خواب شیر بخورد به او بدهید تا وقتی که کودک آماده از شیر گرفتن شود. قبل از خواب و صبح هنگام بیدار شدن شیر خودتان را به کودک بدهید. به تدریج وعده های شیر قبل و بعد از ظهر را کم کنید. یعنی فاصله شیر دادن ها را بیشتر نمایید تا خود به خود یک وعده شیردهی حذف شود. طول مدت شیرخوردن در یک وعده را می توانید کوتاه کنید، این کار در کودکان بالای ۲ سال موثر است. در مورد کودکانی که سن بیشتری دارند به تعویق انداختن شیردهی راحت تر است و این کار برای کودکی که بطور نامنظم شیر می خورد مناسب تر است. و بالاخره وعده های شیر خوردن در ساعات شب را به ترتیب یک شب در میان و دو شب در میان کنید تا خود کودک دیگر تقاضای شیر نکند.
- اگر در صندلی یا محل مخصوصی به کودک شیر می دادید دیگر از این محل استفاده نکنید تا کودک به یاد شیر خوردن نیافتد و تقاضای شیر خوردن نکند. برنامه همیشگی روزانه را عوض کنید. مثلاً "اگر او را از مهد کودک بر می دارید به جای اینکه منزل بیایید، به فروشگاه یا پارک بروید تا کودک سرگرم شود و هوس شیر خوردن نکند. سرگرمی های جدید برایش پیدا کنید(مثل خواندن کتاب یا قصه گفتن، اسباب بازی جدید، راه بردن، سواری، مشاهده سایر کودکان) و حواس او را پرت کنید. زمان شیر خوردن او را پیش بینی کنید و یک میان وعده یا یک نوشیدنی مورد علاقه او را به همراه داشته باشید. می توانید او را به محل مورد علاقه اش ببرید تا شیر خوردن را فراموش کند.
- در صورت امکان از سایر افراد خانواده کمک بگیرید. هنگامی که می خواهید شیر دادن وعده صبح را قطع کنید سعی کنید زودتر از او از خواب بیدار شوید تا هنگام بیدار شدن کودک، همسرتان یا یکی دیگر از اعضای آشنای خانواده در کنارش باشد. اگر کودک موقع بیدار شدن شیر می خواهد پدرش کمک کند و او را برای صبحانه همراه خود ببرد و غذای مورد علاقه اش را به او بدهد. غذاهایی که به کودک می دهید سالم و از نظر ارزش غذایی کامل باشد.
- اجازه ندهید کودک شما را بدون لباس ببیند و هوس شیر خوردن کند.

● اگر کودک آشفته است ، گریه می کند و شیر می خواهد و مادر نمی تواند او را به هیچ طریقی آرام کند از شیر گرفتن سریع بوده و یا روش دیگری باید بکار بگیرید.

وضعیت‌های پستان و مشکلات شایع پستانی

شناسایی و چاره‌اندیشی برای این وضعیت‌های مختلف پستانی، برای تسکین مادر و هم‌چنین برای تداوم تغذیه با شیر مادر اهمیت دارد. اگر مادر آلوده به HIV باشد، درمان برخی از این وضعیت‌های پستانی متفاوت خواهد بود که به آن نیز اشاره خواهد شد.

اشکال مختلف پستانی :

بسیاری از مادران نگران شکل پستان‌های شان هستند. مادرانی که پستان‌های کوچکی دارند اغلب نگران هستند که شیر کافی تولید نکنند. تفاوت اندازه پستان‌ها بیشتر ناشی از توده چربی است و نه بافت تولیدکننده شیر. این نکته حائز اهمیت است که به مادر اطمینان دهید صرف نظر از اندازه پستان‌هایش می‌تواند شیر کافی تولید کند. اشکال و اندازه‌های مختلف پستان وجود دارند. شیرخواران می‌توانند تقریباً از تمام آنها تغذیه کنند.



پستان‌های بزرگ و کوچک

به مادر باید اطمینان داده شود که پستان‌های کوچک علی‌رغم اندازه کوچک‌شان می‌توانند به میزان مورد نیاز شیرخوار شیر تولید نمایند. فقط ممکن است لازم باشد دفعات شیردهی را افزایش دهید چرا که این پستان‌ها شیر کمتری ذخیره می‌کنند.

پستان‌های بزرگ؛ به دلیل سنگینی شیر دادن با اشکال صورت می‌گیرد. کمرست متناسب و حمایت‌کننده پستان‌ها در کاهش مشکلات پستان‌های سنگین در طول روز کمک‌کننده است. پوشیدن کمرست در طی شب هم تا زمانی که محدودیتی ایجاد نکند، مفید است. دوشیدن پستان‌ها پس از شیردهی و تخلیه کامل توصیه می‌شود. مادر می‌تواند یک حوله لوله شده را زیر پستان قرار دهد یا در وضعیت خوابیده یا زیربغلی شیر بدهد. موقع شیر دادن پستان را نگهدارد.

درمان نوک پستان های صاف و فرورفته

برای نوک پستان صاف اقدام خاصی لازم نیست. می توان ابتدا مقداری شیر را مستقیم داخل دهان شیرخوار دوشید تا به مکیدن تمایل پیدا کند. با دوشیدن به نرم شدن پستان ها کمک کنید تا شیرخوار بهتر پستان را بگیرد و می توانید شیر را با فنجان به شیرخوار بدهید و شیرخوار را بطور مکرر به پستان بگذارید.

برای نوک پستان فرو رفته به ذیل توجه کنید:

• درمان پیش از زایمان

درمان پیش از زایمان مفید نخواهد بود مثلاً "تمرینات کششی نوک پستان و استفاده از نوک ساز (nipple shells) کمکی نمی کند. اکثر نوک پستان ها در حوالی زمان زایمان ، بدون هیچ درمانی وضع عادی پیدا می کنند. مهم ترین زمان برای کمک ، بلافاصله پس از زایمان است، هنگامی که نوزاد شروع به شیر خوردن می کند.

• به مادر اعتماد به نفس بدهید

به مادر توضیح بدهید گرچه ممکن است این کار در ابتدا کمی مشکل باشد اما با صبر و تحمل موفق خواهد شد . پستان های او بهبود می یابند و در هفته اول یا دوم پس از زایمان نرم تر می شوند . شیرخوار پستان را می مکد نه نوک پستان را ؛ و باید قسمت زیادی از خود پستان در دهانش قرار گیرد . با مکیدن پستان ، به تدریج نوک پستان بیرون می آید . مادر را تشویق کنید تماس پوست با پوست زیادی با شیرخوار برقرار کند و به او اجازه بدهد که خودش پستان را بیابد . به شیرخوار اجازه دهد که هر وقت تمایل داشت خودش پستان را بگیرد. برخی از کودکان خودشان به تنهایی بهتر یاد می گیرند .

• به مادر کمک کنید شیرخوار را در وضعیت صحیح بغل کرده و به پستان بگذارد


اگر کودک، خودش پستان را نمی گیرد ، به مادر کمک کنید شیرخوار را در وضعیت صحیح بغل کند به طوری که او بتواند پستان را بهتر به دهان بگیرد. این کمک باید هر چه زودتر و در روز اول و قبل از آمدن شیر و پر شدن پستان های مادر صورت گیرد . گاهی اوقات ، تغییر دادن وضعیت شیرخوار برای گرفتن پستان باعث می شود که او راحت تر پستان بگیرد . برای مثال برخی مادران در وضعیت زیر بغلی راحت تر هستند . گاهی برجسته کردن نوک پستان قبل از شیر دادن ، به شیرخوار کمک می کند پستان را بهتر بگیرد . گاهی هم فقط تحریک نوک پستان کفایت می کند . روش دیگری نیز به نام روش سرنگ وجود دارد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت . گاهی شکل دادن به پستان کمک می کند که شیرخوار آن را راحت تر بگیرد . برای شکل دادن به پستان ، مادر باید زیر پستان را با انگشتانش بجز شست بگیرد و با انگشت شست هم از بالای پستان فشار ملایمی وارد کند. این فشار باید ملایم باشد و همیشه در یک مکان نباشد.

• اگر شیرخوار در ۲-۱ هفته اول نتوانست پستان را بطور مؤثر بمکد ، به مادر کمک کنید که :

شیرش را بدوشد و کودک را با فنجان تغذیه کند . با دوشیدن شیر به نرم شدن پستان ها کمک کند تا گرفتن پستان برای شیرخوار راحت تر شود و این امر به حفظ تولید شیر کمک می کند. مادر از بطری نباید استفاده کند چون پستان گرفتن را برای شیرخوار مشکل تر می کند ، به جای آن می تواند مقداری شیر را مستقیماً" در دهان شیرخوار بدوشد. این روش برای برخی از مادران کمک کننده است چون بدین طریق اقلاً" نوزاد کمی شیر به طور مستقیم دریافت می کند و کمتر دچار نومییدی شده و به مکیدن تمایل پیدا می کند. مادر باید تماس پوست با پوست با شیرخوار را ادامه داده و به او اجازه بدهد که خودش پستان را به دهان بگیرد .

نحوه آماده کردن و استفاده از سرنگ برای درمان نوک پستان فرورفته


مرحله اول: این قسمت از سرنگ را قطع کنید.



مرحله دوم: پیستون را در طرف بریده شده بگذارید.



مرحله سوم: مادر بعد از قرار دادن سرنگ روی نوک پستان، پیستون را به آرامی می کشد.



پستان های پر و محتقن :

خلاصه ای از تفاوت های بین پستان های پر و محتقن	
پستان های محتقن	پستان های پر
دردناک	گرم
متورم	سنگین
سفت مخصوصاً "نوک پستان ها تحت کشش ،	سفت
پستان ها براق و ممکن است قرمز به نظر برسند	
شیر جریان ندارد	شیر جریان دارد
ممکن است تا ۲۴ ساعت تب وجود داشته باشد	تب وجود ندارد

پستان ها ممکن است در شرایط زیر محقق شوند، اگر :

- بعد از زایمان ، شروع تغذیه با شیر مادر به تاخیر افتد .
- شیرخوار پستان را به درستی نگرفته باشد و در نتیجه پستان به خوبی تخلیه نشود .
- پستان به طور مکرر تخلیه نشود مثلاً" زمانی که شیردهی بر اساس نیاز کودک نباشد .
- طول مدت تغذیه شیرخوار محدود باشد .

از احتقان پستان می توان با این تدابیر پیشگیری کرد : شروع تغذیه با شیر مادر بلافاصله بعد از زایمان ؛ حصول اطمینان از این که وضعیت بغل کردن شیرخوار و پستان گرفتن او صحیح است ، تشویق به نامحدود کردن زمان و دفعات شیردهی . در این صورت شیر در پستان انباشته نخواهد شد .

درمان پستان های محقق

- **"به پستان استراحت ندهید"** . نکته اساسی در درمان احتقان ، تخلیه شیر است . اگر شیر تخلیه نشود ممکن است ماستیت ایجاد شود ، آبه تشکیل شود و نهایتاً" تولید شیر هم کم شود .
- اگر کودک توانائی مکیدن دارد باید به طور مکرر با شیر مادر تغذیه شود . این روش بهترین راه تخلیه شیر از پستان است . به مادر کمک کنید کودک را در وضعیت خوبی به پستان بگذارد تا بتواند آن را خوب بگیرد ؛ در نتیجه پستان را خوب می مکد و نوک پستان آسیبی نخواهد دید .
- اگر کودک نمی تواند بمکد ، به مادر کمک کنید تا شیرش را بدوشد . گاهی اوقات دوشیدن مقدار کمی شیر کفایت می کند تا پستان به اندازه کافی برای مکیدن کودک نرم شود .
- قبل از شیردهی یا دوشیدن شیر ، رفلکس اکسی توسین مادر را تحریک کنید . اقداماتی که مادر می تواند انجام دهد یا کمک هائی که می توانید به او بکنید عبارتند از :
 - کمپرس گرم روی پستان های مادر بگذارید .
 - پشت و گردن مادر را ماساژ دهید .
 - پستان های ماد ر را به آرامی ماساژ دهید .
 - پستان و نوک پستان را تحریک کنید .
 - به مادر کمک کنید تا راحت و آسوده باشد .
 - بعضی اوقات دوش آب گرم یا حمام کردن ، شیر را از پستان ها جاری می کند و آنها را تا حدی نرم می کند که نوزاد بتواند بمکد .
- پس از شیردهی هم کمپرس سرد روی پستان ها بگذارید . این کار تورم و درد را کم خواهد کرد. گذاشتن برگ کلم روی پستان ها به مدت ۱۵ دقیقه ۳ تا ۴ بار در روز کمک کننده است. بدین ترتیب که ابتدا برگ های کلم را جدا کنید، آن را کاملاً شسته و خشک نموده و در یخچال بگذارید. پس از خنک شدن قسمت وسط یک برگ را به اندازه نوک پستان جدا کرده، سپس برگ کلم را روی پستان بگذارید.
- چنانچه احتقان در هاله پستان باشد گذاشتن دو انگشت در بالا و پایین نوک پستان و فشار روی آن برای چند ثانیه در کاهش احتقان نوک پستان مؤثر است. ماساژ گردن و پشت و ماساژ ملایم پستان ها کمک کننده است. در صورت شدید بودن درد، مسکن استفاده نمایید.

- به مادر اطمینان خاطر و توضیح دهید که به زودی قادر به تغذیه شیرخوار به راحتی با شیر خودش خواهد شد.

ماستیت :

مادر مبتلا به ماستیت احساس بیماری می کند، تب و درد شدید دارد . قسمتی از پستان متورم و سفت است و پوست روی آن قرمز است.

گاهی اوقات ماستیت با احتقان پستان اشتباه گرفته می شود . اما احتقان تمام پستان و اغلب هر دو پستان را گرفتار می کند در حالی که در ماستیت فقط قسمتی از پستان و معمولا فقط یک پستان مبتلا می شود.


ماستیت ممکن است در پستان محتقن و یا به دنبال انسداد مجرا ایجاد شود . انسداد مجرا زمانی ایجاد می شود که شیر بخشی از پستان برداشت نشود . گاهی هم به این علت اتفاق می افتد که مجرای قسمتی از پستان توسط شیر غلیظ شده مسدود می گردد . علائم آن عبارتند از : وجود یک توده دردناک که گاهی پوست روی آن قرمز است اما مادر تب ندارد و حال عمومی وی نیز خوب است .

وقتی شیر در قسمتی از پستان به دلیل انسداد مجرا یا احتقان متوقف می شود ، اصطلاحاً "توقف شیر" نامیده می شود . اگر باز هم شیر تخلیه نشود سبب التهاب بافت پستان شده اصطلاحاً "ماستیت غیر عفونی" گفته می شود . گاهی هم پستان توسط باکتری ها عفونی می شود که ماستیت عفونی نامیده می شود .

البته تنها با تکیه بر نشانه های بالینی نمی توان گفت ماستیت عفونی است یا غیر عفونی ؛ با این وجود اگر تمام نشانه ها شدید باشند به احتمال زیاد به درمان آنتی بیوتیکی نیاز خواهد بود .


علائم انسداد مجرا و ماستیت

ماستیت عفونی → ماستیت غیر عفونی → توقف شیر → مجرای بسته



- توده
- حساس
- قرمزی موضعی
- بدون تب
- احساس سلامت

پیشرفت به



- ناحیه سفت
- احساس درد
- ناحیه قرمز
- تب
- احساس بیماری

تخلیه ناکافی **تمام** بخش های پستان شاید به دلیل مکرر نبودن شیردهی و یا مکیدن نادرست باشد . عدم تکرر شیردهی در موارد زیر ممکن است پیش بیاید : مادر خیلی گرفتار است ، وقتی که شیرخوار به دفعات کمتری شیر می خورد مثلاً " تمام شب را می خوابد ، تغییر الگوی تغذیه به دلیل دیگری مثلاً" مادر سر کار برگردد . مکیدن غیر مؤثر معمولاً در اثر پستان گرفتن نادرست شیرخوار است .

تخلیه ناکافی **قسمتی** از پستان ممکن است ناشی از موارد زیر باشد : مکیدن نادرست و غیر مؤثر پستان ، فشار ناشی از لباس های تنگ به خصوص اگر مادر شب از سینه بند استفاده کند ، فشار انگشتان مادر که جریان شیر را هنگام شیردهی مسدود کند . اگر شیرخوار هنگام شیرخوردن وضعیت صحیحی نداشته باشد و به خوبی پستان را در دهان نگرفته باشد و یا مکیدن خوبی نداشته باشد، ممکن است نوک پستان ها دچار شقاق شده و راهی برای ورود باکتری ها به بافت پستان باز شود و این امر منجر به ایجاد ماستیت گردد .

درمان انسداد مجرا

مهم ترین قسمت درمان ، اصلاح وضعیت تخلیه شیر از قسمت مبتلای پستان می باشد . یک مجرای بسته باید فوراً درمان شود تا از عوارضی مانند التهاب پستان و تشکیل آبسه جلوگیری گردد

علت تخلیه ناکافی را جستجو و آن را اصلاح کنید :

- مشاهده برای تشخیص خوب نگرفتن پستان در دهان
- مشاهده برای تشخیص فشار ناشی از لباس ها و سینه بند سفت
- توجه به انگشتان مادر هنگام شیردهی. آیا هاله پستان را با انگشتان خود نگه داشته است و باعث انسداد احتمالی جریان شیر شده ؟

خواه علت را پیدا کرده باشید یا نه ، موارد زیر را به مادر توصیه کنید که در هر دو حالت انسداد مجرا و ماستیت موثر است :

- **مکرر شیر بدهد .**
- بهترین روش این است که مادر کنار شیرخوارش استراحت کند تا بتواند به نیازهای او پاسخ دهد و هر وقت که تمایل داشت به او شیر بدهد .
- **هم زمان با مکیدن شیرخوار ، پستان را به آرامی ماساژ دهید .**
- به او نشان دهید که چگونه از قسمت بالای ناحیه انسداد و مجرای مسدود شده به سمت نوک پستان ماساژ بدهد این کار به برطرف کردن انسداد مجرا کمک می کند . مادر ممکن است متوجه خروج توده سفتی به همراه شیر گردد ؛ اگر شیرخوار این تکه ها را بلعد هیچ خطری برای او ندارد .
- **بین وعده های شیردهی کمپرس گرم روی پستان بگذارید .**
- **گاهی رعایت موارد زیر کمک کننده است :**
- **شیردهی را از پستان مبتلا شروع کنید تا تخلیه موثر را تقویت کند.**
- اما اگر فکر می کنید درد مانع رفلکس اکسی توسین شده است، شروع شیردهی از پستان سالم ممکن است کمک کننده باشد. وقتی که رفلکس اکسی توسین به کار افتاد می توانید پستان را عوض کرده و از پستان مبتلا شیر بدهید .

- در هر بار تغذیه با شیر مادر، شیردهی را در وضعیت های مختلف انجام دهید . این کار به تخلیه یکنواخت شیر از قسمت های مختلف پستان کمک خواهد کرد . به مادر نشان دهید به جای این که همیشه شیرخوار را بغل کرده و مقابل خود قرار داده و شیر بدهد ، چگونه از وضعیت زیربغلی یا درازکش هم استفاده کند . به هر حال وضعیت شیردهی نباید برای مادر ناراحت کننده باشد .

درمان ماستیت :

از مهم ترین اقدامات برای درمان ماستیت، تخلیه مکرر شیر از پستان است زیرا در اثر ماندن شیر در پستان، عفونت تشدید می شود. علاوه بر توصیه های فوق که در درمان ماستیت هم موثر است ، چون مادر به مصرف آنتی بیوتیک نیز نیاز دارد، بنابراین مراجعه به پزشک الزامی است. اگر درمان ماستیت زود شروع نشود و یا کامل نباشد می تواند منجر به آبسه پستان گردد.

- گاهی اوقات ، مادر دوست ندارد شیرخوار را از پستان مبتلا به خصوص اگر درد ناک باشد شیر بدهد . گاهی هم شیرخوار از خوردن شیر از پستان عفونی شده امتناع می ورزد که احتمالا به دلیل تغییر در طعم شیر است . در چنین مواردی دوشیدن شیر ضرورت پیدا می کند . اگر شیر در پستان باقی بماند، احتمال ایجاد آبسه زیاد است .
 - معمولا وقتی تخلیه شیر از قسمت مبتلای پستان اصلاح شد ، انسداد مجرا یا ماستیت نیز در عرض یک روز بهبود می یابد . تخلیه و دوشیدن پستان پس از هر تغذیه مهم است.
 - در صورت نیاز می توان مسکن (استامینوفن یا بروفن) مصرف کرد.
 - کمپرس گرم پستان (استفاده از آب یا حوله گرم برای افزایش جریان شیر) قبل از شیردهی و کمپرس سرد (قرار دادن تکه یخ در حوله تمیز روی پستان) بعد از شیر دادن مفید خواهد بود . در فواصل شیردهی نیز روی قسمت درگیر کمپرس سرد و یا گرم (هر کدام راحت تر است) بگذارد.
 - اگر درد یا التهاب علی رغم توصیه های گفته شده بهبود نیافت باید به پزشک مراجعه کنید.
- بطور کلی سه عامل مهم در درمان ماستیت: استراحت - مصرف مایعات فراوان و تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشک است.

در صورت وجود هر یک از موارد زیر مادر به درمان اضافی نیاز دارد :

- وجود علائم شدید در اولین ملاقات شما با مادر ؛ یا
 - وجود شقاق که می تواند محل ورود باکتری باشد ؛ یا
 - عدم بهبودی ۲۴ ساعت پس از اصلاح تخلیه پستان .
- مادر را درمان کرده و یا برای دریافت آنتی بیوتیک و ضد درد (بروفن) و سایر موارد ارجاع دهید .

درمان با آنتی بیوتیک برای ماستیت عفونی

شایعترین باکتری عامل ایجاد آبسه، استافیلوکوک اورئوس است. بنابراین ضروری است که عفونت های پستان با آنتی بیوتیک مقاوم به پنی سیلیناز مانند اریترومایسین یا فلوکلوکساسیلین درمان شود.

دارو	دوز درمانی	دستورالعمل
فلو کلوکسا سیلین flucloxacilin	۲۵۰ میلی گرم خوراکی ، هر ۶ ساعت ، به مدت ۱۰ - ۷ روز	دارو را ۳۰ دقیقه قبل از غذا بدهید .
اریترومایسین	۲۵۰ - ۵۰۰ میلی گرم خوراکی ، هر ۶ ساعت ، به مدت ۱۰ - ۷ روز	دارو را ۲ ساعت پس از غذا بدهید .

شقاق نوک پستان :

شایع ترین علت زخم و شقاق نوک پستان ، خوب پستان نگرفتن توسط شیرخوار است . اگر شیرخوار پستان را خوب نگرفته باشد ، نوک پستان هم زمان با مکیدن شیرخوار از دهان او داخل وخارج می شود و در نتیجه پوست پستان با دهان شیرخوار اصطکاک می یابد . این عمل برای مادر بسیار دردناک است . در ابتدا شقاق وجود ندارد و نوک پستان ممکن است سالم به نظر بیاید و یا وقتی شیرخوار پستان را رها می کند نوک آن له شده بنظر می آید و یک خطی روی آن دیده می شود . اگر این روند ادامه پیدا کند نوک پستان آسیب می بیند و شقاق به وجود می آید .

اگر مادر دچار زخم یا شقاق نوک پستان شده با تغییر دادن وضعیت پستان گرفتن شیرخوار به او کمک کنید تا پستان را خوب بگیرد . به مادر توصیه کنید پستان هایش را بیش از یک بار در روز نشوید، از صابون استفاده نکند و با حوله پستان هایش را سفت مالش ندهد. شستشوی زیاد ، چربی طبیعی پوست را از بین می برد و احتمال ایجاد زخم را بالا می برد . به مادر توصیه کنید بعد از شیردهی کمی از شیرش را دوشیده و با انگشت آن را روی نوک پستان و آرئول بمالد . این کار به بهبود زخم کمک می نماید .

پدیده رینود باعث سردی و حسلس شدن پستان می شود. علاوه بر گرم نگه داشتن پستان می توان از پماد نیتروگلیسیرین موضعی یا از قرص نیفیدبین استفاده کرد.

آبسه پستان

درمان آبسه نیز شبیه ماستیت است اما ممکن است برای تخلیه چرک نیاز به شکافتن آبسه هم باشد.

- به طور کلی تغذیه شیرخوار با شیر مادر از پستان مبتلا منعی ندارد مگر این که آبسه به مجاری شیر سر باز کرده باشد. البته معمولاً آبسه به بیرون از نسج پستان باز می شود.
- اگر آبسه پستان شکافته شود و شکاف نزدیک به نوک پستان نباشد ادامه تغذیه از پستان مبتلا بدون اشکال است اما اگر محل شکاف به نوک پستان و هاله نزدیک باشد می توانید مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت شیر آن پستان را بدوشید و دور بریزید ولی تغذیه کودک را از پستان دیگر ادامه دهید.
- به تغذیه شیرخوار از پستان سالم ادامه دهید و پستان آبسه دار را بدوشید. در مواردی که آبسه شکافته شده و از نوک آن چرک همراه شیر جاری است شیردهی از این پستان تا زمانی که درمان آنتی بیوتیکی شروع شود و دیگر چرک همراه شیر از آن ترشح نشود به طور موقت (معمولاً ۲-۳ روز) مجاز نیست. شیر این پستان باید هر ۴ ساعت (۶ بار در روز) دوشیده و دور ریخته شود تا تولید شیر برقرار بماند.

- هم چنین دوشیدن شیر از بسته شدن مجاری شیر که یک عارضه غیر قابل اجتناب در آبه های عمیق است پیشگیری می کند. در این زمان باید شیرخوار را از پستان دیگر که سالم است شیر داد.

عفونت کاندیدایی (برفک)

دومین علت شایع زخم نوک پستان ها ، عفونت کاندیدایی است که اصطلاحاً " به آن برفک گفته می شود . عفونت کاندیدایی پوست نوک پستان را زخم و خارش ایجاد می کند. این عفونت اغلب به دنبال درمان ماستیت و سایر عفونت ها با آنتی بیوتیک ایجاد می شود. برخی مادران آن را به صورت احساس سوزش و تیر کشیدن بعد از شیردهی توصیف می کنند و یا ممکن است مادر احساس کند سوزن در پستانش فرو می رود .

اگر نحوه پستان گرفتن شیرخوار خوب است و با این وجود زخم نوک پستان ادامه پیدا کرد حتماً" به فکر کانیدیا باشید و از نظر برفک، شیرخوار را کنترل کنید . ممکن است لکه های سفیدی داخل گونه و یا روی زبان او پیدا کنید . او ممکن است این لکه ها را در مقعد خود نیز داشته باشد.

مادر و کودک هر دو را با نیستاتین درمان کنید. به مادر توصیه کنید دیگر از پستانک (گول زنک) استفاده نکند .

درمان عفونت کاندیدایی پستان ها

- کرم نیستاتین ، ۱۰۰۰۰۰ (IU/g) : روزی ۴ بار بعد از شیر دادن روی نوک پستان ها مالیده شود. تا ۷ روز بعد از خوب شدن ضایعات درمان ادامه داشته باشد.
- سوسپانسیون نیستاتین، ۱۰۰۰۰۰ (IU/ml) روزی ۴ بار و هر بار یک میلی لیتر بعد از شیر دادن در دهان شیرخوار ریخته شود به مدت ۷ روز ؛ یا تا زمانی که درمان مادر ادامه دارد . اگر از سر شیشه ، پستانک و حفاظ پستان Nipple Shields استفاده می شود، آنها را منع کنید.

درمان مشکلات پستانی در مادران آلوده به HIV

بطور کلی طبق دستورعمل کشوری اگر ثابت شده که مادر HIV مثبت است توصیه می شود که شیر ندهد و شیرخوار شیرمصنوعی (در صورت در دسترس بودن، ایمن ، قابل قبول و عملی بودن) تغذیه شود . اما اگر مادر شیر می دهد باید حتماً تغذیه انحصاری با شیرمادر داشته باشد و دادن شیرمصنوعی بپرهیزد. گاه مادر شیردهی را شروع کرده و می خواهد آنرا قطع کند. و یا هنگام شیردهی دچار مشکلات پستانی می شود. درمان سریع برای پیشگیری از انتقال به شیرخوار ضروری است و توجه به نکات زیر لازم است از جمله:

احتقان پستان در مادر آلوده به HIV که شیردهی را قطع می کند :

درمان احتقان پستان را در مادرانی بحث کردیم که آنها را برای تداوم شیردهی کمک می کنیم اما احتقان ممکن است در مادرانی که می خواهند شیردهی شان را قطع کنند مثل مادر آلوده به HIV که شیردهی را شروع کرده و می خواهد خیلی زود شیردهی اش را قطع کند، نیز پیش بیاید. وقتی مادر سعی به قطع شیردهی دارد، باید شیر را فقط تا حدی بدوشت که

درد را کم کند اما تولید شیر را افزایش ندهد. برای احساس راحتی مادر، شاید لازم باشد وقتی که پستان‌ها پر از شیر هستند چند بار در روز دوشیده شوند. درمان‌های دارویی برای کاهش تولید شیر توصیه نمی‌شوند. در هر حال شاید استفاده از یک ضد درد ساده مثل بروفن التهاب را کم کند و به احساس راحتی مادر حین کاهش تولید شیر کمک کند. اگر بروفن در دسترس نیست می‌توان استامینوفن استفاده کرد.

درمان ماستیت در مادر آلوده به HIV:

ماستیت در مادر HIV مثبت، ممکن است احتمال انتقال HIV را به شیرخوار افزایش دهد. بنابراین توصیه به افزایش دفعات و مدت زمان شیردهی در این خانم‌ها مناسب نمی‌باشد.

اگر مادر HIV مثبت دچار ماستیت گردد، تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد باید از شیردهی از پستان مبتلا پرهیز کند. این توصیه در مورد ابتلا به آبنه نیز صدق می‌کند.

جهت اطمینان از تخلیه کافی شیر، باید شیر پستان مبتلا را بدوشد. پیشگیری از بدتر شدن وضعیت پستان بسیار ضروری است تا به بهبودی پستان و تداوم تولید شیر کمک کند. کارمند بهداشتی باید به مادر کمک کند تا اطمینان یابد که می‌تواند شیرش را به خوبی بدوشد.

اگر فقط یک پستان مبتلا شده، شیرخوار را می‌توان از پستان سالم به دفعات بیشتر و به مدت طولانی‌تر تغذیه کرد تا تولید شیر افزایش یابد. به این ترتیب اغلب شیرخواران، شیر کافی از یک پستان دریافت می‌کنند. بعد از بهبودی پستان مبتلا، از آن پستان هم می‌توانند شیر بخورند.

اگر هر دو پستان‌ها مبتلا باشند، مادر قادر به شیردهی از هیچ کدام نمی‌باشد و باید شیر را از هر دو پستان بدوشد و وقتی که بهبود یافتند می‌تواند شیردهی را از سر بگیرد.

هم زمان در مورد سایر روش‌های تغذیه‌ای با مادر بحث کنید. مادر شاید بخواهد شیر دوشیده شده‌اش را حرارت بدهد و یا با شیر مصنوعی شیرخوار را تغذیه کند. در چنین مواقعی باید شیرخوار را با فنجان تغذیه کرد.

برای جلوگیری از عود مشکل، آنتی‌بیوتیک به مدت ۱۴ - ۱۰ روز تجویز کنید. مسکن هم تجویز نمائید و مانند مادران غیر آلوده به HIV توصیه به استراحت نمائید.

گاهی اوقات ممکن است مادر در صورت دسترسی به سایر شیرها و اطمینان از ایمنی آن‌ها تصمیم به قطع شیردهی خود بگیرد. در این صورت برای این که پستان‌ها فرصت بهبودی داشته باشند و سالم نگه داشته شوند، مادر باید به دوشیدن شیر کافی از پستان‌ها یش ادامه دهد تا زمانی که تولید شیر متوقف شود.

درمان فوری برفک دهان شیرخوار و برفک پستان مادران آلوده به HIV، از اهمیت خاصی برخوردار است.

فصل ۸

مشکلات شایع شیردهی

حتی اگر مادر قبل از تولد کودک تصمیم به تغذیه انحصاری او با شیر مادر گرفته باشد ، برای قطع شیردهی یا شروع تغذیه توام دلایل زیادی وجود دارد.

وقتی به مادری که مشکلی دارد کمک می کنید لازم است مهارت هایی را که تاکنون آموخته اید ، بکار ببرید. مشاورین غیر حرفه ای و کارکنان بهداشتی جامعه نقش مهمی در حمایت از مادران مشکل دار دارند . چون ممکن است مادران برای دریافت کمک به تسهیلات بهداشتی مراجعه نکنند.

ناکافی بودن شیر:

یکی از شایع ترین علل قطع شیردهی این است که مادر فکر می کند شیر کافی ندارد. تقریباً تمام مادران می توانند برای یک یا حتی دو کودک شیر تولید کنند. حتی وقتی مادر تصور می کند شیر کافی ندارد تمام نیازهای کودکش برآورده می شود.

البته گاهی اوقات کودک شیر کافی نمی خورد اما معمولاً به این دلیل است که مکیدن کافی یا مؤثری ندارد و در موارد نادری هم به دلیل تولید ناکافی شیر توسط مادر می باشد . لذا این نکته حائز اهمیت است که فکر نکنیم مادر چقدر شیر می تواند تولید کند بلکه به فکر این باشیم که شیرخوار چقدر شیر از پستان مادر برداشت می کند .

علائم معتبری که نشان می دهد ، شیرخوار به اندازه کافی شیر دریافت نمی کند:

- وزن گیری ناکافی : (کمتر از ۵۰۰ گرم در ماه)
- دفع مقدار کم و غلیظ ادرار: (دفع ادرار کمتر از ۶ بار در روز)

در ۶ ماه اول زندگی ، شیرخوار افزایش وزنی به اندازه حداقل ۵۰۰ گرم در ماه دارد . (یک کیلو گرم در ماه ضروری و معمول نیست) اگر شیرخوار افزایش وزنی کمتر از ۵۰۰ گرم در ماه داشته باشد ، به اندازه کافی وزن نگرفته است .

کودکی که به طور انحصاری با شیرمادر تغذیه می شود ، معمولاً حداقل ۸ – ۶ بار در ۲۴ ساعت ادرار رقیق دفع می کند. اگر کودکی به همراه شیر مادر ، مایعات دیگری مانند آب هم دریافت کند دفع مقادیر زیاد ادرار نباید این اطمینان را ایجاد کند که شیر به اندازه کافی دریافت می کند .

علائم احتمالی که نشان می دهد ، شیرخوار به اندازه کافی شیر دریافت نمی کند:

- بعد از شیرخوردن راضی به نظر نمی رسد .
- اغلب گریه می کند .
- به دفعات خیلی مکرر از پستان تغذیه می شود.
- تغذیه های خیلی طولانی از پستان دارد.
- از پستان گرفتن امتناع می کند.
- مدفوع سفت ، خشک یا سبز رنگ دارد .
- به دفعات کم و به مقدار کم مدفوع دارد .
- هنگامی که مادر پستان هایش را می دوشد ، شیر نمی آید.
- پستان ها به اندازه کافی بزرگ نشده اند (در طی دوران حاملگی)
- مادر به شیر نیامده است . (پس از زایمان)

تعدادی علائم **احتمالی** دال بر کافی نبودن دریافت شیر توسط شیرخوار وجود دارد . اگرچه این علائم ممکن است مادر را آشفته کند اما ممکن است این علائم دلایل دیگری داشته باشند ، بنابراین قابل اعتماد نیستند . مثلاً " ممکن است شیرخوار در حالی که شیر زیادی هم خورده است اما به دلیل کولیک مدام گریه کند .

دلایلی که ممکن است شیرخوار شیر کافی دریافت نکند :			
وضعیت شیرخوار	عوامل مربوط به مادر		عوامل مربوط به تغذیه با شیرمادر
	وضعیت جسمانی مادر	عوامل روانی مادر	
بیماری ناهنجاری	قرص های پیشگیری از بارداری و دیورتیک ها بارداری سوء تغذیه شدید الکل دخانیات باقیمانده قسمتی از جفت(نادر) عدم تکامل پستان ها(خیلی نادر)	عدم اعتماد به نفس نگرانی ، استرس تنفر از شیردهی امتناع کودک خستگی	شروع با تاخیر شیردهی با فواصل منظم و سر ساعت عدم تکرر شیردهی عدم شیردهی در شب تغذیه های کوتاه مدت وضعیت نامناسب پستان به دهان گرفتن استفاده از بطری ، گول زنک مصرف سایر غذاها مصرف سایر مایعات (آب ، چای)
عوامل این دو ستون شایع نیستند		عوامل این دو ستون شایع هستند	

دلایل دو ستون اول (تغذیه با شیرمادر و عوامل روانی مادر) شایع هستند .
دلایل دو ستون بعدی (وضعیت جسمانی مادر و وضعیت شیرخوار) شایع نیستند یعنی کاهش تولید شیر به دلیل مشکلات جسمی مادر شایع نمی باشد.

چگونه به مادرانی که " شیر کافی ندارند " کمک کنید؟

در ابتدا (به کمک علائم معتبر) مشخص کنید که آیا کودک واقعا " شیر کافی دریافت می کند یا خیر . اگر دریافت شیر او کافی نیست باید علت را مشخص کنید و پس از آن می توانید به مادر کمک کنید . اگر دریافت شیر کافی است ولی مادر بر خلاف آن تصور می کند، باید علت تردید مادر نسبت به کفایت شیرش را مشخص کنید تا بتوانید به او اعتماد به نفس بدهید.

چگونه به مادرانی که شیر خواران شان شیر کافی دریافت نمی کنند، کمک کنید: دریافت ناکافی شیر

از مهارت های مشاوره برای گرفتن شرح حال تغذیه ای بطور مطلوب استفاده کنید . یک وعده تغذیه با شیر مادر را برای کنترل وضعیت بغل کردن شیرخوار برای شیرخوردن ، نحوه پستان گرفتن او و پی بردن به برقراری تماس عاطفی یا امتناع شیرخوار از شیرخوردن ارزیابی کنید. از مهارت های مشاهده برای تعیین بیماری یا ناهنجاری جسمی مادر یا کودک استفاده کنید . بر اساس علل کافی نبودن شیر، چند پیشنهاد به مادر ارائه دهید . بطور مداوم ترتیب دیدار مجدد با مادر را بدهید . در صورت امکان تا زمانی که کودک وزن بگیرد و مادر اعتماد به نفس پیدا کند هر روز آن دو را ببینید . وزن گیری کودک ممکن است ۷ - ۳ روز طول بکشد .

چگونه به مادرانی که شیر خواران شان شیر کافی دریافت می کنند اما آن ها تصور می کنند که شیر کافی ندارند کمک کنید؟

از مهارت های مشاوره برای گرفتن شرح حال تغذیه ای بطور مطلوب استفاده کنید . سعی کنید دریابید که علت شک مادر به کافی نبودن شیرش ، چه می تواند باشد . نظرات و احساسات مادر راجع به شیرش و نیز فشاری که از جانب اطرافیان به خاطر شیردهی به مادر وارد می شود را جویا شوید . تغذیه با شیر مادر را برای کنترل وضعیت شیرخوار هنگام شیرخوردن ، پستان گرفتن او و برای پی بردن به برقراری تماس عاطفی یا امتناع شیرخوار از شیرخوردن ارزیابی کنید . مادر را به خاطر موارد درستی که در تکنیک شیردهی و رشد و تکامل کودکش رعایت کرده است تایید و تشویق کنید . عقاید اشتباه مادر را هم بدون اینکه انتقاد تندی داشته باشید اصلاح کنید . بطور مداوم ترتیب دیدار مجدد با مادر را بدهید . این احتمال وجود دارد که این مادران تغذیه شیرخوار با سایر غذاها و مایعات را شروع کنند و لذا نیاز به حمایت زیادی دارند تا اعتماد بنفس خود را مجدداً به دست آورد.

گریه کردن شیرخوار

حال به یکی دیگر از علل شایع قطع شیردهی توسط مادران ، یعنی گریه شیرخوار می پردازیم . بسیاری از مادران به دلیل این که شیرخوارشان زیاد گریه می کند دادن غذا و مایعات غیر ضروری را شروع می کنند . این مادران فکر می کنند که شیر شان ناکافی و کودکشان گرسنه است . با این وجود اغلب نه تنها دادن غذا و مایعات اضافی گریه شیرخوار را کم نمی کند ، بلکه گاهی اوقات بیشتر باعث گریه و بی قراری او می شود .

گریه زیاد یک شیرخوار می تواند باعث آشفتگی ارتباط او و مادرش و یا سبب اضطراب و بحران روحی سایر افراد خانواده شود . مهم ترین راه کمک به مادر شیرده ، مشاوره با او درباره گریه شیرخوارش است .

دلایل گریه شیرخواران

- راحت نبودن (کثیف بودن ، گرم بودن ، سرد بودن)
- خستگی (ملاقات بیش از اندازه بستگان)
- بیماری یا درد (الگوی گریه شیرخوار تغییر می کند)
- گرسنگی (به اندازه کافی شیر دریافت نمی کند ، جهش رشد)
- غذای مادر (هر نوع ماده غذائی ، گاهی اوقات شیرگاو)
- داروهای که مادر مصرف می کند(کافئین ، سیگار ، داروهای دیگر)
- اسپاسم و قولنج شیرخوار
- شیرخواران با نیاز زیاد

علل گریه کردن شیرخوار :

گرسنگی ناشی از جهش رشد :

شیرخوار ممکن است در زمان های خاصی خیلی گرسنه بنظر برسد. احتمالاً به این دلیل که نسبت به قبل سریع تر رشد می کند و تقاضای او برای شیر خوردن بیشتر شده است. این سرعت رشد در سنین حدود ۲ هفتگی ، ۶ هفتگی و ۳ ماهگی شایع تر است، ولی می تواند در مواقع دیگر نیز رخ دهد. اگر کودک در طی این زمان ها برای چند روزی به دفعات بیشتری پستان مادر را می مکد ، شیر بیشتری هم تولید می شود و سپس شیر خوردن او به روال عادی گذشته بر می گردد.

غذای مادر :

گاهی اوقات مادر متوجه می شود که وقتی غذای خاصی مصرف می کند ، کودک او آشفته و بی قرار می شود . زیرا موادی از آن غذا وارد شیر او می شود . معمولاً با هر غذایی ممکن است این حالت ایجاد شود . لذا نمی توان اجتناب از غذاهای خاصی را به مادران توصیه کرد ، مگر اینکه واقعاً با خوردن غذایی متوجه مشکلی بشوند.

قولنج :

بعضی از شیرخواران ممکن است بدون هیچ یک از علل فوق ، باز هم گریه کنند . گاهی اوقات گریه کردن یک الگوی واضح دارد. شیر خوار در ساعات مشخصی از روز و اغلب بعداز ظهر ها (غروب) ، مدام گریه می کند. شیرخوار مثل اینکه درد شکم داشته باشد پاهایش را جمع می کند و ممکن است به نظر بیاید تمایل به مکیدن دارد ولی آرام کردن او مشکل است. شیرخوارانی که به این صورت گریه می کنند ، ممکن است روده پر سرو صدا و یا حاوی گاز داشته باشند که دلیل آن روشن نیست . این مشکل درد " قولنج " نامیده می شود. شیرخواران قولنجی معمولاً خوب رشد می کنند و گریه هایشان بعد از ۳ ماهگی کم می شود.

شیرخواران با نیاز زیاد:

بسیاری از شیرخواران بیش از دیگران گریه می کنند و نیاز بیشتری به بغل کردن و راه بردن دارند . در جوامعی که مادران شیرخواران شان را همراه خود حمل می کنند ، نسبت به جوامعی که آنها را ترک می کنند و یا در تخت های جدا می خوابانند ، گریه شیرخوار کمتر است .

نحوه کمک به مادرانی که شیرخواران شان زیاد گریه می کنند

مانند موارد " کافی نبودن شیر " باید علت را پیدا کنید تا بتوانید به مادر کمک کنید . از مهارت های مشاوره برای گرفتن شرح حال تغذیه ای بطور مطلوب استفاده کنید . به مادر کمک کنید که احساساتش را بیان کند. ممکن است مادر خسته ، ناامید و عصبانی باشد .

نظر او را در باره علت مشکل و احساسی که نسبت به کودکش دارد بپذیرید . سعی کنید فشارهایی که از جانب اطرافیانش وارد می شود و همچنین تصور او را در باره علت گریه کودکش بفهمید .

شیردهی او را ارزیابی کنید و وضعیت مکیدن کودک و طول زمان شیرخوردن او را کنترل نمایید . مطمئن شوید که شیرخوار بیمار نیست و درد ندارد. رشد او را کنترل کنید و در صورت لزوم او را ارجاع دهید . بر حسب شرایط مادر را برای رشد خوب کودک، بیمار و نق نبودن او تحسین نمایید . به او نشان دهید چگونه کودکی که گریه می کند را بغل کند و او را آرام کند. اطلاعات مناسبی به تناسب شرایط به او بدهید .

نحوه بغل کردن شیرخوار دچار کولیک



بغل کردن شیرخوار در طول ساعد



دستها را دور شکم شیرخوار حلقه کرده و روی دامن خود بنشانید



پدر ، شیرخوار را مقابل سینه خود بغل نماید

امتناع شیرخوار از گرفتن پستان مادر

امتناع شیرخوار از گرفتن پستان، گر چه اکثر اوقات برطرف می‌شود اما یک علت شایع قطع شیردهی است. امتناع کودک می‌تواند باعث پریشانی زیاد مادر شود و احساس کند که فرزندش او را نمی‌خواهد پس نسبت به شیردهی مایوس خواهد شد.

انواع مختلف امتناع شیرخوار از گرفتن پستان عبارتند از :

- گاهی اوقات شیرخوار پستان را می‌گیرد، اما نمی‌تواند خوب بمکد یا شیر را قورت دهد یا مکیدن او خیلی ضعیف است .
- گاهی اوقات شیرخوار ، هنگامی که مادرش سعی می‌کند پستانش را در دهان او بگذارد و شیر دهد، گریه می‌کند و پستان را نمی‌گیرد و مثل اینکه با پستان می‌جنگد.
- گاهی شیرخوار برای یک دقیقه می‌مکد و سپس با احساس خفگی پستان را رها می‌کند و یا گریه می‌کند، او ممکن است این عمل را در هر وعده شیر خوردن چندین بار انجام دهد.
- گاهی اوقات شیرخوار یک پستان را می‌گیرد، ولی از گرفتن پستان دیگر امتناع می‌کند.

شما باید علل امتناع کودک از شیر خوردن را تشخیص دهید و از چگونگی کمک به مادر و شیرخوار آگاه باشید تا دوباره شیردهی برقرار و برای مادر و کودک لذت بخش شود.

بسیاری از علل شایع امتناع شیرخوار به یکی از موارد زیر مربوط می شود :

- شیرخوار بیمار است ، درد دارد یا دچار رخوت ناشی از داروهای مسکن است .
- اشکالی در تکنیک شیردهی وجود دارد .
- تغییراتی منجر به آشفتگی شیرخوار شده است .
- امتناع از شیرخوردن ، ظاهری و غیر واقعی است.

بسته به سن شیرخوار علل امتناع از پستان و در نتیجه روش های تشویق او به گرفتن پستان متفاوت است :

- اگر نوزاد از روز اول پستان مادر را نگیرد باید از نظر تمام مشکلات پزشکی و بیماری‌ها معاینه شود: مثل شکستگی ها و احساس درد، خواب آلودگی در اثر داروهای تجویز شده برای مادر موقع زایمان و کاهش قدرت مکیدن نوزاد، با خشونت جابه‌جا کردن یا فشردن نوزاد به پستان در تغذیه‌های اول و در نتیجه بی‌زاری وی از پستان، وضعیت نادرست بغل کردن و گرفتن پستان باید مورد توجه قرار گیرند.
- در روزهای دوم تا چهارم، احتقان پستان مادر، بازتاب قوی جهش شیر (رگ کردن شدید پستان) و یا تأخیر یا مهار آن را باید در نظر گرفت.
- اگر امتناع در بین هفته‌های اول تا چهارم عمر باشد، می تواند بععل سردرگمی در گرفتن پستان(بخاطر استفاده از بطری و پستانک)، زخم نوک پستان ناشی از وضعیت نادرست شیردهی، احتقان پستان مادر، برفک دهان، عفونت گوش نوزاد، حساسیت به مواد غذایی یا دارویی خورده شده توسط مادر و تغییر مزه شیر باشد.
- شیرخوار در سن یک تا ۳ ماهگی ممکن است به علت دل دردهای قولنجی(کولیکی) در موقع شیرخوردن، از گرفتن پستان امتناع نماید. از سن ۳ ماهگی به بعد امتناع او می تواند بععل کاهش تمایل به شیر خوردن در اثر مصرف زودتر از موعد غذایی کمکی، آب میوه یا آب و همچنین در شیرخواران بزرگتر به علت مصرف بیش از معمول غذا، یا آشفتگی و بازیگوشی شیرخوار و توجه بیشتر او به محیط اطراف و یا دندان درآوردن باشد.

دانستن این که شیرخوار در چه مرحله‌ای، از شیرخوردن امتناع می‌نماید، به تشخیص علت کمک می‌کند:

- اگر شیرخوار در اول تغذیه (قبل از این که شیرمادر جاری شود) از گرفتن پستان امتناع نماید، ممکن است سر در گمی در گرفتن پستان، وضعیت نادرست شیردهی و به پستان گذاشتن، نوک پستان صاف یا فرو رفته، مهار یا تأخیر جهش شیر، عفونت گوش یا کاهش قدرت مکیدن از علل آن باشند.
- اگر شیرخوار، بعد از جاری شدن شیر، پستان را رها کند، جهش زیاد شیر یا کاهش آن و یا بسته بودن سوراخ بینی به علت عفونت تنفسی ممکن است عامل آن باشد. در صورتی که سرعت بازتاب جهش شیر زیاد باشد، شیرخوار احساس خفگی می کند و به سختی قادر به شیرخوردن می‌باشد.
- اگر این امتناع در اواخر هر وعده تغذیه از پستان مادرباشد، احتمال دارد به دلیل نیاز بچه به آروغ زدن یا دفع گاز باشد.

بطور کلی می توان علل امتناع شیرخوار را در هر سنی در ۳ دسته طبقه بندی کرده و به رفع آن پرداخت:

علل مربوط به شیرخوار، مربوط به مادر و مربوط به تولید شیر

مواردی که به شیرخوار مربوط می شود عبارتند از :

- ۱_ عفونت‌های تنفسی ممکن است موقع مکیدن و بلعیدن، سبب گرفتگی بینی و درد شود. چکاندن قطره کلرور سدیم در بینی و دادن مسکن‌های ساده مثل استامینوفن سبب تسکین شده هم چنین مرطوب کننده‌های هوا ممکن است به رفع گرفتگی بینی کمک نمایند. گاهی امتناع شیرخوار از گرفتن پستان در جریان سرماخوردگی باعث تشخیص اتفاقی انحراف تیغه بینی می‌شود.
- ۲- در مورد دندان در آوردن: گذاشتن پشت یک قاشق سرد یا گاهی جویدن چیزی قبل از شیرخوردن یا ماساژ ملایم لثه با انگشت تمیز علاوه بر دادن مسکن‌های ساده باعث کاهش درد شیرخوار می‌گردد.
- ۳- در مورد برگشت شیر از معده به مری، خواب آلودگی و بیقراری ناشی از مصرف داروها، برفک یا تبخال دهان شیرخوار پزشک اقدام خواهد نمود.
- ۴_ در هوای گرم احتمال دارد شیرخوار از شیرخوردن امتناع نماید. ولی در محل خنک و یا در شب شیر بخورد. حرارت بدن شیرخوار را کنترل کرده و او را در درجه حرارت مناسبی نگهداری کنید.
- ۵_ گاهی ممکن است شیرخوار در موقع شیرخوردن ترس داشته باشد مانند واکنش مادر به گاز گرفتن بچه.
- ۷- تمایل شیرخوار به از شیر گرفتن که البته قبل از ۹ ماهگی شایع نیست. اگر شیرخوار ناگهان از پستان مادر رویگردان شود و به گرفتن پستان تمایل نشان ندهد، همه روش‌های ممکن برای تشویق او به دوباره شیرخوردن باید به کار گرفته شود ولی گاهی هم ممکن است نتیجه ندهد و بالاخره منجر به قطع کامل شیرخوردن شود.

مشکلاتی که در مادر ممکن است سبب امتناع شیرخوار از گرفتن پستان شود عبارتند از:

- ۱- بیماری مادر که ممکن است تولید شیر او را کم کرده یا واکنش جهش شیر را مهار کرده باشد یا داروها مزه شیرش را تغییر داده باشند.
- ۲_ در صورت عفونت یک پستان مادر، ممکن است شیرخوار از تغذیه همان طرف به علت مزه شور شیر یا چرک، امتناع کند و یا به خاطر مصرف دارو توسط مادر، هر دو پستان را نگیرد.
- ۳_ قرص‌های ضد حاملگی خوارکی (قرص ترکیبی و به ندرت قرص پروژسترونی تنها) همچنین حاملگی مجدد احتمال دارد تولید شیرمادر را کاهش داده و مزه شیر را تغییر دهند. تخمک گذاری یا عادت ماهیانه نیز گاهی به علت تغییر مزه شیر سبب امتناع شیرخوار از شیرخوردن می‌شود.
- ۴_ در صورت استفاده مادر از عطر، صابون، ادکلن یا کرم متفاوت و یا شنا کردن در استخر با آب کلر دار یا آب دریا ، و یا حتی تغییر در ظاهر مادر مثل تغییر طرح مو یا عینک زدن ممکن است روی شیرخوار تأثیر گذاشته و پستان مادر را نگیرد
- ۵_ برخی از شیرخواران به برخی از غذاهای مورد مصرف مادران که باعث تغییر مزه شیر می شود حساس هستند و از گرفتن پستان امتناع می نمایند و بعضی دیگر با افزایش سیگار کشیدن مادر، ورزش طولانی قبل از شیر دادن و یا مصرف زیاد نوشیدنی‌های دارای کافئین مثل نوشابه ها، چای و قهوه از گرفتن پستان امتناع می ورزند.

برخی علل امتناع شیرخوار از گرفتن پستان ممکن است به تولید شیر مربوط باشد:

- ۱- اگر تولید شیر کم باشد یا موقتاً کاهش یابد، شیرخوار ممکن است از گرفتن پستان امتناع کند. برای افزایش تولید شیر باید تلاش نمود.
- ۲- در صورت آهسته بودن جهش شیر، شیرخوار شروع به مکیدن شیر می‌کند ولی به علت دریافت کم شیر، از گرفتن پستان

امتناع می‌نماید. در این موارد می‌تواند شیرش را کمی بدوشد تا جهش پیدا کند و آن گاه پستان را به دهان شیرخوار بگذارد و یا واکنش جهش شیر را قبل از تغذیه شیرخوار با روش‌هایی مثل خوردن آب یا یک نوشیدنی ساده، شنیدن موسیقی، نشستن روی همان صندلی همیشگی و دراز کشیدن، شرطی نماید.

۳_ در صورت سریع بودن جهش شیر نیز شیرخوار ممکن است به علت عدم توانایی در برابر آن، پیش دستی کرده و از گرفتن پستان امتناع نماید. در این مورد می‌توان کمی شیر را دوشید و بعد شیرخوار را به پستان گذاشت.

چگونه شیرخوار را به گرفتن پستان ترغیب نماید:

قبل از هر اقدام باید اطمینان حاصل کنید که شیرخوار حقیقتاً از گرفتن پستان امتناع می‌کند. چون گاهی مادران رفتار طبیعی شیرخوار را به امتناع از گرفتن پستان تعبیر می‌نمایند. به این منظور به نکات زیر توجه کنید:

۱_ دفعات شیرخوردن واقعی شیرخوار در طی ۲۴ ساعت: شیرخوار ممکن است به مقدار کم و دفعات بیشتر یا به مقدار بیشتر و دفعات کمتر شیر بخورد.

۲_ ارزیابی وضعیت شیرخوار از نظر کفایت دریافت شیر: حداقل ۶ کهنه پارچه‌ای خیس شده با ادرار بی‌بو و روشن در ۲۴ ساعت و داشتن پوستی لطیف و شاداب معمولاً نشانگر دریافت کافی شیر (در صورت تغذیه انحصاری شیرخوار با شیرمادر) می‌باشد.

۳_ توجه به رفتار شیرخوار در فواصل تغذیه: آیا خشنود و راضی است؟ یا به آسانی آشفته می‌شود و یا بیمار به نظر می‌رسد.

۴_ توجه به وضعیت در آغوش گرفتن و شیرخوردن و مکیدن شیرخوار:

- آیا شیرخوار را در وضعیت مناسبی به پستان گذاشته شده به طوری که سینه و زانوی او روی سینه و شکم مادر،

دهان شیرخوار هم سطح نوک پستان و چانه وی روی پستان قرار می‌گیرد؟

- آیا دهان شیرخوار کاملاً باز می‌شود تا بتواند پستان را به خوبی بگیرد. (به سبب صاف شدن نوک پستان در احتقان

پستان گرفتن برای شیرخوار مشکل می‌شود).

به توصیه های زیر توجه کنید:

- وقتی که شیرخوار خواب آلود است (درست قبل از بیدار شدن یا موقع به خواب رفتن) مادر به او شیر بدهد.
- قبل از تلاش برای شیردادن، شیرخوار را با آواز خواندن، تکان دادن یا ماساژ آرام کند.
- در زمانی که شیرخوار هنوز زیاد گرسنه نیست، به او شیر بدهد.
- اگر شیرخوار دچار سردرگمی در گرفتن پستان است، قبل از برقراری رفلکس جهش شیر، مادر مقداری از شیر خود را بدوشد، سپس پستان را به کودک عرضه کند به طوری که او یک پاداش آنی از کوشش خود بگیرد.
- هر زمان شیرخوار تمایل به گرفتن پستان دارد، مادر او را به پستان بگذارد و می‌تواند با قطره چکان شیر دوشیده شده را روی پستان بریزد تا به صورت قطره وارد دهان وی شود. این کار ممکن است شیرخوار را آرام و چسبیده به پستان نگهدارد و به تداوم مکیدن تشویق نماید یا ابتدا شیر را به روی لب‌های شیرخوار بدوشد و سپس پستان را به داخل دهان او بلغزاند. مادر نباید به پشت سر شیرخوار فشار بیاورد یا پستانش را تکان دهد.
- وقتی کودک پستان را نمی‌گیرد، وادار کردن وی به گرفتن پستان از طریق گرسنه نگهداشتن او کار درستی نیست چون شیرخوار دچار سردرگمی در گرفتن پستان ممکن است در خطر کم‌آبی هم قرار گیرد و اگر انرژی مناسب را دریافت نکند روز به روز ضعیف‌تر شده و قادر به گرفتن پستان و مکیدن آن نخواهد بود.
- وضعیت‌های مختلف شیردهی از جمله ایستاده شیردادن، تکان دادن وی پس از چسباندن به پستان، شیردادن در حمام گرم را امتحان کند.

- شیرخوار تمام مدت در کنار مادر باشد نه مراقب دیگری. او باید تمام مدت ، نه فقط موقع شیردهی با شیرخوار تماس پوست به پوست داشته باشد.
- مادر با شیرخوارش بخوابد. از سایر افراد خانواده تقاضا شود که در کارهای خانه و یا مراقبت از کودکان بزرگتر کمک کنند.
- شیر خوار را با فنجان تغذیه کند. در صورت امکان شیر دوشیده شده خودش را بدهد اما اگر ضرورتی داشت از شیر مصنوعی استفاده کند. به هیچ وجه نباید از بطری، سرشیشه و گول زنک استفاده نماید.

تغذیه با شیر مادر در نوزادان با شرایط خاص

نوزادان کم وزن هنگام تولد (LBW)

کمی وزن هنگام تولد (LBW) به معنی وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم (بعبارتی تا ۲۵۰۰گرم و شامل ۲۴۹۹ گرم) بدون توجه به سن حاملگی است. این واژه نوزادان نارس (یا پره ماچور که در سن حاملگی قبل از ۳۷ هفته متولد می شوند) و نیز S.G.A یعنی کودکانی که برای سن حاملگی کوچک هستند را شامل می شود. این نوزادان ممکن است به یکی از دو علت فوق ، کوچک باشند .

کودکان LBW بطور خاص در معرض خطر عفونت بوده و بیشتر از نوزادان بزرگتر نیاز به تغذیه با شیرمادر دارند . اما متأسفانه این گروه از نوزادان را بیشتر از کودکان بزرگتر با شیر مصنوعی تغذیه می کنند .

بسیاری از کودکان LBW می توانند بدون مشکل از پستان مادر تغذیه شوند. نوزادان ترم(رسیده) که به نسبت سن شان کوچک هستند معمولاً مکیدن مؤثری دارند. آنها اغلب خیلی گرسنه هستند و نسبت به نوزادان بزرگتر نیاز به دفعات بیشتر تغذیه با شیرمادر دارند، لذا رشد آن ها به خوبی جبران می شود.

نوزادانی که نارس (پره ترم) هستند، ممکن است ابتدا مشکلاتی در مکیدن مؤثر داشته باشند ولی می توان آنها را با شیرمادر بوسیله فنجان یا لوله تغذیه کرد و به برقراری تغذیه کامل آن ها از پستان مادر کمک نمود. تغذیه آنها از پستان مادر آسان تر از تغذیه با شیشه می باشد .

مادران دارای فرزند LBW نیاز به کمک های ماهرانه برای دوشیدن شیر و تغذیه شیرخوار با فنجان دارند.

این نکته حائز اهمیت است که اگر امکان دارد این مادران در همان روز اول و ظرف ۶ ساعت اول زایمان ، شروع به دوشیدن شیر نمایند. این امر به جریان یافتن شیر کمک می کند، و درست مشابه مکیدن پستان توسط نوزاد بلافاصله پس از زایمان ، برقراری جریان شیر را تسهیل می نماید.

حتی اگر مادری می تواند فقط چند سی سی آغوش را بدویشد، همین مقدار کم برای نوزادش بسیار ارزشمند است .

کودکانی که با سن حاملگی حدود ۳۲ هفته و بزرگتر متولد می شوند، قادر به شروع مکیدن از پستان هستند .

کودکانی که با سن حاملگی بین ۳۰-۳۲ هفته متولد می شوند ، می توانند با یک فنجان کوچک و یا قاشق تغذیه شوند.

کودکان کوچک تر از ۳۰ هفته معمولاً باید در بیمارستان و از طریق لوله تغذیه شوند.

به محض اینکه حال عمومی نوزاد خوب شد به مادر اجازه بدهید او را به پستان بگذارد. وی در ابتدا ممکن است دنبال نوک پستان بگردد و فقط آنرا لیس بزند و یا فقط کمی بمکد. سپس برای اطمینان یافتن از تأمین تمام نیازهای نوزاد می‌توانید به تغذیه او با شیر دوشیده شده با فنجان ادامه دهید.

وقتی نوزاد LBW مکیدن مؤثر را شروع می‌کند، ممکن است در طول تغذیه، به دفعات و حتی زمان طولانی مکیدن خود را متوقف کند. مثلاً ممکن است ۵-۴ بار بمکد و بعد ۵-۴ دقیقه متوقف شود.

این نکته مهم است که به هیچ وجه نباید او را به سرعت از پستان مادر دور کرد، بلکه او را باید همچنان در بغل و زیر پستان نگه داشت تا هر وقت آماده بود دوباره شروع به مکیدن نماید.

او می‌تواند در صورت لزوم این کار را حتی تا یک ساعت نیز ادامه دهد. پس از تغذیه با پستان، شیر دوشیده شده را با فنجان به او عرضه کنید.

اطمینان حاصل کنید که مکیدن نوزاد در وضعیت خوبی صورت می‌گیرد. خوب پستان گرفتن نوزاد حتی در مراحل اولیه، مکیدن مؤثر را زودتر امکان‌پذیر می‌سازد.

بهترین وضعیت مادر برای به پستان گذاشتن نوزاد LBW بشرح زیر است:

- تمام طول بدن نوزاد را باید با دست و بازو بگیرد و به پستان طرف مخالف بگذارد.
- بغل کردن نوزاد در وضعیت زیربغلی

باید نوزادان LBW را بطور منظم پیگیری کرد تا اطمینان حاصل شود که تمام شیرمادر مورد نیازشان را دریافت می‌کنند. نوزادان LBW مادران HIV مثبت و آن‌هایی که تغذیه جایگزین را انتخاب کرده‌اند، بیشتر در معرض خطر مشکلات هستند و برای اطمینان از رشد آن‌ها باید بطور منظم پیگیری شوند. مادران را تشویق کنید که تغذیه جایگزین را به وسیله فنجان به کودکشان بدهند.

مقدار شیر مورد نیاز نوزاد LBW که قادر به تغذیه از پستان نیست
چه شیری داده شود؟
انتخاب اول: شیر دوشیده شده مادر (در صورت امکان از شیر مادر خودش) انتخاب دوم: شیر مصنوعی توصیه شده طبق دستورالعمل کودکان با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم (LBW): - تغذیه را ابتدا با ۶۰ میلی لیتر شیر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن شروع کنید. - مقدار شیر را ۲۰ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم در روز افزایش دهید تا زمانی که میزان دریافتی او به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز به ۲۰۰ میلی لیتر برسد. - این حجم کلی را به ۸-۱۲ وعده تقسیم کنید به گونه‌ای که هر ۲-۳ ساعت تغذیه شود. - به همین ترتیب ادامه دهید تا وزن او به ۱۸۰۰ گرم یا بیشتر برسد و بطور کامل از پستان تغذیه شود. - میزان شیر دریافتی ۲۴ ساعته کودک را کنترل کنید. - میزان تغذیه فردی ممکن است متفاوت باشد.

تغذیه نوزاد مبتلا به زردی فیزیولوژیک :

زردی:

ضمن بررسی علت (پاتولوژیک یا فیزیولوژیک) باید رابطه مادر و شیرخوار در طول درمان حفظ شود و دسترسی به پستان کاهش نیابد.

زردی فیزیولوژیک زودرس:

در روز ۵-۲ تولد ظاهر می‌شود. این زردی گذراست و بیش از ۱۵ روز طول نمی‌کشد بیشتر در زایمان‌های اول دیده می‌شود، حداکثر بیلی روبین در این‌ها به ۱۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر می‌رسد که ناشی از تغذیه ناکافی با شیر مادر و اجابت مزاج دیر هنگام و دریافت آب یا آب قند در این نوزادان است. تقریباً نیمی از شیرخواران سالم رسیده با هر نوع تغذیه‌ای دچار آن می‌شوند. شیردهی زودرس اولیه با فاصله پس از تولد یا در ساعت اول تولد و شیردهی مکرر بدون محدودیت در پیشگیری و کاهش زردی اثر مثبت دارد. اما اگر شیرمادر کافی مصرف نشود زردی فیزیولوژیک شدت می‌یابد برعکس افزایش مصرف کمک به رفع زردی می‌کند و تجویز شیر کمکی فایده‌ای ندارد. تحریک مکرر روده با تغذیه مکرر سبب دفع مکنونیم که محتوای بیلی روبین آن سبب زردی می‌شود، خواهد شد. زردی فیزیولوژیک می‌تواند به وسیله ناسازگاری گروه‌های خونی و Rh عفونت‌های ویروسی و میکروبی و علل دیگر شدت یابد.

زردی فیزیولوژیک دیررس: در روز ۱۰-۵ تولد ظاهر شده و بیش از یک ماه طول می‌کشد و در نوزادانی دیده می‌شود که به‌طور مکرر و فقط با شیر مادر تغذیه می‌شوند. میزان بیلی‌روبین در این نوزادان به ۲۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر هم می‌رسد. در این موارد توصیه به تغذیه انحصاری با شیر مادر به‌طور مکرر و به دفعات بیشتر شده است و ارجاع سریع به بیمارستان ضروری است.

اولین اقدام پزشکی بی بردن به علت زردی هر نوزاد است و نباید برای نوزادی که دریافت شیر، الگوی دفع و یا الگوی کاهش وزن و وزن‌گیری او در محدوده طبیعی است مکمل یاری شیر توصیه کند. اگر مشخص شود که علت زردی نوزاد دریافت کم شیر است که نیازمند فتوتراپی است اولین مکمل یاری و در بیشتر موارد تنها نیاز همان شیردوشیده شده مادر نوزاد است که باید با فنجان یا سیستم مکمل رسان به شیرخوار داده شود.

زردی شیرمادر: تعداد کمی از شیرخواران دچار این نوع زردی می‌شوند که بعد از روز سوم تولد ظاهر شده و ممکن است برای چند هفته ادامه داشته باشد و جهت درمان نیاز به فتوتراپی داشته باشد. علت این نوع زردی خصوصیت ویژه شیر بعضی از مادران می‌باشد و گفته می‌شود که ممکن است منافی هم برای شیرخوار داشته باشد. هیچ گزارشی از ایجاد کرنیکتروس توسط زردی ناشی از شیرمادر گزارش نشده است.

تشخیص آن از روز زمان ظاهر شدن زردی و رد سایر علل داده می‌شود. سایر علل زردی طول کشیده و تشدید شده مثل بیماری همولیتیک، هیپوتیروئیدیسم، کمبود G6PD و انسداد روده باید رد شوند. معمولاً شیرخوار سالم است و رشد، افزایش وزن و حرکات روده‌ای طبیعی دارد. تنها تست تشخیصی قطع شیرمادر است که زردی به سرعت و ظرف ۲۴ ساعت کاهش می‌یابد و شروع مجدد شیرمادر منجر به افزایش بیلی روبین می‌شود ولی نه به سطح قبلی. بطور معمول قطع شیرمادر نه علمی بوده و نه از لحاظ پزشکی ضرورت دارد چون خطر قطع دائمی شیرمادر را دربردارد و این تصور را برای والدین ایجاد می‌کند که شیرمادر برای فرزندشان ضرر دارد.

نکته: زردی فیزیولوژیک، زردی ناشی از تغذیه با شیر مادر یا تغذیه ناکافی با شیر مادر، منعی برای شیردهی ندارد.

فتوتراپی و ادامه تغذیه با شیرمادر:

فتوتراپی درمان موثری است. اگر شیرخوار نیاز به فتوتراپی دارد شیردهی از پستان باید ادامه یابد و شیرخوار مکرر از زیر فتوتراپی خارج و از پستان مادر تغذیه شود. فتوتراپی متناوب به همان اندازه مداوم موثر است. اگر شیرخوار هنگامی که تحت فتوتراپی است خواب آلود شود و یا نیازمند مایعات اضافی باشد، مادر می تواند شیرش را بدوشد و علاوه بر شیردهی از پستان به شیرخوار بدهد. هر ۱۲ ساعت باید بیلی روبین شیرخوار را کنترل کنند. هدف قطع سریعتر فتوتراپی است.

تغذیه شیرخواران دو یا چند قلو با شیرمادر:

تولید شیرمادر تابع قانون عرضه و تقاضا است یعنی هر چه مکیدن پستان مادر توسط شیرخوار بیشتر باشد، تولید و ترشح شیر بیشتر خواهد شد. میزان تولید شیر مادر بستگی به نیاز شیرخواران، دفعات و مدت مکیدن پستانها، محیط و شرایط مناسب، آرامش و استراحت و تغذیه خوب مادر و همچنین کمک افراد خانواده و مشوق دارد.

دفعات تغذیه هر شیرخوار باید ۱۰ تا ۱۲ بار در شبانه روز باشد تا هم تولید شیر بیشتر شود و هم شیرخواران به اندازه کافی شیر دریافت نموده و خوب رشد کنند. در ۳-۲ ماه اول پس از تولد لازم است دفعات و مدت تغذیه هر شیرخوار را یادداشت و ثبت کنید و نیز تعداد کهنه‌های خیس هر یک را دقیقاً مورد توجه قرار دهید. یعنی هر کدام باید ۶ تا ۸ کهنه خیس در هر شبانه روز و چنانچه از پوشک استفاده می‌شود ۵ تا ۶ پوشک خیس داشته باشند و ۲ تا ۵ بار مدفوع دفع کنند. توجه به دفعات اجابت مزاج و به خصوص ادرار کمک می‌کند تا از میزان دریافت شیر توسط هر شیرخوار اطلاع درستی به دست آورید. هنگامی که بچه‌ها به طور مکرر از پستان مادر تغذیه می‌کنند، ترشح و تولید شیر بیشتر شده و باعث تداوم شیردهی می‌گردد.

حتی گزارش شده که مادر سه یا چهارقلوها هم توانایی تولید شیر کافی را دارد اما مدت زمانی که لازم است تا این بچه‌ها تغذیه شوند، قابل ملاحظه و تنظیم آن برای مادر ممکن است مشکل باشد لذا تغذیه همزمان دو شیرخوار باعث صرفه‌جویی در وقت مادر خواهد شد. بدیهی است که در این موارد، مادر باید از استراحت و تغذیه مناسبی برخوردار باشد تا ضمن تأمین نیازهای غذایی خود بتواند نیازهای سه یا چهار قلوها را نیز فراهم نماید.

آمادگی مادر در بارداری؛ وقتی که متوجه می‌شوید مادر دو یا چند قلو باردار است باید او را برای زایمان و شیردهی دو یا چند نوزاد آماده کنید. با همسر وی قبل از زایمان بحث کنید بسیار مهم است که حامی مادر باشد و هر دوی آنها به ضرورت تغذیه با شیرمادر تعهد داشته باشند.

اصول تغذیه دو یا چند قلوها

۱. در بیمارستان باید نوزادان را بلافاصله پس از تولد به پستان بگذارند. مادر به کمک و حمایت بیشتر نیازمند است.
۲. ممکن است یکی از کودکان سریع‌تر پستان را بگیرد و بهتر بمکد. بهتر است مادر اول او را به پستان بگذارد و سپس دیگری را برای پستان گرفتن، بیشتر کمک کند.
۳. شیرخواران را می‌توان با هم یا جداگدا به پستان بگذارند که برای هر روش مزایا و مشکلاتی ذکر می‌شود. از جمله: تغذیه همزمان سبب صرفه‌جویی در وقت مادر می‌شود. تغذیه نوبتی یعنی از شیرخواری که گرسنه‌تر است شروع کنند و سپس

- شیرخوار دیگر را شیر بدهند. بعضی مادران با تغذیه جداگانه شیرخواران راحت‌تر هستند و آنها را جداگانه مورد توجه قرار می‌دهند. البته متوجه می‌شوید که گاه تغذیه همزمان و گاه تغذیه جداگانه بهتر است.
۴. تولید شیر تحت تأثیر چند عامل قرار دارد: دفعات شیردهی، وضعیت صحیح پستان گرفتن شیرخوار، دفعات استراحت مادر و میزان استرس‌های وارده. با شیردهی مکرر، حجم کافی شیر برای برآورد نیازهای شیرخواران تولید خواهد شد. استراحت کافی و دوری از استرس و نگرانی مهم است.
۵. چنانچه یکی از شیرخواران یا هر دو آنها بستری شدند و یا قادر به مکیدن نبودند، نیاز به تغذیه با شیردوشیده شده دارند. هر وقت که مادر می‌تواند شیرش را دوشیده و ذخیره کند تا هنگام نیاز استفاده شود.
۶. مادر و شیرخوار هم اتاق باشند و خوابیدن شیرخواران با مادر در بستر مشترک مفید است.
۷. از شیشه شیر و گول زنک(پستانک) استفاده نکنند چون سبب اختلال در مکیدن پستان و کاهش تولید شیرمادر می‌شود. اگر چنین اتفاقی افتاد صبر و حوصله لازم است تا شیرخواران پستان را درست بگیرند.
۸. چنانچه یکی از شیرخواران در گرفتن پستان یا مکیدن آن مشکل دارد، نیازمند توجه مادر در طول شیردهی است و لذا تغذیه جداگانه او در این موارد لازم است. معمولاً هر کدام یک پستان را می‌خورند و سیر می‌شوند. اما اگر یکی درشت‌تر و قوی‌تر است و سریع‌تر وزن می‌گیرد، ممکن است مفید باشد که به پستان دیگر گذاشته شود تا تولید شیر آن پستان را زیاد کند.
۹. چنانچه یک شیرخوار خوب وزن نگیرد، باید به او اجازه داد تا هر طور میل دارد، شیر بخورد و بر حسب نیازش او را شیر بدهند. شاید لازم باشد دفعات شیردهی او بیشتر شود. هر چه شیرخواران تقاضای شیر بیشتری بکنند و پستان را بمکند شیر بیشتری عرضه یا تولید می‌شود.
۱۰. ممکن است برای تشخیص کفایت شیر دریافتی لازم باشد که شیرخواران مکرر در منزل وزن شوند. (توجه به نشانه‌های کفایت شیر ضروری است). جهش رشد شیرخواران از ۳ تا ۶ هفتگی و سپس در فواصل منظم حدود ۶ هفته بعد از آن رخ می‌دهد که بستگی به هر کودک بطور فردی دارد(و لزوماً در چند قلوها هم زمان نیست). در این اوقات باید شیرخواران بیشتر تغذیه شوند تا تولید شیر تحریک شود.
- هرگز نباید یک شیرخوار را فقط از یک پستان خاص تغذیه کنند، بلکه باید آنها را در وعده‌های مختلف با هم جابجا کنند. زیرا:**
- آنها مکیدن مساوی ندارند و ممکن است یکی از آنها کوتاه‌تر و کمتر بمکد و پستان بخاطر الگوی متفاوت مکیدن، شکل غیرقرینه پیدا کند. به همین دلیل، جابجا کردن شیرخواران بطوری که هر دو از هر دو پستان تغذیه شوند، مهم است.
 - وقتی یک شیرخوار همیشه فقط از یک پستان تغذیه شود، چشم بالای او بکار گرفته می‌شود در حالی که چشم زیرین او بطور مناسب تحریک نمی‌شود و این چشم دچار تنبلی می‌شود. برخی مادران یک روز یکی از پستانها را به یک شیرخوار می‌دهند و روز بعد او را به پستان دیگر می‌گذارند تا تحریکات بینایی لازم را فراهم آورند.
 - اگر یک یا هر دو شیرخوار برای تغذیه در وضعیت خاصی مشکل دارند، باید وضعیت شیردهی آنان را تغییر داد. مثلاً اگر در حالت معمول (گهواره‌ای) مشکل دارند، مادر به حالت زیربغلی آنها را در آغوش بگیرد. در این صورت شیرخواران راحت‌تر هستند و یکدیگر را لمس نمی‌کنند.

- کودکان بدواً هر ۱/۵ تا ۲ ساعت شیر می‌خورند. لازم است در چند هفته اول ۱۰-۱۲ بار در شبانه‌روز آنها را شیر بدهند. (کمتر از ۸ بار نباشد) اما برخی به دفعات بیشتری نیاز به تغذیه دارند.

نکته بسیار مهم: در کودکان دو یا چند قلو تغذیه با شیرمادر حق تک آنهاست. نباید یکی را با شیرمادر و دیگری را با شیشه تغذیه کنند.

نحوه در آغوش گرفتن و شیردادن دو قلوها:

برای برطرف نمودن نگرانی از نظر وقت و تولید شیر بیشتر، توصیه می‌شود تغذیه دوقلوها همزمان انجام شود. وضعیت شیرخوردن در این شیرخواران معمولاً ترکیبی از روش‌های قبلی است که پیشتر توضیح داده شده است. برای تغذیه هم‌زمان شیرخواران به تصاویر زیر دقت کنید.

۱- روش زیر بغلی همزمان:

مادر نشسته است و هر دو شیرخوار زیر بغل او و روی بالش‌های سفت قرار دارند. هر چه بالش‌ها بالاتر باشند مادر راحت‌تر است. اگر مادر روی بلندی نشسته (صندلی پهن یا نیمکت) استفاده از چهارپایه زیر پایش سبب راحتی او می‌شود. این وضعیت برای مادر سزارین شده راحت‌تر است چون به بخیه‌ها فشار وارد نمی‌شود.



۲- یکی زیر بغلی و یکی معمولی:

اگر مادر از بالش زیر ساعد خود و زیر شیرخوار استفاده کند، شیردهی آسان‌تر می‌شود. مادر با جابجا کردن شیرخواران می‌تواند با هر دو تماس چشمی داشته باشد. اگر یکی از شیرخواران در گرفتن پستان مشکل داشته باشد این روش یکی از راحت‌ترین روش‌ها است.



۳- تغذیه هم زمان در وضعیت V:

مادر به حالت خوابیده یا نشسته طوری بچه ها را بغل می کند که سر بچه ها در سطح پستان است و بدن آنها به شکل V قرار می گیرد. این وضعیت برای تغذیه همزمان شبانه راحت است. مادر می تواند بالشی بشکل V تهیه کند. V در جلو قرار می گیرد و تکیه گاه دوقلوها است. دوقلوها روی بالش قرار می گیرند تا به سطح پستان برسند و مادر خسته نشود.



۴- روش متقابل و معمول:

در این روش مادر نشسته و بچه ها به صورت معمول یکی در آغوش مادر و دیگری رو به روی او قرار می گیرند. سر آنها در زاویه آرنج مادر است. یک بالش زیر آرنج مادر قرار می گیرد و شیرخوار روی آن تکیه می کند. این وضعیت در خارج از منزل و بدون بالش هم انجام می شود. چنانچه مادر دست هایش را به هم قفل کند وزن بچه ها را بهتر تحمل می کند.



۵- روش موازی:

مادر نشسته و تنه بچه ها در جهت یکدیگر است. یکی در وضعیت معمول شیردهی یعنی سر در زاویه آرنج مادر و تنه اش در عرض بغل مادر قرار دارد و تنه شیرخوار دیگر به موازات و خارج از بدن مادر است و سرش با دست و بازوی او حمایت می شود. قراردادن بالش ها زیر آرنج مادر و در آغوش او این وضعیت را راحت تر می کند.



تغذیه با شیرمادر در کودکان با شکاف کام و لب :

شیردهی شیرخوار مبتلا به شکاف کام و لب هر دو برای مادر مشکل ساز است. این مشکل به صبر و استقامت و تعهد بسیار زیاد والدین و گروه پزشکی و پرستاری سهیم در مراقبت مادر و شیرخوار نیاز دارد. حمایت از مادری که تصمیم به شیردهی دارد خیلی مهم است. در صورت تغذیه با شیرمادر رابطه مادر و شیرخوار زیاد می شود، شیرخوار از فواید شیرمادر بهره مند شده و مادر و شیرخوار هر دو از آرامش ناشی از تماس پوستی در هنگام شیردهی برخوردار می شوند.

یکی از فواید طولانی مدت تغذیه با شیرمادر از پستان برای شیرخوار، اثرات مثبت تکامل عضلات کام است که از طریق عمل مکانیکی شیرخوردن زیاد می شود. این کار به باز نگهداشتن شیپور استاش کمک کرده و در نتیجه احتمال بیماری های خیلی شدید گوش را کاهش می دهد. خطر اوتیت میانی و به دنبال آن خطر بیماری های گوش با رشد شیرخواران مبتلا به شکاف کام و لب افزایش می یابد.

شکاف لب:

در صورتی که شکاف فقط در لب شیرخوار باشد شیردهی امکان پذیر است.

شکاف کام:

حتی یک شکاف کوچک در کام می تواند موجب مشکلات قابل توجهی بشود. شیرخواری که نمی تواند حالت مکش را بین زبان و کام نگه دارد نمی تواند نوک پستان و هاله را در دهانش به حالت کشیده درآورد. این کار لازمه شیرخوردن است.

زمانی که شکاف در کام سخت شیرخوار باشد شیردهی مشکل تر است و نیاز به صبر و تحمل بیشتری دارد. ناحیه بین کام سخت و کام نرم در تحریک رفلکس مکیدن مهم است این رفلکس در شیرخواری که ضایعه در قسمت کام دارد، کاهش می یابد. چنانچه نوک پستان و هاله اطراف آن شل و به اندازه کافی نرم باشد و به آسانی به داخل دهان شیرخوار برود و مادر رفلکس خروج موثر شیر را داشته باشد کمک کننده است، لذا آموزش مادر بویژه برای پیشگیری از احتقان پستان ضروری است.

نحوه در آغوش گرفتن و پستان گرفتن شیرخوار در موفقیت شیردهی حیاتی است. وضعیت های مختلف را باید امتحان کرد اما وضعیت های پیشنهادی برای این شیرخواران عبارتند از:

شکل های زیر شیرخوار در وضعیت نشسته بر روی فاصله بین کمر و زانوی مادر یا در امتداد پهلوئی مادر و با قرار دادن پاها به سمت پشت مادر (مثل وضعیت زیر بغلی) قرار گرفته و حمایت شود.

وضعیت های نگهداری شیرخوار مبتلا به شکاف کام یا لب برای شیردهی



در تصویر زیر شیرخوار به پشت قرار می گیرد و مادر به روی او خم می شود تا مستقیماً پستان به داخل دهان شیرخوار بیفتد. این وضعیت نگهداری در شیرخوار رسیده ای که رفلکس بلع وی کامل شده باشد، مفید است.



وضعیت های خمیده و خوابیده نیز چنانچه مادر مطمئن شود که بیشترین میزان بافت پستان تا حد امکان می تواند در دهان شیرخوار بیفتد مفید خواهد بود.

شکاف کام و شکاف لب :

شیردهی در صورت یک طرفه بودن شکاف کام و شکاف لب می تواند امکان پذیر باشد. وضعیت های ذکر شده برای نگهداری شیرخوار و شیر دادن به او را باید امتحان کرد و وضعیت نگهداری مناسب را پیدا کرد. به محض اینکه بافت های پستان به اندازه کافی به داخل دهان شیرخوار افتادند مادر ممکن است انجام موارد زیر را برای افزایش پستان گرفتن و بستن دهان شیرخوار مفید بیابد :

- لبه دست یا انگشت اشاره خود را درست زیر پستان خود قرار دهد.
- به ملایمت بافت های پستان را به سمت بالا فشار دهد تا شکاف شیرخوار را پر کند.
- این فشار روی پستان را تا اتمام شیردهی نگهدارد.

این کارها در شیرخوارانی که فقط شکاف لب دارند نیز کمک کننده است. مادر را باید به دوشیدن مکرر پستان هایش تشویق کرد تا پستان ها را تا حد امکان نرم نگهدارد.

ثبیت تکنیک شیردهی قابل قبول برای مادر و شیرخوار ممکن است چندین روز طول بکشد و حتی احتمال دارد مادر تا زمان انجام عمل جراحی برای بستن شکاف کام و یا لب، مجبور به تکمیل تغذیه شیرخوار خود با روش های تغذیه مکمل شود.

سلامت، تغذیه و بیماری مادر و مصرف دارو

نیازهای تغذیه ای مادران شیرده

- تمام مادران نیاز دارند که غذاها و مایعات کافی بخورند و بیاشامند تا احساس نمایند که حالشان خوب است و ضمناً قادر باشند که از خانواده شان مراقبت کنند. اگر مادر غذاهای متنوع به مقدار کافی می خورد، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیازش را دریافت خواهد کرد. لازم نیست مادران شیرده غذاهای مخصوص بخورند یا از خوردن غذاهای خاصی اجتناب کنند.
- بدن زنان در طول حاملگی چربی ذخیره می کند تا به تولید شیردر دوران شیردهی کمک کند. بخشی از شیرمادر از این ذخائر تولید می شود و بخشی دیگر از غذاهایی است که می خورد.
- باید مادر دچار سوء تغذیه شدید باشد تا تولید شیرش بطور قابل ملاحظه کاهش یابد. چنانچه کمبود غذا وجود داشته باشد (قحطی) ابتدا از ذخایر بدن مادر برای تولید شیر استفاده می شود. در مقایسه با مادری که خوب تغذیه شده ممکن است حجم شیرش کاهش یافته، چربی و بعضی ویتامین ها را کمی کمتر داشته باشد اما هنوز همچنان کیفیت خوبی خواهد داشت.
- اگر مادر غذاهای مقوی و خوبی نخورد یا یک وعده غذایی را از دست بدهد تولید شیرش کاهش نخواهد یافت. گرچه مادری که خیلی کار می کند، وقت برای غذا خوردن ندارد یا غذای کافی ندارد و یا از حمایت اجتماعی برخوردار نیست ممکن است از خستگی و کاهش تولید شیر رنج ببرد. مراقبت از مادر و صرف وقت برای تغذیه مکرر کودک، به تولید شیر کافی کمک خواهد کرد.
- تغذیه با شیرمادر بر امنیت غذایی تمام اعضای خانواده اثرگذار است. چنانچه منابع محدود باشد بهتر است بجای اینکه به کودک شیرمصنوعی بدهند، به مادر غذا داده شود تا بتواند از کودکش مراقبت کند. در این مورد با افراد خانواده گفتگو کنید.
- مادران شیرده اغلب تشویق می شوند که مقادیر زیادی مایعات بنوشند. نوشیدن مایعات بیشتر از آن که برای رفع تشنگی مورد نیاز است تولید شیر را افزایش نخواهد داد و حتی ممکن است آنرا کاهش دهد. مادر باید تا حد رفع تشنگی (براساس تشنگی) و یا در صورتی که ادرارش کم یا غلیظ شود، مایعات بنوشد.

تدابیر شیردهی هنگام بیماری مادر

• ارزش تداوم شیردهی در بیماری مادر:

زنان می توانند تقریباً در تمام موارد ابتلا به بیماری به شیردهی ادامه دهند. فواید زیادی برای تداوم شیردهی طی بیماری وجود دارد:

- بدن مادر در برابر عفونت تولید آنتی کر می کند که وارد شیرمادر می شود و به محافظت شیرخوار در برابر عفونت کمک می کند.
 - توقف ناگهانی شیردهی می تواند منجر به پستان دردناک شود و مادر ممکن است تب کند.
 - چنانچه شیردهی به طور ناگهانی قطع شود، کودک ممکن است علائم پریشانی واضطراب (دیسترس) نظیر گریه زیاد را نشان دهد.
 - ممکن است پس از بهبودی مادر از سرگیری شیردهی مشکل باشد بدلیل اینکه تولید شیر او کاهش یافته است.
 - توقف شیردهی کودک را در معرض خطرات و صدمات ناشی از تغذیه مصنوعی قرار می دهد.
 - شیردهی وقت و کار کمتری را نسبت به آماده کردن شیرمصنوعی، تغذیه کردن کودک و جوشاندن شیشه و سرشیشه نیاز دارد. در تغذیه از پستان کودک می تواند در کنار مادر دراز بکشد و هر قدر نیاز دارد تغذیه شود بدون اینکه لازم باشد حرکت کند.
 - مادر و شیرخوار می توانند با هم باشند بنابراین او می داند که کودکش سالم و خوشحال است.
 - کودک به دریافت منافع ناشی از تغذیه با شیرمادر ادامه می دهد. از جمله: حفظ سلامت، بهترین تغذیه، رشد و تکامل مطلوب، خطر کمتر چاقی و مشکلات بعدی در سلامتی
- مادرانی که بیماری مزمن دارند ممکن است نیاز به کمک بیشتری برای شیردهی داشته باشند. برای مثال مادری که دیابت دارد ممکن است مشکلاتی را طی زایمان داشته باشد که می تواند با شیردهی تداخل نماید. اما با کمک مناسب می تواند به طور طبیعی شیردهی را انجام دهد.

• زمانی که مادر بیمار است برای کمک به شیردهی به موارد زیر توجه کنید:

- ارزش تداوم شیردهی در طول بیماری را شرح دهید.
- جدایی مادر و شیرخوار باید به حداقل برسد و آنها در کنار هم نگهداری شوند.
- مادر مایعات کافی مصرف کند بویژه اگر تب دارد.
- به مادر کمک کنید تا وضعیت راحتی برای شیردهی پیدا کند یا به شخص همراه او نشان دهید که چگونه به مادر کمک کند تا به راحتی کودکش را در بغل بگیرد.
- چنانچه شیردهی مشکل است یا مادر خیلی ناخوش یا ناراحت است ممکن است بتواند خودش یا با کمک گرفتن، شیرش را بدوشت و تا زمانی که بهتر بشود کودک را از طریق فنجان تغذیه کند.
- درمان ها و داروهایی را انتخاب کنید که برای شیردهی مضر نباشند.
- چنانچه در طی بیماری مادر، شیردهی قطع شده است. پس از بهبودی مادر به برقراری مجدد شیردهی کمک کنید.

شرایط مربوط به سلامت مادر که احتمال استفاده از غذاهایی بجز شیرمادر مورد نیاز است

- شرایط بسیارمعدود و نادری مربوط به سلامت مادر وجود دارد که نیاز به استفاده از تغذیه مصنوعی برای تغذیه شیرخوار مطرح می شود. تشخیص این نکته بسیار حائز اهمیت است که آیا بیماری مادر منع شیردهی دارد و یا شرایط آن بیماری، شیردهی را مشکل کرده که باید برای رفع مشکل و تداوم شیردهی مادر تلاش کرد.
- بستری شدن به خودی خود جزو موارد منع شیردهی نیست. چنانچه مادر بستری شود، کودک باید در کنار مادر نگهداری شود. چنانچه مادر قادر نباشد که از شیرخوارش مراقبت کند، می توان از یکی از اعضاء خانواده درخواست نمود که در کنار مادر بماند و برای مراقبت از کودکش به او کمک کند.
- در موارداعتیاد مادر به نیکوتین، الکل، اکستازی، آمفتامین، کوکائین و محرکهای وابسته مشخص شده است که آثار نامطلوب بر شیرخوار دارند. الکل، اپیوئیدها، بنزودیازپین ها وحشیش موجب تخدیر در مادر وشیرخوار می شوند. بایستی مادرتشویق به عدم استفاده ازاین مواد شده فرصت و حمایت ترک داده شود.
- چنانچه مادری بیماری مسری شایعی نظیر عفونت ریه، گلودرد، یا عفونت دستگاه گوارش دارد این خطر برای شیرخوار وجود دارد که به واسطه نزدیکی با مادر و از طریق تماس با او سرفه ونظایر آن در معرض عفونت قرار گیرد. وقتی که مادر به شیردهی ادامه می دهد کودک تا حدی در برابر عفونت مادر محافظت می شود. چنانچه مادر ، شیردهی را در این زمان قطع کند شیرخوار در خطر بیشتری برای مبتلا شدن به عفونت مادر قرارمی گیرد . در مورد اکثر عفونت های مادر شامل سل، هپاتیت B و ماستیت منع شیردهی وجود ندارد.
- چنانچه مادری قادر به شیردهی نباشد باید تلاش شود که از دایه (با وضعیت مشخص شده HIV منفی) استفاده شود و یا از شیر انسان که حرارت دیده استفاده نمایند.

بیماری مادر و شیردهی

تغذیه انحصاری با شیرمادر در ۶ ماه اول عمریک فرآیند طبیعی است و برای مادرو شیرخوار مفید است. معهذادرشرایط پزشکی معدودی از شیرخوار و مادر توصیه عدم شیردهی موقت یادائم صورت می گیرد. این شرایط که تعداد کمی از مادران و شیرخواران را دربرمی گیرد همراه با شرایط مادرکه ممکن است جدی باشد ولی دلیل استفاده از شیرجایگزین نمی باشد در زیر می آید.

مادرانی که شرایط زیر را دارند باید براساس استانداردها درمان شوند:

مادرانی که ممکن است لازم شود شیرندهند:

این گروه شامل مادران مبتلابه HIV هستند که چنانچه تغذیه جایگزین قابل قبول، دردسترس و قابل تهیه، عملی مداوم و ایمن است، تغذیه مصنوعی توصیه می شود.

مادرانی که ممکن است اجتناب موقت از شیردهی داشته باشند:

مادری که بدلیل بیماری شدیدقادر به مراقبت از فرزند خود نمی باشد مثلا دچار سپسیس است.

در هرپس سیمپلکس نوع ۱ تا رفع ضایعات فعال توصیه می شود تماس مستقیم بین ضایعه فعال پستان مادرودهان شیرخوار انجام نشود.

در این گروه داروهایی که مادرمصرف می کند شامل:

-داروهای تخدیرکننده چون داروهای سایکوتراپاتیک، ضدصرع، اپیوئیدها و ترکیبات آنها ممکن است عوارضی چون خواب آلودگی و تخدیر تنفس ایجادکنند و بهتر است در صورت وجود داروهای ایمن تر اجتناب شوند.

-بهتر است ۱۳۱ رادیواکتیو اجتناب و بجای آن از ترکیب ایمن تری استفاده شود. اگر استفاده می کنند ۲ ماه بعد از مصرف شیردهی از سرگرفته شود.

-مصرف زیاد ید موضعی یا یدوفورها (مثلابتادین) بخصوص روی زخم باز و مخاط ها می تواند منجر به سرکوب تیروئیدیا اختلال الکترولیت در شیرخوار شود و باید اجتناب شود.

-داروهای شیمی درمانی سیتوتوکسیک نیاز به قطع شیردهی در خلال درمان دارند.

مادرانی که قادر به ادامه شیردهی هستند اما به برخی مسائل بهداشتی نگران کننده باید توجه شود:

- آبسه پستان: شیردهی از پستان سالم انجام و با شروع درمان ، شیردهی از این پستان نیز آغاز شود
- هپاتیت B: طی ۴۸ ساعت اول زندگی یا بمجرد امکان به شیرخوار واکسن مربوطه تزریق شود.
- ماستیت: چنانچه تغذیه پستانی خیلی دردناک است باید شیر را دوشید که وضع بدتر نشود.
- سل: براساس برنامه کشوری مادر و شیرخوار درمان شوند.

سوء مصرف مواد:

-استفاده مادر از نیکوتین ، الکل، اکستازی، آمفتامین، کوکائین و محرک های وابسته دارای اثر سوء بر شیرخوار هستند.

-الکل ، اپیوئیدها، بنزودیازپین ها وحشیش می توانند موجب تخدیر مادر و شیرخوار شوند.

باید مادر تشویق شود که این مواد را مصرف نکند و فرصت ترک همراه با حمایت داده شود

داروها و شیردهی

- چنانچه مادر به دارو نیاز دارد، این امکان برای پزشک فراهم است که دارویی را تجویز نماید که مصرف آن طی دوران شیردهی بی ضرر باشد. بیشتر داروها تنها به میزان جزئی از شیرمادر عبور می کنند و تاثیری بر شیرخوار ندارند. در بیشتر موارد توقف شیردهی ممکن است برای شیرخوار خطرناک تر از مصرف دارو باشد.

• داروهایی که مادر مصرف می کند احتمال تاثیرشان روی کودک نارس یا کمتر از ۲ ماه بیشتر از تاثیر آن روی کودکان بزرگ تر است. چنانچه نگرانی وجود دارد، معمولاً این امکان هست که درمان یا دارویی جایگزین شود که بیشترین سازگاری را با شیردهی داشته باشد.

• چنانچه مادر شیرده دارویی را دریافت می کند که شما در مورد آن مطمئن نیستید، به موارد زیر توجه کنید:

- تا زمانی که شما به کسب اطلاعات بیشتر می پردازید، مادر را تشویق کنید به شیردهی ادامه دهد،
- کودک از نظر عوارض جانبی نظیر خواب آلودگی غیر عادی، عدم تمایل به شیرخوردن و زردی باید تحت نظر قرار بگیرد به ویژه چنانچه مادر نیاز به مصرف طولانی مدت دارو داشته باشد،
- به دستورعمل کشوری در مورد داروهایی که منع شیردهی دارند توجه کنید و داروهای جایگزین که سالم تر و بی ضرر تر برای شیردهی هستند تجویز کنید.
- از کارکنان متخصص نظیر پزشک یا داروساز برای گرفتن اطلاعات بیشتر سؤال کنید.
- چنانچه شیرخوار دچار عوارض جانبی شده است و داروی مادر را نمی توان جایگزین نمود، در صورت امکان موقتاً طبق دستورعمل یک روش تغذیه ای جایگزین برای شیرخوار در نظر بگیرید.

• درمان های سنتی، داروهای گیاهی و سایر درمان ها ممکن است روی شیرخوار اثر بگذارند. چنانچه در منطقه شما استفاده از این ها رایج است، در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید. در این مواقع مادر را به ادامه شیردهی تشویق کنید و شیرخوار را از نظر عوارض جانبی تحت نظر بگیرید.

شیردهی و مصرف داروها توسط مادر

موارد منع شیردهی:

- داروهای ضد سرطان (آنتی متابولیت ها)
- مواد رادیواکتیو (شیردهی موقتاً - قطع می شود)

تداوم شیردهی:

* در موارد زیر احتمال بروز عوارض جانبی وجود دارد، کودک را از نظر خواب آلودگی تحت نظر بگیرید:

- داروهای انتخابی روان درمانی و ضد تشنج (در مورد دارو اطلاعات کسب کنید)

* در صورت امکان از داروهای جایگزین استفاده شود:

- کلرامفنیکل، تتراسیکلین، مترونیدازول، آنتی بیوتیک کینولون (به عنوان مثال سیپروفلوکساسین)

* کودک را از نظر زردی کنترل کنید:

- سولفونامیدها، داپسون، سولفامتوکسازول + تریمتوپریم (کوآکسازول) سولفادوکسین + پریمتامین (فنسیدار)

*از داروی جایگزین استفاده کنید (ممکن است تولید شیر را کاهش دهد):

- استروژن ها شامل قرص های پیشگیری حاوی استروژن، مدرهای تیازید، ارگومترین

*داروهای ذیل در دوزهای معمول ایمن هستند:

رایج ترین داروهای مصرفی:

- مسکن ها و تب برها: دوره کوتاه استامینوفن، ASA، ایبوپروفن و دوزهای گهگاه مورفین و پتیدین

- آنتی بیوتیک ها: آمپی سیلین، آموکسی سیلین، کلوزاسیلین و دیگر پنی سیلین ها، اریترومايسين

- داروهای ضد سل: داروهای ضد جذام

- داروهای ضد مالاریا: (بجز مفلوکین، فنسیدار)، ضد انگل ها، ضد قارچ ها

- برونکودیلاتورها (گشاد کننده برونش) (مثل سالبوتامول)، کورتیکواستروئیدها، آنتی هیستامین ها

- آنتی اسید ها، داروهای دیابت، اکثر داروهای ضد فشار خون، دیگوکسین

- مکمل های تغذیه ای ید، آهن و ویتامین ها

روش پیشگیری از بارداری متناسب با شیردهی

شیردهی می تواند منجر به تاخیر در تخمک گذاری و تاخیر شروع قاعدگی شود و بنابراین می تواند به فاصله گذاری بین بارداری ها کمک کند. روش آمنوره شیردهی (LAM) به زنان کمک می کند که از شیردهی برای فاصله گذاری استفاده کنند.

• اثر بخشی روش LAM در روش های پیشگیری از بارداری ۹۸٪ خواهد بود اما فقط در شرایطی که ۳ شرط زیر برقرار باشد:

- قاعدگی مادر هنوز شروع نشده باشد.

- مادر به طور انحصاری کودکش را با شیر خود تغذیه کند (روز و شب) و بین دفعات شیردهی فاصله خیلی طولانی ایجاد نشود و

- شیرخوار کمتر از ۶ ماه سن داشته باشد.

• چنانچه هر یک از این سه شرط وجود نداشته باشد، باید به مادر توصیه کرد که از روش های دیگر تنظیم خانواده برای به تاخیر انداختن حاملگی استفاده کند. بیشتر روش های تنظیم خانواده بجز قرص های پیشگیری حاوی استروژن با شیردهی سازگار هستند.

• با مادر طبق دستور عمل کشوری پیشگیری از بارداری برای مادران شیرده مطابق جدول مربوطه در بوکلت، مشاوره کنید.

فصل ۱۱

دوشیدن شیر مادر

در موارد زیادی دوشیدن شیر مادر مفید و مهم است تا مادر قادر باشد شیردهی را شروع و یا آن را ادامه دهد. دوشیدن شیر در موارد زیر مفید است:

- وقتی مادر می خواهد از منزل خارج شود و یا سر کار برود.
- تغذیه نوزاد کم وزنی که نمی تواند از پستان مادر شیر بخورد .
- تغذیه نوزاد بیماری که نمی تواند خوب بمکد.
- ذخیره و نگهداری شیر در هنگام بیماری مادر یا شیرخوار
- پیشگیری از نشت شیر از پستان ، وقتی مادر دور از شیرخوار است.
- کمک به شیرخوار که پستان پر را بگیرد.
- کمک به وضعیت سلامت پستان مثل احتقان
- تسهیل مرحله انتقال به سایر روش های تغذیه و یا شیر مادر دوشیده شده و گرم شده (به جلسه HIV و تغذیه شیرخوار مراجعه کنید .)

تمام مادران باید بدانند چگونه شیرشان را بدوشند تا در صورت نیاز قادر به انجام آن باشند. تمام افرادی که از مادران شیرده مراقبت می کنند مطمئناً باید بتوانند نحوه دوشیدن شیر را به مادران بیاموزند .

بسیاری از مادران قادر هستند که با استفاده از روش های غیر متداول مقدار زیادی شیر بدوشند. اگر مادری برای خودش روش خاصی دارد، به او اجازه دهید که همان روش را بکار ببرد . اگر مادری در دوشیدن مقدار کافی شیر مشکل دارد، به او روش های مؤثرتری را به او بیاموزید.

شیر مادر را حدود ۸ ساعت در دمای اتاق و تا ۲۴ ساعت در یخچال می توان نگهداری کرد .

تحریک کردن رفلکس اکسی توسین

زمانی که مادر شیرش را می دوشد، رفلکس اکسی توسین مثل موقعی که کودک پستان را می مکد، عمل نمی کند. بنابراین مادر نیاز دارد بداند چگونه به تحریک رفلکس اکسی توسین خود کمک نماید، یا ممکن است برای دوشیدن شیرش مشکل داشته باشد.

چگونگی تحریک کردن رفلکس اکسی توسین

- از لحاظ روانی به مادر کمک کنید :
 - مادر را برای ایجاد اعتماد به نفس کمک کنید .
 - سعی کنید که درد و اضطراب او را کاهش دهید .
 - کمک کنید که فکر و احساس خوبی نسبت به کودکش داشته باشد .
- به مادر عملاً کمک نمائید. موارد زیر را توصیه و او را کمک کنید :
 - در جایی خلوت و آرام و یا در محلی که توسط نزدیکانش حمایت می شود، بنشیند. بعضی از مادران در بین گروهی از مادران شیرده که شیرشان را می دوشند، بهتر قادر به انجام این امر هستند .

- اگر امکان دارد شیرخوار را بغل کند، بطوری که تماس پوست با پوست با او برقرار نماید. او می تواند طفل را روی دامن خود بگذارد و شیرش را بدوشد. اگر این کار ممکن نیست می تواند به او نگاه کند. اگر این هم غیر ممکن است حتی گاهی اوقات نگاه کردن به عکس کودک کمک کننده است .
- پستان هایش را گرم کند. مثلاً" از کمپرس گرم، یا آبگرم و یا دوش آبگرم استفاده کند . به او هشدار دهید برای پیشگیری از سوختگی بهتر است ابتدا دمای آب را کنترل نماید .
- نوک پستان هایش را تحریک کند. او به آرامی می تواند نوک پستان هایش را به خارج یا بطور دورانی به بیرون بکشد.
- پستان هایش را ماساژ دهد و یا به آرامی ضربه بزند . برخی زنان لمس ملایم پستان ها را با نوک انگشتان یا شانه مفید می دانند. برخی دیگر با غلتاندن ملایم مشت بسته خود روی پستان موفق شده اند.
- از کسی که به مادر کمک می کند، بخواهید که پشت او را ماساژ دهد تا رفلکس اکسی توسین تحریک شود



به این ترتیب که مادر بنشیند و به جلو خم شود و بازوان خود را روی میز بگذارد و سرش را روی بازوی خود قرار دهد، در این حالت پستان هایش شل و آویزان می شوند. شخص کمک کننده باید در حالی که دستش را مشت کرده با انگشتانش پشت مادر (اطراف ستون فقرات) را بطرف پایین و با حرکات ملایم و چرخشی ماساژ دهد. بطوری که هر دو طرف ستون فقرات را از گردن بطرف شانه‌ها به مدت ۲-۳ دقیقه مالش دهد.

چگونگی دوشیدن شیر

مفید ترین طریق دوشیدن شیر برای مادر ، دوشیدن با دست است که نیاز به هیچ وسیله ای ندارد و مادر می تواند در هر جا و در هر زمانی که نیاز دارد، این کار را انجام دهد.

مادر باید خود، شیرش را بدوشد. چون اگر فرد دیگری بخواهد این کار را انجام دهد پستان ها به راحتی آسیب می بینند .

اگر نحوه دوشیدن را به مادر نشان می دهید در صورت امکان روی پستان های خود این کار را انجام دهید تا مادر نیز از شما یاد بگیرد . اگر برای نشان دادن محل فشار روی پستان های مادر ناچارهستید آنها را لمس کنید خیلی با ملایمت این کار را انجام دهید .

نحوه آماده کردن ظرف برای دوشیدن شیر

- لیوان، فنجان، پارچ و یا شیشه دهان گشادی را انتخاب کنید.
- آن ها را با آب و صابون بشویید. (مادر می تواند این کار را روز قبل انجام دهد)
- قبل از دوشیدن، آب درحال جوش را داخل ظرف ریخته و چند دقیقه صبر کنید ، آب درحال جوش اکثر میکروب ها را از بین می برد.
- وقتی که برای دوشیدن آماده گی پیدا کردید، آب فنجان را خالی کنید .

چگونگی دوشیدن شیر با دست

- به مادر یاد بدهید که خودش این کار را انجام دهد. شما شیرش را ندوشید. فقط برای نشان دادن روش دوشیدن ، پستان او را لمس کنید. ملایم باشید. به او یاد بدهید که :
- دست هایش را تمیز بشوید.
- راحت بنشیند و یا بایستد و ظرف را نزدیک پستانش قرار دهد.
- انگشت شست را روی پستان و بالاتر از آرئول و نوک پستان و انگشت اشاره را در زیرپستان ، عقب تر از نوک و آرئول قرار دهد و با بقیه انگشتانش پستانش را نگهدارد. (تصویر ۲ - ۱۵)
- در این حالت انگشت شست و اشاره را بطرف قفسه سینه فشار دهد. او نباید زیاد فشار بیاورد، ممکن است مجاری شیر مسدود شوند.
- قسمت عقب نوک و هاله پستان یعنی لبه هاله را بین انگشت شست و انگشت دیگر فشار بدهد.
- پستان را فشار بدهد و رها کند و این عمل را تکرار کند.
- این عمل نباید دردناک باشد . اگر مادر احساس درد کرد، تکنیک غلط است. در مرحله اول شیر خارج نمی شود، ولی بعد از چند بار تکرار کردن ، شیر قطره قطره شروع به بیرون آمدن می کند. اگر رفلکس اکسی توسین (بازتاب جهش) فعال باشد، شیرفواره می زند.
- باید این عمل در جهات مختلف آرئول تکرار شود تا تمام قسمت های پستان دوشیده شود.
- نباید نوک پستان را فشار داد. چون با فشار دادن نوک پستان یا کشیدن آن، شیر خارج نمی شود. مانند این است که کودک فقط نوک پستان را بمکد. حرکت انگشتان باید بیشتر بصورت غلتاندن (rolling) باشد.
- هر یک از پستان ها را باید به مدت ۳-۵ دقیقه، تا زمانی که جریان شیر کند شود، دوشید. سپس پستان طرف دیگر دوشیده شود . این کار را می توان با دست دیگر انجام داد. اگر مادر خسته شد دستش را عوض کرده وبا دست دیگر این کار را تکرار نماید.
- توضیح دهید برای آنکه عمل دوشیدن پستان صحیح و کامل انجام شود، لازم است پستان ها را به قدر کافی و به مدت ۲۰-۳۰ دقیقه ، بویژه در چند روز اول که مقدار کمی شیر ترشح می شود، بدوشد. این مهم است که سعی نکنید در مدت کوتاه تری پستان را بدوشید.

دوشیدن شیر با دست

الف- عقب نوک پستان و آرئول را بین انگشت شست و سایر انگشتان فشار بدهید .

ب- انگشت شست و سایر انگشتان را دو طرف آرئول قرار بدهید و بطرف داخل قفسه سینه فشار بدهید .



ج- برای تخلیه همه قسمت های پستان در جهات مختلف فشار بدهید .



دفعات ضروری دوشیدن شیر

مادر باید چند وقت یکبار باید شیرش را بدوشد؟ پاسخ این سؤال بستگی دارد به اینکه شیر به چه منظوری دوشیده می شود . اغلب به دفعاتی که شیرخوار شیر می خورد باید شیر دوشیده شود. از جمله :

- **برای برقراری شیردهی به منظور تغذیه شیرخوار کم وزن یا بیمار:**

مادر باید در صورت امکان در روز اول و در اولین فرصت ممکن پس از زایمان ، شیرش را بدوشد . در ابتدا ممکن است فقط چند قطره کلوستروم را بدوشد اما این کار به شروع تولید شیر در پستان ها کمک می کند درست به همان طریقی که مکیدن زود هنگام پستان توسط شیرخوار بعد از زایمان ، به شروع تولید شیر کمک می کند.

به دفعاتی که شیرخوار باید در روز شیر بخورد ، مادر هم باید هر چقدر می تواند، شیرش را بدوشد. این کار باید حداقل ۳ ساعت یکبار و در تمام طول شبانه روز انجام شود. اگر مادر شیرش را به دفعات کم بدوشد و یا فواصل زمانی میان دوشیدن شیرش زیاد شود، قادر نخواهد بود شیر کافی تولید کند .

- **برای حفظ تولید شیر به منظور تغذیه شیرخوار بیمار :**

مادر باید هر ۳ ساعت یکبار (حداقل ۶بار) و حداقل ۲۰ دقیقه در هر بار شیرش را بدوشد و حداقل یکبار آن در شب باشد.

- **برای برقراری تولید شیر ، اگر بنظر می آید که بعد از چند هفته تولید شیرش کم شده است :**

چند روز به دفعات مکرر (هر دو ساعت یا هر یک ساعت یکبار) و شب ها نیز حداقل هر ۳ ساعت یکبار مادر باید شیرش را بدوشد .

- **برای تامین شیر به منظور تغذیه شیرخوار ، هنگامی که مادر سر کار است :**

- مادر تا حد امکان قبل از اینکه سر کار برود باید شیرش را بدوشد و برای شیرخوار کنار بگذارد . دوشیدن شیر ، هنگام حضور مادر در محل کار نیز برای کمک به حفظ تولید شیر بسیار اهمیت دارد . دوشیدن شیر، هنگام حضور مادر در محل کار هر ۳ ساعت لازم است. این شیر را می تواند ذخیره کرده و برای تغذیه شیرخوار به خانه بیاورد.

- **برای تسکین و تخفیف علائمی نظیر پری و احتقان پستان ها و نشت شیر از آن ها در محل کار :**

- مادر فقط در حد لزوم و تسکین و تخفیف پستان ها شیرش را بدوشد: اگر می خواهد آرئول را نرم کند که شیرخوار آنرا بگیرد ممکن است نیاز به ۳ یا ۴ بار فشردن داشته باشد، چنانچه مادر در حال بازکردن یک مجرای مسدود است فشردن و ماساژ باید تا برطرف شدن توده انجام شود.

نحوه و مدت ذخیره کردن شیردوشیده شده:

نحوه ذخیره کردن:

- از ظرف مناسبی از جنس شیشه یا پلاستیک سخت شفاف که بتوان درب آنرا بپوشانید باید استفاده کرد . با آب داغ و صابون آنرا تمیز کنید و با آب داغ آب بکشید. اگر مادر با دست شیرش را می دوشد مستقیماً " آنرا در ظرف جمع آوری بدوشد.

- اگر مادر شیرش را در چندین ظرف ذخیره می کند، باید روی هر ظرف تاریخ را بنویسد و ابتدا شیرهای قدیمی تر را استفاده نماید.

- شیردوشیده شده باید هرچه زودتر مصرف شود و شیر تازه بهتر از شیرمنجمد شده است.

- شیرمنجمد شده را در یخچال بگذارید تا به آرامی ذوب شود و طی ۲۴ ساعت استفاده کنید. می توان آنرا با قرار دادن در یک ظرف آب گرم ذوب کرد و طی یک ساعت همچنان که گرم است مصرف کرد. شیررا نجوشانید و در ماکروویو گرم نکنید چون بعضی از عناصر آن نابوده شده و می تواند دهان شیرخواررا نیز بسوزاند.

مدت نگهداری شیر دوشیده شده تازه برای شیرخوار سالم درخانه:

- در دمای اتاق : در درجه حرارت ۲۵-۳۷ درجه سانتی گراد مدت ۴ ساعت، در درجه حرارت ۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد مدت ۸ ساعت، در دمای بالای ۳۷ درجه نگهداری نشود

- در یخچال ۲-۴ درجه سانتیگراد : ظرف شیر را در سردترین قسمت یخچال قرار دهید. بسیاری از یخچال ها درجه حرارت پایدار ندارند. بنابراین بهتراست شیر طی ۴۸ ساعت استفاده شود
- در فریزر: اگر فریزر درون یخچال است (جایخی یخچال) تا ۲ هفته، در فریزرهای خانگی تا ۳ ماه، و در فریزر مستقل با انجماد عمیق تا ۶ ماه.

مدت نگهداری شیر منجمد و ذوب شده :

- چنانچه در یخچال ذوب شده تا ۲۴ ساعت، اگر با قراردادن در ظرف آب گرم ذوب شده تا یک ساعت مصرف شود. شیر را دوباره منجمد نکنید.

دوشیدن با استفاده از بطری آب گرم

در مواقع احتقان و بسته شدن مجرا بیشتر کاربرد دارد و نحوه کار بدین صورت است که یک بطری با دهانه به قطر ۴ سانتی متر انتخاب کرده و داخل آن آب جوش می ریزیم بعد از این که ۲-۳ دقیقه آب جوش را در بطری نگه داشتیم بطری را خالی کرده سر بطری را سرد کرده روی هاله پستان قرار می دهیم. تعداد دفعات و طول دوره ای که باید شیر دوشیده شود بستگی به شرایط مادر و شیرخوار یا دلایل دوشیدن شیر دارد. مثلاً چنانچه شیر برای تغذیه نوزاد کم وزن دوشیده می شود باید تا زمانی انجام شود که نوزاد قادر به تغذیه مستقیم از پستان گردد و یا در هنگام احتقان پستان، دوشیدن شیر تا رفع مشکل پستان مفید خواهد بود.



شیر دوش برقی / پمپ دستی

- شیردوش ها همیشه عملی، قابل دسترس و یا قابل استفاده نیستند بنابراین آموختن دوشیدن دستی ارجح است. تحریک بازتاب جهش شیر (رفلکس اکسی توسین) قبل از دوشیدن اهمیت دارد. شیردوش های برقی بزرگ قادرند هر دو پستان را هم زمان بدوشند. این شیردوش ها سطح پرولاکتین را بالا می برند و برای زمانی که شیر زیاد مورد نیاز است یا مادر کمبود وقت دارد مفید هستند. در مواقع احتقان شدید هم استفاده از شیردوش برقی بیشتر کاربرد دارد.

- از هر نوع شیردوشی که استفاده می کنید باید میزان مکش مناسبی داشته باشد. مکش زیاد نمی تواند شیر بیشتری خارج کند و ممکن است پستان را صدمه بزند. شیردوش باید مثل مکیدن شیرخوار عمل کند یعنی مکش های اولیه کوتاه و سریع و سپس دوشیدن هایش طولانی تر و آهسته تر شود. اگر شیردوش نوع سیلندری دستی است دسته را بکشید و مکش ایجاد کنید که ناراحت کننده نباشد و نگهدارید تا شیر به آهستگی جاری شود. اگر شیرجریان دارد لازم نیست پمپ کردن را ادامه دهید.
- اگر با شیردوش مقدار ناچیزی شیر بدست می آید، شیردوش را کنترل کنید. روش دوشیدن را کنترل کنید و اگر لازم است رفلکس اکسی توسین را تحریک کنید و به مادر نگوئید که او شیر ندارد.
- مطمئن شوید که مادر می تواند دستگاه را استریل کند.
- از شیردوش دستی که ته آن بادکنک لاستیکی دارد (و شکل بوق دوچرخه است) استفاده نکنید. چون اولاً "نوک پستان را صدمه می زند، ثانياً" تمیز کردن آن مشکل است و ثالثاً" نمی توان شیر آنرا برای تغذیه شیرخوار به کاربرد.



فصل ۱۲

تغذیه با فنجان

مزایای تغذیه با فنجان

- تمیز کردن فنجان با آب و صابون در صورتی که امکان جوشاندن نباشد ، آسان است .
- فنجان کمتر از بطری احتمال دارد به مدت طولانی همه جا حمل شود و به باکتری ها فرصت تکثیر بدهد.
- تغذیه با فنجان با احتمال کمتری کودک را در معرض ابتلا به اسهال ، عفونت ها و پوسیدگی دندان قرار می دهد .
- فنجان کنار کودک رها نمی شود تا خود او از آن تغذیه کند. کسی که شیرخوار را با فنجان تغذیه می کند او را در بغل خود نگه می دارد، به او نگاه می کند و برخی از نیازهای حسی و عاطفی او را ارضاع می کند.
- فنجان ، مکیدن شیر از پستان را برای شیرخوار مختل نمی کند.
- با فنجان ، کودک می تواند میزان شیر دریافتی خود را کنترل نماید .

چگونگی تغذیه شیرخوار با فنجان

- دست هایتان را بشوئید .
- شیرخوار را به حالت نشسته (صاف کمی متمایل به عقب) روی دامن خود نگه دارید.
- شیر را به اندازه محاسبه شده برای هر وعده در فنجان بریزید .
- فنجان کوچک شیر را جلوی لب های شیرخوار نگه دارید :
- فنجان را یک بر کنید تا اینکه شیر به لب های شیرخوار برسد.
- فنجان را به آرامی روی لب پائین شیرخوار در شکاف بین لب و لثه او قرار دهید. لبه فنجان در تماس با لب پایین شیرخوار قرار گیرد
- شیرخوار هشیار شده ، دهان و چشم های خود را باز می کند :
- نوزاد LBW شیر را با زبان به داخل دهانش می کشد.
- نوزاد فول ترم یا بزرگتر شیر را می مکد و مقداری از آن را می ریزد .
- شیر را به داخل دهان شیرخوار نریزید . فقط فنجان را در تماس با لب هایش نگه دارید و بگذارید خود او آن را بنوشد.
- وقتی شیرخوار به قدر کافی شیرخورد ، دهانش را می بندد و دیگر شیر نمی خورد . اگر او به میزان مورد انتظار شیر نخورد ، حتماً نوبت بعدی مقدار بیشتری می خورد و یا لازم است که به دفعات بیشتری او را تغذیه کنید.
- میزان تغذیه شیرخوار از طریق فنجان را در ۲۴ ساعت اندازه گیری کنید ، نه فقط در هر وعده شیردهی .



مقدار شیری که باید به شیرخوار بدهید :

- به شیرخوارانی که وزن ۲/۵ کیلوگرم یا بیشتر دارند:
 - ۱۵۰ میلی لیتر شیر برای هر کیلوگرم وزن بدن در روز بدهید
 - این شیر را به ۸ وعده که هر ۳ ساعت داده می‌شود، تقسیم کنید.
- به شیرخوارانی که وزنی کمتر از ۲/۵ کیلوگرم هنگام تولد دارند (LBW):
 - با ۶۰ میلی لیتر شیر برای هر کیلوگرم وزن بدن شروع کنید.
 - حجم کل شیر را به میزان ۲۰ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز افزایش دهید تا وقتی که شیرخوار کلاً ۲۰۰ میلی لیتر شیر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز دریافت کند.
 - این مقدار شیر را به ۸-۱۲ وعده تقسیم کنید، یعنی هر ۲-۳ ساعت یک بار تغذیه شود.
 - به شیردهی ادامه دهید تا این که وزن شیرخوار به ۱۸۰۰ گرم یا بیشتر برسد و تغذیه با شیرمادر بطور کامل انجام شود.
- دریافت شیر ۲۴ ساعته شیرخوار را کنترل کنید .
- میزان تغذیه شیرخوار در هر وعده ممکن است متفاوت باشد .

میزان شیری که شیرخوار در هر وعده دریافت می کند، بر حسب روش های مختلف تغذیه متفاوت است . به کودک اجازه دهید خودش تعیین کند که دریافت چه مقدار شیر برای او کافی است . اگر شیرخوار مقدار کمی شیر می خورد ، در نوبت بعدی تغذیه، شیر بیشتری به او بدهید یا وعده بعدی تغذیه او را زودتر انجام دهید؛ به خصوص اگر علائم گرسنگی را نشان می دهد .

اگر مادر مقدار کمی شیر تولید می کند، باید مطمئن شوید که تمام آن را به کودکش می دهد . به مادر کمک کنید که احساس کند همین مقدار کم شیر به خصوص برای پیشگیری از عفونت ها با ارزش است. این کار به اعتماد به نفس وی کمک کرده و در نتیجه شیر بیشتری تولید می کند .

نوزادان LBW طی روزهای اول فقط مقدار خیلی کمی شیر نیاز دارند . اگر مادر بتواند حتی مقدار کمی آغوز بدوشد و به نوزادش بدهد، تقریباً تمامی نیازهای او را برطرف خواهد کرد.

بسیاری از مادران ، ابزاری برای اندازه گیری حجم شیر ندارند . شما باید به مادر توضیح دهید فنجانی که برای تغذیه نوزاد به کار می برد گنجایش چه میزان شیر را دارد و در هر وعده چقدر شیر باید به او بدهد .مثلاً طبق محاسبات بالا ، اگر مادر فنجانی دارد که ۱۵۰ میلی لیتر گنجایش دارد ، باید تقریباً نصف فنجان شیر به نوزادش بدهد .

فصل ۱۳

تغذیه جایگزین شیر خوار

گاهی ممکن است مادری که درباره روش های تغذیه شیرخوار مورد مشاوره قرار می گیرد، تغذیه جایگزین را انتخاب کند و یا تغذیه جایگزین به دلایلی اجتناب ناپذیر باشد. بنابر این باید در مورد جایگزین ها آگاهی داشته و مادر را راهنمایی کنید.

وقتی شیرخواری از شیرمادرش محروم می شود بهترین تغذیه جایگزین برای او شیرمادر دیگر یا شیر دایه است. البته شیر مادری که سالم و شناخته شده باشد.

در صورت عدم دسترسی به شیر دایه، انتخاب بعدی شیرمصنوعی است. وقتی تغذیه با شیرمصنوعی اجتناب ناپذیر است، این شیرخواران را بر اساس دستورعمل کشوری غربالگری و برای تامین شیرمصنوعی آنان اقدام کنید. آموزش و مشاوره با مادر در مورد تغذیه مصنوعی باید بطور خصوصی با هر مادر نیازمند آن انجام شود و در جمع مادران آموزش گروهی داده نشود.

در این روش کودک شیر مادر دریافت نمی کند و از طریق رژیمی تغذیه می شود که تمام مواد مغذی مورد نیاز او را تامین کند تا زمانی که بتواند کاملاً از غذای خانواده تغذیه شود. در تمام مدتی که کودک بیشترین احتمال ابتلا به سوء تغذیه را دارد، تغذیه جایگزین کافی مورد نیاز است: یعنی تا زمانی که کودک ۲ساله شود. اگر شیرخوار با شیرمادر تغذیه نمی شود حداقل به مدت ۶ماه بطور کامل به سایر شیرها نیاز دارد. همچنین لازم است بخشی از رژیم غذایی کودک تا ۲ سالگی یا بیشتر، برخی از انواع شیرها باشد.

تغذیه جایگزین باید قابل قبول، در دسترس، عملی، مداوم و ایمن باشد. مادر علاوه بر مصرف شیر به آب، صابون، سوخت و ظرف برای آماده سازی تغذیه جایگزین نیاز دارد. هم چنین باید وقت آزاد نیز داشته باشد.

شیرمصنوعی یا فرمولای تجاری نوعی شیر اصلاح شده است که نسبت های مواد مغذی آن برای تغذیه شیرخوار مناسب شده است و ریز مغذی ها به آن اضافه شده اند. فقط کافی است که این فورمولا به نسبت مناسبی با آب مخلوط شود.

مهم است به خاطر داشته باشید اگر چه نسبت های مواد مغذی در فرمولاهای تجاری می تواند تغییر کند و اصلاح شود، اما هیچ وقت از نظر کیفیت نمی توانند مشابه شیر مادر شوند. هم چنین عوامل ایمنی و فاکتورهای رشد که در شیر مادر وجود دارند در شیر دام یا فرمولا یافت نمی شوند و قابل افزودن به آنها نیز نمی باشند.

شیرهای موجود در دسترس را بطور منظم کنترل کنید بطوری که در مورد ترکیبات و دستورات تهیه آن ها، اطلاعات شما به روز باشد و از محصولات جدیدی که در دسترس قرار می گیرند، آگاه شوید.

مضرات شیر مصنوعی تجاری (فرمولای شیرخوار)

بهر حال شیرمصنوعی مضرات زیر را دارد:

- شیرمصنوعی بر خلاف شیرمادر، فاقد آنتی بادی هایی است که کودک را در مقابل بیماری ها مصون می سازد.
- کودکی که با شیرمصنوعی تغذیه می شود احتمال بیشتری دارد که در اثر اسهال و عفونت های ریوی و سوء تغذیه به بیماری شدید دچار شود به خصوص اگر شیر مصنوعی، به روش درستی آماده نشده باشند.

- در صورت ابتلا مادر به باید او شیردهی خود را به طور کامل قطع کند در غیر این صورت یعنی تغذیه توام شیرخوار، احتمال انتقال HIV ادامه می یابد.
- مادر برای آماده کردن شیر مصنوعی به سوخت و آب تمیز (که به مدت یک تا دو ثانیه حسابی بجوشد) و برای شستن فنجان شیرخوار هم به مایع شوینده نیاز دارد.
- آماده سازی شیر مصنوعی زمان می برد و باید برای هر وعده تغذیه ، شیر بطور تازه آماده شود.
- شیر مصنوعی گران قیمت است و باید خانواده بودجه کافی داشته باشند. کودک در ۶ ماه اول زندگی به ۴۰ قوطی ۵۰۰ گرمی شیر مصنوعی نیاز دارد که حدوداً "معادلریال در ماه می شود.(به قیمت محلی محاسبه شود)
- شیرخوار باید شیر را با فنجان بخورد. کودکان حتی وقتی که خیلی کوچک هستند می توانند تغذیه با فنجان را بیاموزند ، اما این کار ممکن است قدری طول بکشد. اگر با بطری تغذیه شود مضرات استفاده از بطری هم اضافه می شود.
- ممکن است حاملگی مجدد برای مادر خیلی زود اتفاق بیافتد.

به شیرخوارن زیر یکسال شیر دام حتی به صورت رقیق شده داده نشود. مقداری که برای تهیه فرنی استفاده می شود برای شیرخوار اشکالی ایجاد نمی کند.

معایب شیر دام برای تغذیه شیرخوار :

- هضم شیر دام برای شیرخواران مشکل است و حاوی تمامی مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار نیز نمی باشد. به شیر تازه و شیر فرآوری شده، هردو باید به میزان دقیق آب و شکر افزوده شود. همچنین ، شیرخواران به مکمل های ریز مغذی ها نیاز دارند.
- در شیرهای پرچرب کامل میزان پروتئین و برخی مواد معدنی خیلی بالا است و دفع زیاد مواد زائد برای کلیه های نارس شیرخوار بسیار مشکل است.
- در صورتی که شیرخوار با شیر دام تعدیل شده (افزودن آب و شکر) در خانه تغذیه شود ، به خصوص اگر به طرز صحیحی آماده نشده باشد، احتمال ابتلا کودک به اسهال ، عفونت های تنفسی و سوء تغذیه افزایش می یابد.
- آماده کردن شیر دام تعدیل شده در خانه زمان می برد و مادر در هر وعده تغذیه باید شیر تازه آماده کند، مگر این که یخچال داشته باشد.
- کودک در ۶ ماه اول حدود ۱۵ لیتر شیر در هر ماه نیاز دارد. همچنین باید شکر و مکمل های ریز مغذی ها را خریداری نماید که تقریباً ".....ریال در ماه می شود.(به قیمت محلی محاسبه شود).
- کودک باید شیر را با فنجان بنوشد ، کودکان حتی وقتی خیلی کوچک هستند می توانند تغذیه با فنجان را بیاموزند ، اما این کار ممکن است قدری طول بکشد.
- مادر برای آماده کردن شیر به سوخت و آب تمیز (با جوشاندن حسابی به مدت یک تا دو ثانیه)، و برای شستن فنجان شیرخوار هم به مایع شوینده نیاز دارد.
- ممکن است حاملگی مجدد برای مادر خیلی زود اتفاق بیافتد.
- در صورت ابتلا مادر به باید او شیردهی خود را به طور کامل قطع کند در غیر این صورت یعنی تغذیه توام شیرخوار، احتمال انتقال HIV ادامه می یابد.

هنگام بررسی بسته های شیرمصنوعی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

- برای تغذیه شیرخوار از چه سنی مناسب اند؟
- برای شیرخوار سالم یا موارد خاص استفاده می شوند؟
- در مورد ترکیبات آن ها چه چیزی گفته شده است؟
- چه دستورالعملی برای استفاده از آن ها داده شده؟
- آیا این دستورالعمل ها درست و دقیق هستند و توضیح داده شده که شیر را به چه نسبتی مخلوط کنند؟
- مادر تا کتون برای تغذیه شیرخوارش از چه شیرهایی استفاده کرده، ممکن است بخواهد از آن استفاده کند؟
- آیا استفاده از این شیرها برای تغذیه شیرخوار میسر یا نامناسب است؟

مقدار شیر مورد نیاز شیرخوار محروم از شیرمادر

کودکی که با فنجان تغذیه می شود، می تواند مقدار شیر دریافتی را از طریق امتناع از خوردن شیر کنترل کند، که نشان می دهد دریافت شیر او به اندازه کافی بوده است. مقدار شیری که کودک در هر بار می خورد متفاوت است اما مادر باید تصمیم بگیرد که چه مقدار شیر در فنجان بریزد

یک نوزاد رسیده (ترم) با وزن ۲/۵ کیلوگرم یا بیشتر بطور متوسط باید ۱۵۰ میلی لیتر شیر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدنش در روز دریافت کند. این مقدار باید براساس سن کودک به ۶، ۷، یا ۸ وعده تقسیم شود. مقدار شیر در یک وعده تغذیه متغیر است.

برآورد مقدار شیر مورد نیاز یک کودک در روز			
سن کودک	تعداد دفعات تغذیه در روز	مقدار شیر یا فرمولا در هر وعده تغذیه	کل شیر یا فرمولا در روز
تولد تا یک ماهگی	۸	۶۰ میلی لیتر	۴۸۰ میلی لیتر
۱ تا ۲ ماهگی	۷	۹۰ میلی لیتر	۶۳۰ میلی لیتر
۲ تا ۴ ماهگی	۶	۱۲۰ میلی لیتر	۷۲۰ میلی لیتر
۴ تا ۶ ماهگی	۶	۱۵۰ میلی لیتر	۹۰۰ میلی لیتر

نوزاد به مقادیر کم ولی با دفعات زیاد تغذیه می شود. اما همچنان که شیرخوار بزرگ تر می شود، این مقدار بتدریج افزایش می یابد.

اگر کودک در یک وعده، کم تغذیه می شود، در وعده بعدی مقدار بیشتری شیر به او عرضه کنید یا وعده بعدی تغذیه او را زودتر انجام دهید، بویژه اگر کودک علائم گرسنگی را نشان می دهد.

بخاطر داشته باشید اگر کودک به اندازه کافی وزن نمی‌گیرد، ممکن است نیاز به تغذیه با دفعات بیشتر از معمول یا مقدار بیشتر در هر بار تغذیه، مطابق با وزن مورد انتظار برای سن اش داشته باشد.

تعداد قوطی شیرمصنوعی مورد نیاز شیرخوار طبق دستورعمل کشوری تعیین شده است. به دستورعمل مراجعه کنید.

چگونگی آماده کردن شیرمصنوعی برای تغذیه شیرخوار

مادرانی که شیرخوارشان از شیر مادر محروم می‌باشند یا دیگر مراقبین شیرخواران باید بدانند که چگونه شیر جایگزین را برای تغذیه آنان آماده کنند. تغذیه جایگزین باید به بهترین، سالم‌ترین و مناسب‌ترین راه ممکن آماده شود تا خطر بیماری را کاهش دهد.

کودکی که با شیر مادر تغذیه نمی‌شود به دو دلیل با افزایش خطر بیماری روبرو است:

- تغذیه جایگزین ممکن است با میکروب‌های بیماری‌زا آلوده شده باشد که موجب بیماری می‌گردد.

- کودک از ایمنی اکتسابی تغذیه با شیر مادر محروم می‌باشد.

مادران باید این مهارت را در حضور یک کارمند بهداشتی در منزل یا در یک مرکز بهداشتی درمانی تمرین کنند، بطوری که قادر شوند این کار را به همان طریق و به آسانی در هر زمان انجام دهند.

زمانی که مادر می‌خواهد شیر جایگزین را تهیه کند، این نکته خیلی مهم است که شیر و آب سالم را به میزان صحیح مخلوط نماید. اگر شیر مورد نیاز شیرخوار به روش نادرست تهیه شود، ممکن است او بیمار یا دچار سوء تغذیه شود.

داخل قوطی شیر مصنوعی یا فرمولای تجاری یک پیمانه یا قاشق مخصوص وجود دارد که باید فقط برای همان نوع شیر استفاده شود.

انواع مختلف شیرهای مصنوعی ممکن است پیمانه‌هایی با اندازه‌های متفاوت داشته باشند. پیمانه‌ها را باید به اندازه‌ای از پودر شیر پر کرد که سر صاف یا مسطح باشند. برای این کار از یک کارت تمیز یا دسته یک قاشق استفاده کنید. شیر را با پیمانه‌های سرپر ولبریز اندازه‌گیری نکنید.

شما باید به مادر نشان دهید چگونه آب را اندازه‌گیری کند. اگر مادر یک پارچ یا ظرف اندازه‌گیری مدرج ندارد، از او بخواهید یک ظرف از خانه بیاورد تا شما برایش علامت گذاری کنید. این ظرف باید:

- به راحتی قابل دسترس باشد
- به آسانی شسته و استریل شود
- داخل آن قابل رؤیت باشد.
- بتوان آن را با رنگ علامت زد یا نشان ماندگار روی آن گذاشت.

به جای ظرف فوق می توان یک ظرف دیگر را به راحتی بعنوان پیمانه استفاده کرد که با مقدار مورد نظر تا لبه پر شود.
برای علامت گذاری ظرف مورد استفاده مادر ، اول مقدار صحیح آب یا شیر را با مقیاس خودتان اندازه بگیرید ، سپس آن را درون ظرف مادر بریزید و ظرف او را علامت بزنید. اگر شما یک پارچ اندازه گیری مدرج دارید می توانید از آن بعنوان مقیاس اندازه گیری استفاده کنید.

توجه: نکات مربوط به جوشاندن آب، تمیز کردن فنجان و بطری را در مبحث آماده سازی بهداشتی غذا (فصل) مطالعه کنید.

باورهای نادرست و واقعیت‌ها درباره شیرمادر

باورهای غلط مادر و خانواده مانع شیردهی می‌گردند. از جمله این باورها : تصور عدم توانایی مادر در دادن شیر به فرزندان دوقلو، کم وزن و نارس، داشتن پستان کوچک، تغییر شکل و بد فرم شدن پستان در اثر شیردهی، اعتقاد به عدم تولید شیر در نزدیکی، سیر نشدن شیرخوار با شیر مادر، طعم بد شیر مادر، داشتن شیر بد و...

ایجاد هرگونه شک و تردید در مادر و عدم حمایت و کمک به او، باورهای غلط را در او تقویت می‌کند. باید به مادر اطمینان داد که هر چه مکیدن پستان توسط شیرخوار بیشتر و مکررتر باشد تولید و ترشح شیر نیز بیشتر خواهد شد لذا باید دوقلوها را مرتباً و به دفعات مکرر و بخصوص، همزمان، به پستان مادر گذاشت تا با تولید و ترشح بیشتر شیر، هر دو کودک تغذیه خوبی داشته باشند.

باید اطمینان داد که پستان‌های کوچک هم می‌توانند شیر کافی تولید کنند و شیردهی باعث تغییر شکل و بد فرم شدن پستان نمی‌شود.

سخنان و عقاید مادر را بایستی با دقت و حوصله کافی گوش کرد و با مشاوره و راهنمایی‌های صحیح، باورهای غلط را از بین برد.

در بخش ذیل برخی باورهای غلط شایع و واقعیاتی که لازم است برای اصلاح باور غلط به مادر آموزش داده شود آمده است:

باور نادرست ۱:

شیر آغوز در نوزاد زردی ایجاد می‌کند و برای تغذیه ی او مناسب نیست و باید دور ریخته شود.

واقعیت:

آغوز (Colostrum) نه تنها باعث زردی نمی‌شود بلکه شاید بهترین راه کاهش زردی نوزاد، تغذیه مکرر با آن باشد. آغوز بسیار مغذی است و همچنین به عنوان اولین ایمن کننده ی نوزاد در مقابل بیماری‌ها به حساب می‌آید و تغذیه با آن بسیار ضروری و حیاتی است.

• باور نادرست ۲:

شیر اگر در پستان بماند خراب می‌شود.

واقعیت:

ماندن شیر در پستان مادر باعث فساد شیر او نمی‌شود، اما عدم تخلیه پستان موجب کاهش تولید شیر و نیز باعث احتقان یا پرخونی پستان می‌گردد، پس اگر به هر دلیلی کودک قادر به خوردن شیر نباشد بهتر است مادر برای حفظ تولید شیر و جلوگیری از احتقان پستان، شیر خود را بدوشد.

• باور نادرست ۳:

تا چند روز پس از زایمان و یا هر زمانی که مادر احساس کند شیرش کم شده نباید شیر بدهد تا شیر بیشتری در پستانهایش جمع شود.

واقعیت:

تأخیر در شروع تغذیه با شیر مادر و یا دیر به دیر شیر دادن نوزاد باعث می شود شیر دیرتر جریان پیدا کند و احتمالاً احتقان پستان نیز ایجاد شود، بنابر این باید ظرف نیم ساعت بعد از تولد نوزاد را به پستان مادر گذاشت و پس از آن نیز به طور مکرر و بر حسب میل شیرخوار او را شیر داد. مکیدن های مکرر کودک باعث افزایش تولید شیر مادر می شود در حالی که دیر به دیر شیر دادن حجم شیر را کاهش می دهد.

• باور نادرست ۴:

اگر پستان های مادر کوچک باشند نمی توانند شیر کافی تولید کنند.

واقعیت:

تولید شیر کافی ارتباطی با اندازه پستان (Breast) ندارد، بلکه این ترشح هورمون پرولاکتین (Prolactin) در اثر مکیدن بیشتر پستان توسط شیرخوار است که تولید شیر را بیشتر می کند.

• باور نادرست ۵:

شیرخواران بیمار نباید با شیر مادر تغذیه شوند.

واقعیت:

در هنگام بیماری بویژه تب و اسهال، کودک به مایعات، مواد مغذی و تغذیه مناسب بیشتر نیاز دارد و این نیاز به بهترین صورت با شیر مادر برآورده می شود. با اینکه اکثر کودکان در هنگام بیماری های تب دار یا اسهال کم اشتها می شوند، ولی علاقه شان به تغذیه با شیر مادر بیشتر می شود. در این مواقع، تغذیه مکرر با شیر مادر توصیه می شود.

• باور نادرست ۶:

شیرخواران سالم کوچکتر از شش ماه، که با شیر مادر [نه شیر مصنوعی] تغذیه می شوند در هوای خیلی گرم نیاز به آب اضافی دارند.

واقعیت:

مطالعات متعدد نشان داده که شیرخواران در ۶ ماه اول پس از تولد به جز شیر مادر و قطره ویتامین A+D به چیز دیگری نیاز ندارند و اگر شیر مادر به طور مکرر و هنگام تقاضای شیرخوار به او داده شود نیازهایش به طور کامل تأمین می گردد. اما پس از ۶ ماهگی و با شروع تغذیه تکمیلی، دادن آب جوشیده ی سرد شده به شیرخوار لازم است.

• باور نادرست ۷:

بیدار شدن شیرخوار در شب و یا زود به زود شیر خوردن و گریه و بی قراری او دلیل بر ناکافی بودن شیر مادر است.

واقعیت:

زود به زود شیر خواستن شیرخوار، به علت آسان بودن هضم شیر مادر نسبت به شیرخشک و تخلیه سریع معده و بنابراین زودتر گرسنه شدن اوست. وزن کردن مرتب و مکرر کودک و رسم منحنی رشد او بهتر از هر چیز دیگری می تواند وضعیت تغذیه و کافی بودن شیر مادر را نشان دهد. وزن گرفتن خوب نشانه ی کافی بودن شیر مادر است.

باور نادرست ۸ :

شیر بعضی از مادران رقیق و آبکی است و ارزش تغذیه ای پایینی دارد!

واقعیت:

از شاهکارهای خلقت این است که ترکیبات شیر بر اساس نیاز شیرخوار تغییر داده می شود. در آغاز هر وعده شیردهی، شیر مادر آبکی تر است و میزان چربی آن کمتر است، اما وقتی شیرخوار به مکیدن ادامه دهد میزان چربی شیر بیشتر می شود. ابتدای شیر آبکی تر است و به برطرف شدن تشنگی شیرخوار کمک می کند و انتهای شیر چرب تر است و به سیر شدن و وزن گیری او کمک می کند و شیرخوار باید هر دو قسمت شیر را دریافت کند تا تمام نیازهای بدنش تأمین شود.

باور نادرست ۹ :

دفعات و مدت هر بار تغذیه از شیر مادر باید محدود باشد!

واقعیت:

دفعات و مدت هر بار شیر خوردن فقط بر حسب میل و تقاضای خود شیرخوار است و نباید محدودیتی برایش گذاشته شود. بچه در هر بار شیر خوردن باید آنقدر به مکیدن ادامه دهد تا با رضایت کامل پستان را رها کند و تعداد وعده های شیر نیز باید مطابق میل او باشد. این باعث می شود که شیرخوار هم شیر چرب انتهایی را دریافت کند و هم پستان مادر را کاملاً خالی کند.

باور نادرست ۱۰ :

قبل از هر بار شیر دادن مادر باید پستان هایش را با صابون بشوید!

واقعیت:

شستن پستان فقط یک بار در روز آن هم با آب تنها کافی است و نباید برای شستشوی پستان، به جز در مواقع استحمام، از صابون استفاده کرد، چون نوک پستان را تحریک کرده و باعث از بین رفتن چربی های پوست و ترک خوردن آن می شود.

باور نادرست ۱۱ :

کار در خارج از منزل مانع شیردهی مادر است و باید تغذیه با شیر خشک را شروع کرد!

واقعیت:

در ماه های اول تولد باید تلاش شود شیرخوار در کنار مادر باشد و مادر کار خارج از منزل را دیرتر شروع نماید. همچنین، مادر یکی دو ماه قبل از بازگشت به کار، شیر خود را دوشیده و ذخیره ی مناسبی را در فریزر برای آینده فرزندش فراهم نماید. در محل کار نیز هر ۳ یا ۴ ساعت یک بار شیر خود را بدوشد و در یخچال نگه دارد و در پایان کار آن را به خانه بیاورد تا روز بعد توسط اطرافیان به شیرخوار خورانده شود. اگر این شیر کافی نبود می توان از شیر ذخیره شده در فریزر نیز کمک گرفت و با قاشق، فنجان یا استکان و بدون استفاده از بطری کودک را تغذیه نمود. مادر پس از بازگشت به منزل و در طول شب باید فرزندش را به طور مکرر شیر بدهد زیرا این مکیدن های مکرر باعث افزایش ترشح شیر مادر می شود.

باور نادرست ۱۲ :

استفاده از پستانک یا گول زنک برای آرام کردن شیرخوار لازم است!

واقعیت:

استفاده از پستانک چند دلیل مهم توصیه نمی شود: الف- به علت احتمال آلودگی باعث بیماری هایی مثل برفک دهان،

اسهال، و عفونت گوش میانی می شود. ب- باعث بدشکلی فرم دهان و دندان می گردد. ج- میل مکیدن را در شیرخوار ارضاء کرده و موجب کاهش مکیدن پستان و در نتیجه کم شدن شیر مادر می شود. بنابراین این بهتر توصیه می شود برای آرام کردن، شیرخوار به پستان گذاشته شود.

باور نادرست ۱۳ :

شیرخوار را نباید زیاد در آغوش گرفت چون بغلی می شود!

واقعیت:

همه ی شیرخواران به تماس مادر، گرمای بدن او و به مهر و محبتش نیاز فراوان دارند. آنان با شنیدن تپش قلب مادر آرامش یافته و در آغوش او احساس امنیت می کنند. این محبت را نباید از کودک دریغ نمود. برخی از شیرخواران بی قراری و گریه ی بیشتری دارند، با در آغوش گرفتن، راه بردن، صحبت و نوازش توسط پدر و لالایی مادر آرام تر می شوند.

باور نادرست ۱۴ :

عادت ماهیانه مادر (menstruation) و فعالیت جنسی (sexual activity) او بر شیر اثر نامطلوب دارد!

واقعیت:

در دوره ی عادت ماهیانه ممکن است شیر مادر کمی شور شود، اما رابطه جنسی هیچ اثری بر طعم شیر مادر ندارد.

باور نادرست ۱۵ :

آشامیدن زیاد مایعات، میزان شیر را افزایش می دهد!

واقعیت:

نوشیدن بیش از حد مایعات شیر مادر را زیاد نمی کند، بلکه عامل مهم در افزایش شیر مادر، مکیدن مکرر (sucking) پستان توسط شیرخوار است.

باور نادرست ۱۶ :

تغذیه با شیر مصنوعی (شیر خشک) آسان تر از شیر مادر است!

واقعیت:

تغذیه با شیر مصنوعی مستلزم جوشاندن آب، پیمانه کردن شیر و استفاده از وسایلی مانند بطری و پستانک جهت شیردهی است که طبعاً عملی دشوارتر از تغذیه با پستان مادر است. از طرف دیگر، روش مکیدن از بطری با روش مکیدن از پستان متفاوت است و شیرخوار برای خوردن شیر از بطری، اکسیژن بیشتری مصرف می کند.

باور نادرست ۱۷ :

شیر دوشیده شده مادر قابل نگهداری نیست!

واقعیت:

شیر دوشیده شده مادر را در دمای اتاق می توان حداقل ۴ تا ۸ ساعت و در یخچال تا ۴۸ ساعت نگهداری کرد.

باور نادرست ۱۸ :

شیر دادن صرفاً یک امر غریزی است و نیازی به مهارت ندارد!

واقعیت:

شیر دادن ضمن این که غریزی است، نیاز به تمرین و آموزش هم دارد و مادر باید مهارت های لازم را به دست بیاورد تا در شیردهی موفق باشد.

باور نادرست ۱۹ :

ترک نوک پستان (breast fissure) مانع شیر دادن است و مادری که مبتلا به ماستیت (mastitis) یا التهاب و عفونت پستان) یا آبسه پستان است نباید شیر دهد!

واقعیت:

زخم، شقاق، درد و تورم و التهاب پستان مانعی برای ادامه شیردهی نیست. در موارد بروز آبسه (breast abscess) نیز تغذیه از پستان مبتلا منعی ندارد مگر آنکه آبسه به مجاری شیر سر باز کرده باشد (که معمولاً هم به بیرون از نسج پستان باز می شود). در زمان جراحی و تخلیه چرک از آبسه، اگر محل شکاف دور از نوک پستان باشد ادامه شیردهی بلا مانع است و در صورت نزدیک بودن به نوک پستان، تغذیه از پستان دیگر که سالم است ادامه می یابد.

باور نادرست ۲۰ :

مدفوع شیر مادر خواران، مانند کودکانی است که با شیر مصنوعی (formula) تغذیه می شوند!

واقعیت:

مدفوع شیر مادر خواران، به طور طبیعی شل تر و تعداد دفعات آن هم بیشتر است.

باور نادرست ۲۱ :

مادری که شیرخوار دوقلو، نارس، یا کم وزن دارد نمی تواند شیر بدهد!

واقعیت:

مادران قادرند فرزندان نارس (premature)، کم وزن (low birth weight) و حتی سه قلو را شیر دهند، در این موارد هیچ شیرینی مناسب تر از شیر خود مادر برای شیرخوارش نیست، حتی نوزادان نارس با خوردن شیر مادر رشد مغزی بهتری خواهند داشت.

باور نادرست ۲۲ :

نوزادان نارس، پیش از آغاز تغذیه با شیر مادر (mother's milk)، نیازمند تغذیه با بطری هستند!

واقعیت:

نوزادان نارس (Premature)، از پستان مادر خیلی راحت تر از بطری تغذیه می کنند و در حین تغذیه از پستان، دمای بدن و فشارخونشان با ثبات تر خواهد بود و اکسیژن بهتری خواهند داشت. البته، نوزادانی را که وزن بدو تولدشان خیلی پایین است (۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ گرم) از وقتی می توان زیر پستان مادر گذاشت که وضعیت عمومی پایداری داشته باشند، گرچه شاید نتوانند تا چند هفته پستان را به خوبی بگیرند. در حقیقت، وزن و سن داخل رحمی آنچنان اهمیتی نسبت به آمادگی خود شیرخوار برای مکیدن پستان ندارد و دلیلی وجود ندارد شیرخوار با بطری (Bottle) تغذیه شود. اما در صورت نیاز به شیر کمکی (Formula)، می توان آن را با فنجان (Cup)، قاشق و یا هر وسیله دیگری غیر از پستانک به شیرخوار داد.

باور نادرست ۲۳ :

نداشتن شیر، مسئله ای ارثی و خانوادگی است!

واقعیت:

این مسئله درست نیست و اکثریت عظیم مادران می توانند شیر کافی تولید کنند زیرا تولید شیر بستگی کامل به شروع شیر دادن بلافاصله پس از تولد و تکرر شیر دادن بر حسب تقاضای شیرخوار دارد.

باور نادرست ۲۴:

شیر مصنوعی (Formula)، به دلیل آن که ویتامین و املاح افزودنی دارد از شیر مادر بهتر است!

واقعیت:

مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و تکامل شیرخوار و همچنین مواد ایمنی بخش فراوانی در شیر مادر وجود دارند. ترکیبات شیر مادر، از هنگام تولد تا پایان شیرخوارگی، متناسب با نیاز کودک تغییر می کند اما چنین سازگاری و تغییراتی در ترکیب شیر مصنوعی هرگز وجود ندارد. املاح (Minerals) و ویتامین ها (Vitamins) به غیر از ویتامین D، به مقدار و تناسب کافی جهت رشد و نمو ایده آل در شیر مادر یافت می شوند.

باور نادرست ۲۵:

اگر مادر بیمار شود، بیماری او هر چه باشد، شیر دادن باید متوقف شود!

واقعیت:

فقط در صورت ابتلای مادر به چند نوع بیماری است که شیر دادن توصیه نمی شود. در اکثر بیماری های عفونی، مادر از طریق شیر خود، عوامل ایمنی بخش ضد آن بیماری را به فرزندش انتقال می دهد و مانع از ابتلای شیرخوار به بیماری شدید می گردد.

باور نادرست ۲۶:

در صورت مصرف هر نوع دارو توسط مادر، شیر دادن ممنوع است!

واقعیت:

داروهایی که مصرف آنها در شیردهی ممنوع است و ممکن است برای شیرخوار آسیب رسان باشند اندک اندک و از چند قلم تجاوز نمی کنند. در این موارد هم که به علت مصرف دارو (Drug) قطع موقت شیر توصیه می شود، مادر می تواند شیر خود را به طور مرتب دوشیده و دور بریزد تا ترشح شیر قطع نشود و بتواند بعد از قطع دارو به شیردهی ادامه دهد.

باور نادرست ۲۷:

مادری که سیگار می کشد، بهتر است به فرزندش شیر ندهد!

واقعیت:

گرچه کشیدن سیگار (Smoking) باعث کم شدن حجم شیر مادر و ایجاد ناراحتی هایی مثل بی قراری و کولیک (Colic) در شیرخوارش می گردد، لیکن، به دلیل مزایای زیاد شیر مادر در مقایسه با شیر مصنوعی، بهتر است مادر سیگاری، شیر خودش را به شیرخوار بدهد با این توصیه که حدود ۵/۲ ساعت قبل از هر نوبت شیردهی، از کشیدن سیگار خودداری کند. به هر حال، کشیدن سیگار و دادن شیر از پستان، بهتر از کشیدن سیگار و دادن شیر مصنوعی است. البته بهترین کار، ترک سیگار در دوره شیر دهی است.

باور نادرست ۲۸:

مادر هر چه بیشتر غذا بخورد، شیر بیشتری هم تولید می کند و برای تولید شیر باید از رژیم غذایی ویژه ای پیروی نماید!

واقعیت:

مادر در دوران شیردهی نیازی به داشتن رژیم خاص یا پرهیز ندارد، ولی برای حفظ سلامتی و تأمین ذخایر بدنش باید به اندازه کافی و در حد نیاز بخورد و بیاشامد.

باور نادرست ۲۹ :

امکان افزایش تولید شیر در هیچ یک از مادران وجود ندارد!

واقعیت:

تولید شیر، یک جریان عصبی-هورمونی است که با آرامش مادر، به پستان گذاشتن مکرر شیرخوار، و لمس و نگاه کردن به او شروع شده و ادامه می یابد. بهترین راه افزایش شیر، مکیدن مکرر پستان توسط شیرخوار است.

باور نادرست ۳۰ :

اگر شیر مادر خشک شد، دیگر امکان برگشت وجود ندارد!

واقعیت:

چون تولید شیر یک جریان عصبی-هورمونی است، بنابر این می تواند برگشت پذیر هم باشد و با مکیدن مکرر شیرخوار، لمس و نگاه کردن به او امکان ترشح دوباره شیر وجود دارد. ضمناً، هر چه از قطع شیردهی مدت کمتری گذشته باشد، برگشت مجدد آن هم راحت تر انجام می گیرد.

اهمیت تغذیه تکمیلی

تا اینجا، از بدو تولد تا پایان ۶ ماهگی را مورد توجه قرار دادیم. سن ۶ ماهگی تا ۲ سالگی نیز در رشد و تکامل کودک از اهمیت خاصی برخوردار است و شما در این دوره زمانی نقش مهمی در کمک به خانواده ها دارید.

حفظ تداوم تغذیه با شیر مادر :

تغذیه با شیرمادر به تنهایی "تغذیه انحصاری با شیرمادر"، باید تا پایان ۶ ماه اول تولد (۱۸۰ روزگی) ادامه یابد.

تغذیه با شیرمادر از ۱۲-۶ ماهگی بیش از نیمی از نیازهای تغذیه ای شیرخوار و از ۲۴-۱۲ ماهگی، حداقل یک سوم آن را تامین می کند. علاوه بر نیازهای تغذیه ای، تغذیه با شیرمادر شیرخوار را در مقابل بسیاری از بیماری ها مصون کرده و تماس و ارتباط تنگاتنگ کودک با مادر را که به تکامل روانی او کمک می کند، تامین می نماید. اگر نتوانید تغذیه با شیرمادر را فعالانه حمایت کنید، ممکن است در اثر اشتباه باعث شکست شوید. هر بار که مادری را می بینید، سعی کنید اعتماد به نفس او را تقویت کنید. مادر را برای کارهای درستی که انجام داده است تشویق کنید. اطلاعات مرتبط در اختیار او قرار دهید و پیشنهاد های مناسبی ارائه کنید.

پیام کلیدی یک :

تغذیه با شیرمادر در طول دو سال اول زندگی موجب رشد و تکامل مطلوب شیرخوار شده او را قوی و سالم می کند.

تعریف تغذیه تکمیلی


تغذیه شیرخوار با غذاهای دیگر علاوه بر شیرمادر را تغذیه تکمیلی می نامند. به این غذاها اصطلاحاً "غذاهای کمکی اطلاق می شود.

از آنجا که برای تأمین نیازهای تغذیه ای شیرخوار علاوه بر شیر مادر نیاز به غذاها و مایعات اضافی است به آن ها غذاهای کمکی می گویند. غذاهای تکمیلی، باید مغذی باشند و از لحاظ مقدار نیز باید برای کمک به رشد کودک کافی باشند. طی دوره تغذیه تکمیلی، شیرخوار به تدریج به خوردن غذاهای خانواده عادت می کند، اگرچه تغذیه با شیرمادر همچنان به عنوان منبع مهم تامین مواد مغذی و عوامل حفاظتی حداقل تا ۲ سالگی ادامه می یابد.

کمبود انرژی :

انرژی مورد نیاز بر حسب سن و مقدار تامین شده از طریق شیرمادر

انرژی



در این نمودار، هر ستون بیانگر میزان کل انرژی مورد نیاز شیرخوار بر حسب سن اوست. ستون‌ها به تدریج بلندتر می‌شوند که نشان می‌دهد هر چه شیرخوار بزرگ‌تر، درشت‌تر و فعال‌تر می‌شود، میزان انرژی مورد نیازش نیز افزایش می‌یابد. قسمت تیره نشان می‌دهد که چه مقدار از این انرژی توسط شیر مادر تامین می‌شود. از ۶ ماهگی به بعد بین کل انرژی مورد نیاز شیرخوار و مقدار انرژی که توسط شیر مادر تامین می‌شود، خلاء (کمبودی) وجود دارد و هر چه سن کودک بزرگ‌تر می‌شود، این فاصله نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، برای اغلب شیرخواران، پایان ۶ ماهگی زمان مناسبی برای شروع غذاهای کمکی است. تغذیه تکمیلی از پایان ۶ ماهگی به رشد مطلوب شیرخوار کمک نموده و همچنین در فعال بودن شیرخوار و سیر بودن او کمک می‌کند.

پیام کلیدی دو:

شروع تغذیه تکمیلی به همراه تغذیه با شیرمادر بعد از پایان ۶ ماهگی به رشد مطلوب شیرخوار کمک می‌کند.

اکثر شیرخواران قبل از ۶ ماهگی نیازی به تغذیه تکمیلی ندارند. اگر کودک زیر ۶ ماه است، با مادر مشاوره کنید که چگونه شیرخوار را منحصرًا با شیرمادر تغذیه کند، طوری که شیرخوار شیر مورد نیازش را به حد کافی دریافت کند.

اگر شیرخوار شیرمادر دریافت نمی کند ، به جای اینکه تغذیه تکمیلی را زودتر از موعد شروع کنید ، تغذیه با شیر جایگزین را تا پایان ۶ ماهگی ادامه دهید .

خطرات شروع زودرس غذاهای کمکی (قبل از ۶ ماه)

شروع زودرس غذاهای کمکی (قبل از ۶ ماه) ممکن است :

- جای تغذیه با شیرمادر را گرفته و در تامین نیازهای تغذیه ای شیرخوار اختلال ایجاد می کند .
- اگرچه خوردن حریره و سوپ آبکی و رقیق برای شیرخوار راحت تر است، ولی منجر به کاهش دریافت مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار می شود.
- به دلیل دریافت کمتر عوامل حفاظتی شیرمادر ، احتمال ابتلا به بیماری ها افزایش می یابد .
- با توجه به اینکه غذاهای تکمیلی به اندازه شیرمادر پاکیزه نبوده و سهل الهضم نیستند احتمال ابتلا به اسهال نیز افزایش می یابد .
- اگر تغذیه با شیرمادر به دفعات کمتری صورت گیرد خطر حاملگی مادر افزایش می یابد .

خطرات شروع دیررس غذاهای کمکی

خطرات شروع غذاهای کمکی دیرتر از موعد مقرر نیز با خطراتی همراه است . زیرا :

- شیرخوار مواد مغذی مورد نیاز برای تامین رشد مطلوب را دریافت نخواهد کرد.
- رشد و تکامل شیرخوار آهسته تر می شود.
- ممکن است شیرخوار به دلیل کاهش دریافت برخی از مواد مغذی دچار سوء تغذیه یا کم خونی فقر آهن گردد

اکثر شیرخواران قبل از پایان ۶ ماهگی نیازی به غذاهای کمکی ندارند .
اما تمام شیرخواران بعد از ۶ ماه کامل باید غذاهای کمکی دریافت کنند .

غذاهایی که کمبود انرژی را جبران می کنند

همه غذاها مقداری انرژی تولید می کنند. به هر حال در هر جامعه ای حداقل یک غذای اصلی یا عمده وجود دارد. بطور کلی مردم مقدار زیادی از این غذاهای اصلی استفاده می کنند و اکثر انرژی مورد نیاز خود را از آن تامین می کنند. اما این غذاهای اصلی به تنهایی نمی توانند همه نیاز بدن به پروتئین و مواد مغذی را تامین کنند بلکه بخشی از آن ها را تامین می نمایند. غذاهای اصلی باید همراه با دیگر غذاها مصرف شوند تا شیرخوار بتواند به مقدار کافی مواد مغذی مورد نیازش را دریافت نماید.

این نکته مهم است که بدانید غذاهای اصلی که مردم در منطقه شما مصرف می کنند چیست؟ پس از آن شما می توانید به آنها کمک کنید که از این غذاها برای تغذیه شیرخوارشان استفاده کنند.



معهده شیرخوار کوچک است و در ۸ ماهگی، در هر وعده، گنجایش ۲۰۰ میلی لیتر دارد. غذاهای رقیق و آبکی به سرعت این حجم را پر می کنند. تامین انرژی مورد نیاز شیرخواران بر حسب قوام یا غلظت غذاها بسیار متفاوت است. غذاهای غلیظ به جبران کمبود انرژی کمک می کنند.

پیام کلیدی ۳:

غذاهایی که آن قدر غلیظ هستند که از قاشق نمی ریزند، انرژی بیشتری به کودک می رسانند.



غلظت درست

خیلی رقیق

چربی ها و روغن ها


- چربی ها و روغن ها منبع غنی از انرژی هستند. مقدار کمی مثلا یک قاشق مربا خوری روغن یا چربی که به ظرف غذای شیرخوار اضافه شود، در حجم کم انرژی زیادی را فراهم می کند. اضافه نمودن غذاهای چرب یا روغنی به غذاهای شیرخوار باعث می شود که حریره غلیظ یا غذاهای اصلی، نرم تر شده و خوردن آن ها آسان تر شود.
- اگر به غذای شیرخوار مقدار زیادی روغن اضافه شود، ممکن است شیرخوار را زود سیر کند، به طوری که بخشی از غذایش باقی بماند. این بدان معناست که شیرخوار بیشتر انرژی مورد نیازش را از طریق روغن دریافت کرده در حالی که سایر مواد مغذی موجود در غذا را دریافت نکرده است.
- اگر شیرخوار رشد خوبی دارد معمولا" به روغن اضافی نیاز ندارد. شیرخوارانی که که روغن زیاد یا غذاهای سرخ شده بیشتر می خورند اضافه وزن پیدا می کنند.
- مراقبین کودکان باید مواظب باشند که در رژیم غذایی کودک، غذاهای شیرین جایگزین غذاهای دیگر نشوند. برای مثال در کود کان خردسال شیرینی ها، بیسکویت های شیرین و نوشیدنی های شیرین بجای یک وعده غذا مصرف نشوند.
- کودکان خردسال به اسید های چرب ضروری برای رشد مغز، چشم ها و عروق خونی سالم نیاز دارند. این اسیدهای چرب ضروری در شیر مادر وجود دارند
- برای شیرخواران بزرگ تراز ۶ ماه که شیر مادر نمی خورند ماهی و روغن های گیاهی مانند آفتاب گردان و ذرت از منابع خوب اسید های چرب ضروری هستند.

نقش مواد مغذی در رشد و تکامل کودکان

آهن:

کودکان خردسال برای خون سازی، رشد و تکامل و همچنین مقابله با عفونت ها به آهن نیاز دارند. کمبود آهن در کودکان موجب کاهش قدرت یاد گیری و بهره هوشی می گردد، بنابراین کمبود آن باید جبران شود.

مقدار آهن جذب شده مورد نیاز و مقدار فراهم شده



در نمودار فوق، قسمت بالای هر ستون مقدار آهن جذب شده مورد نیاز شیرخوار را نشان می دهد. آهن مورد نیاز یک نوزاد رسیده (فول ترم) که با ذخیره آهن خوب متولد شده، به مدت ۶ ماه تأمین می شود. مناطق سیاه قاعده ستون های نمودار فوق، مقدار آهن فراهم شده از طریق شیرمادر را در تمام مدتی که تغذیه با شیر مادر ادامه دارد، نشان می دهد..

رشد کودکان خردسال در سال اول سریع تر از سال دوم است. به همین دلیل آهن مورد نیاز خردسالان بیشتر از زمانی است که کودک بزرگ تر می شود.

بیشتر ذخایر آهن در شش ماهه اول استفاده می شود، بنابراین بعد از این زمان فاصله ای بین آهن مورد نیاز کودک و مقدار آهنی که از شیر مادر دریافت می کند دیده می شود. این فاصله باید توسط غذاهای کمکی پر شود. (مناطق سفید در نمودار فوق)

منابع غذایی آهن شامل آهن هم و آهن غیر هم می باشند. انواع گوشت ها (گوشت قرمز، مرغ و ماهی) منابع غذایی آهن هم هستند که جذب بالایی دارند و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن جذب می شود و جذب آنان تحت تاثیر عوامل کاهش دهنده جذب آهن یعنی تانن ها (در چای و قهوه و دم کرده های گیاهی)، فیبر و فیتات (در پوسته غلات و حبوبات) قرار نمی گیرد. آهن غیر هم در منابع غذایی گیاهی مانند غلات، حبوبات، سبزی های سبز تیره، زرده تخم مرغ، انواع خشکبار و مغزها وجود دارد. آهن غیر هم حدود ۳ تا ۸ درصد جذب می شود و جذب آن تحت تاثیر عوامل افزایش دهنده جذب آهن (ویتامین C

موجود در میوه ها و سبزی ها، اسید لاکتیک و آهن هم) و کاهش دهنده های جذب آهن قرار می گیرد. بنابر این توصیه کنید جهت افزایش جذب آهن غیر هم در برنامه غذایی روزانه کودک حتما از غذاهای غنی از ویتامین C مانند گوجه فرنگی، پرتقال، لیمو و سایر مرکبات، سبزی های برگ سبز (مانند جعفری و گشنیز) استفاده شود. همچنین اضافه کردن مقدار کمی گوشت در غذاهای گیاهی جذب آهن غیر هم را افزایش می دهد. معرفی منابع غذایی آهن باید بر اساس سن کودک و اصول تغذیه تکمیلی باشد.

مقدار آهنی که کودک از غذا جذب می کند بستگی به عوامل زیر دارد :

- میزان آهن موجود در غذا
- نوع آهن (آهن گوشت قرمز، مرغ و ماهی بهتر از آهن سبزی ها، حبوبات و تخم مرغ جذب می شود).
- سایر مواد غذایی موجود در همان غذا (بعضی جذب آهن را افزایش و بعضی دیگر کاهش می دهند)
- اگر کودک کم خونی داشته باشد (در این صورت آهن بیشتری جذب می شود)

جذب آهن از طرق زیر کاهش می یابد :

- نوشیدن چای و قهوه (با فاصله کمتر از ۲ ساعت قبل یا بعد از غذا)
- غذاهای حاوی فیبر بالا مانند سیبوس
- غذاهای غنی از کلسیم

روی :

یکی دیگر از موادمغذی که به رشد کودکان و تداوم سلامتی کمک می کند، روی می باشد. جذب روی از منابع حیوانی بیشتر از منابع گیاهی است. انواع گوشت ها به ویژه گوشت قرمز، تخم مرغ، حبوبات مانند عدس، غلات سیبوس دار، انواع مغزها مانند گردو، بادام و فندق از منابع غذایی روی به شمار می روند. معرفی منابع غذایی روی باید بر اساس سن کودک و اصول تغذیه تکمیلی باشد.


پیام کلیدی چهارم

مصرف انواع گوشت ها، تخم مرغ، حبوبات و مغزها در برنامه غذایی کودک نقش مهمی در رشد و تکامل کودکان به عهده دارند.

ویتامین A

ویتامین A یکی از مغذی است که نقش مهمی در رشد کودکان، پیشگیری از عفونت ها (اسهال، عفونت های دستگاه تنفسی و سرخک)، حفظ قدرت دید در تاریکی، سلامت چشم ها و پوست را به عهده دارد.

نمودار - کمبود ویتامین آ



در نمودار فوق ، خط بالایی هر ستون میزان ویتامین آ مورد نیاز روزانه کودک را در سنین مختلف نشان می دهد . ویتامین آ موجود در شیرمادر، بخش وسیعی از ویتامین آ مورد نیاز شیرخواری که رژیم غذایی مادرش کمبود ویتامین آ نداشته باشد را تأمین می کند . همان طور که در تصویر می بینید بین میزان مورد نیاز ویتامین آ کودک خردسال در حال رشد و میزان ویتامین آ دریافتی او فاصله ای بوجود می آید که لازم است این کمبود از طریق غذاهای تکمیلی جبران شود.

ویتامین A در منابع غذایی حیوانی و گیاهی وجود دارند که استفاده از آنان در برنامه غذایی روزانه کودک می تواند کمبود این ویتامین را جبران کند . منابع غذایی حیوانی مانند شیر پرچربی، خامه، کره، پنیر پر چرب و زرده تخم مرغ . منابع غذایی گیاهی شامل انواع سبزی ها و میوه های زرد، نارنجی، قرمز و سبز تیره مانند هویج، کدو حلواپی، گوجه فرنگی ، برگ چغندر، اسفناج، جعفری ، برگ های تیره رنگ کاهو و انواع میوه های زرد رنگ مانند انبه ، زردآلو، طالبی و موز. معرفی منابع غذایی ویتامین A باید بر اساس سن کودک و اصول تغذیه تکمیلی باشد.

این ویتامین می تواند در بدن شیرخوار برای چند ماه ذخیره شود . با توجه به نقش ویتامین آ در رشد و سلامت شیرخواران خانواده ها را برای مصرف غذاهای حاوی ویتامین آ ، ترجیحا به طور روزانه تشویق کنید. وجود انواع سبزی ها و میوه های متنوع در رژیم غذایی به تأمین بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز کودک کمک می کند.

کارکنان بهداشتی درمانی لازم است که از محصولات موجود و قابل دسترس در منطقه ، آگاهی داشته باشند. اگر کارکنان این آگاهی را داشته باشند، می توانند در مورد مفید بودن یا نبودن این محصولات برای کودکان با هر خانواده بحث کنند .

پیام کلیدی پنجم

برگ های سبز تیره و میوه و سبزی های زرد رنگ به کودک کمک می کند تا چشمانی سالم داشته و کمتر به

بیماری های عفونی مبتلا شود.

شما به عنوان مشاور باید:

- مواد غذایی و غذاهای محلی که منابع غذایی آهن، روی و ویتامین A هستند را بشناسید.
- به خانواده ها کمک کنید تا کودکان شان را با غذاهایی که حاوی آهن و روی هستند تغذیه کنند.
- در مورد مصرف صحیح و منظم مکمل آهن و ویتامین A+D آموزش های لازم را ارائه کنید.
- معرفی منابع غذایی بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده و مواد غذایی قابل دسترس باشد.

مایعات مورد نیاز کودک خردسال

کودکی که بطور انحصاری با شیر مادر تغذیه می شود همه مایعات مورد نیازش را از شیر مادر دریافت می کند. اما هنگامی که غذاهای دیگر به برنامه غذایی او اضافه می شود، کودک به مایعات اضافی نیاز دارد. همچنین یک کودک زیر شش ماه که با شیرهای جایگزین تغذیه می شود، به آب اضافی نیاز ندارد.

سایر مایعات را زمانی به کودک بدهید که تشنه بنظر می رسد و هم چنین اگر کودک تب یا اسهال دارد به مایعات اضافی نیاز دارد.

مایعات مورد نیاز کودک خردسال

- آب آشامیدنی بهترین نوشیدنی برای رفع تشنگی کودک است. از انواع آب میوه طبیعی فقط در حد توصیه شده نیز می توان استفاده کرد (کودکان یک تا دو سال نصف فنجان و کودکان دو تا پنج سال سه چهارم فنجان در روز). مصرف آب میوه طبیعی نیز ممکن است منجر به ابتلا شیرخوار به اضافه وزن، چاقی، اسهال، نفخ و فساد دندان و افزایش تمایل کودک به غذاهای با طعم شیرین شود. نوشیدنی هایی که مقدار زیادی شکر دارند علاوه بر اینکه کودک را تشنه تر می کنند، موجب افزایش دریافت شکر نیز می شوند. نوشابه های گازدار برای کودکان خردسال مناسب نیستند.
- بنابراین به هیچ عنوان از آب میوه های صنعتی یا شربت ها و نوشیدنی های شیرین برای تغذیه شیرخوار استفاده نشود.
- چای و قهوه جذب آهن غذا را کاهش می دهند. تا حد امکان از دادن چای و قهوه به کودک خودداری شود و در صورتی که اصرار دارید باید ۲ ساعت قبل یا بعد غذا به او داد.
- گاهی اوقات کودک در خلال یک وعده غذایی تشنه است. در این مواقع بهتر از به او مقدار کمی مایعات داد و پس از آن ممکن است مقدار بیشتری غذا بخورد.
- نوشیدنی نباید جانشین غذا یا تغذیه با شیرمادر شود. اگر با غذا نوشیدنی به کودک می دهید، فقط مقدار کمی بدهید و بیشترش را بعد از غذا به او بدهید. نوشیدنی ها معده کودک را پر می کنند و بنابراین جایی برای غذا باقی نمی ماند.
- بخاطر داشته باشید کودکانی که شیر مادر نمی خورند به توجهات و توصیه های ویژه ای نیاز دارند. یک کودک ۲۴-۶ ماهه که شیر مادر نمی خورد در منطقه ای که آب و هوای معمولی دارد، تقریباً "به ۳-۲ فنجان آب در روز نیاز دارد و در مناطقی که آب و هوای گرم دارند نیاز کودک به ۶-۴ فنجان می رسد. آب را می توان به حریره یا خورش اضافه نمود، اما باید چند بار در روز آب تمیز به کودک بدهید تا مطمئن شوید که تشنگی او برطرف شده باشد.

فصل ۱۸

مقدار ، تنوع و دفعات تغذیه

اهمیت استفاده از غذاهای متنوع

اکثر بزرگسالان و کودکان بزرگ تر در هر وعده مخلوطی از مواد غذایی را می خورند . به همین ترتیب بسیار مهم است که کودکان خردسال نیز مخلوطی از غذاهای کمکی خوب را بخورند . وقتی که شما غذای معمول خانواده را در خانه تهیه می کنید ، برای خانواده ها آسان تر است که کودک خردسال شان را با غذاهای کمکی خوب تغذیه کنند . جبران کمبودهای آهن و انرژی (خلاء بین میزان مورد نیاز و میزان دریافتی از طریق شیر) ممکن است سخت ترین مسئله باشد . منابع غذایی حیوانی برای کودکان از اهمیت خاص برخوردارند . این غذاها باید هر روز و یا در صورت امکان اغلب اوقات خورده شوند . شما به عنوان یکی از کارکنان بهداشتی باید استفاده از مکمل ریزمغذی ها (مکمل آ+د و قطره آهن) را برای شیرخوار توصیه کنید و مطمئن شوید که کودک آهن و ریز مغذی های دیگر را به اندازه کافی دریافت می کند . به منظور تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای شیرخوار توصیه می شود در فواصل وعده های اصلی غذایی به شیرخوار میان وعده داده شود . میان وعده ها نباید مواد غذایی مانند شیرینی ها ، چیپس یا سایر غلات حجیم شده باشد . میان وعده های مناسب ، انرژی و مواد مغذی را فراهم می کنند . ماست پاستوریزه ، سبزی ها و میوه ها (بر حسب سن کودک به شکل پوره یا پخته ، کاملاً رسیده) ، نان و پنیر ، سیب زمینی پخته شده میان وعده های غذایی مناسبی هستند . خانواده ها سعی کنند هر روز برگ های سبز تیره یا میوه ها و سبزی های زردرنگ و منابع غذایی حیوانی را به غذای اصلی کودک اضافه کنند .

دفعات تغذیه با غذاهای کمکی

پیام کلیدی ششم

کودک در حال رشد به ۴-۲ وعده غذا در روز به علاوه ۲-۱ میان وعده (اگر گرسنه است) نیاز دارد :
غذا های متنوعی به او بدهید .

توصیه ها برای تغذیه شیرخواری که شیر مادر نمی خورد

- آب اضافی هر روز (۲-۳ فنجان در آب و هوای معتدل و ۴-۶ فنجان در آب و هوای گرم)
- اسیدهای چرب ضروری (منابع غذایی پروتئین حیوانی ، ماهی ،روغن مایع گیاهی)
- آهن کافی (انواع گوشت‌ها، حبوبات، غلات، سبزی‌های برگ سبز تیره ، زرده تخم مرغ و خشکبار)
- وعده های اضافی (۲-۱ وعده در روز)

مقدار غذاهای کمکی مورد نیاز شیرخوار

وقتی که شیرخوار غذاهای تکمیلی را شروع می‌کند، نیاز به زمان دارد تا به طعم و ترکیب غذاهای جدید عادت کند. کودک نیاز دارد تا مهارت خوردن را بیاموزد. خانواده ها را تشویق کنید که غذا را با ۲-۳ قاشق مرباخوری ۲ بار در روز شروع کنند .

مقدار غذاهای کمکی برای عرضه به کودک			
سن	شکل (یا ترکیب texture)	تعداد دفعات	مقدار غذایی که یک کودک متوسط معمولاً در هر وعده می خورد(۱)
۸-۶ ماه	با پوره غلیظ و غذاهای خوب له شده شروع کنید. با غذاهای خانواده که خوب له شده ادامه بدهید.	۲-۳ بار در روز به علاوه تغذیه مکرر با شیرمادر . بسته به اشتهای کودک ۱-۲ میان وعده می توان به او داد	با ۲-۳ قاشق مرباخوری در هر وعده شروع کنید. بتدریج تا نصف یک فنجان ۲۵۰ میلی لیتری افزایش دهید.
۱۱-۹ ماه	غذاهای خرد شده یا پوره شده ، و غذاهایی که شیرخوار می تواند با دست بردارد	۳-۴ وعده به علاوه تغذیه با شیرمادر . بسته به اشتهای کودک ۱-۲ میان وعده می توان به او داد	نصف یک فنجان یا کاسه ۲۵۰ میلی لیتری
۱۲-۲۳ ماه	غذاهای خانواده بصورت خرد شده و له شده	۳-۴ وعده به علاوه تغذیه با شیرمادر. بسته به اشتهای کودک ۱-۲ میان وعده می توان به او داد	سه چهارم یک فنجان یا کاسه ۲۵۰ میلی لیتری
اگر کودک با شیرمادر تغذیه نمی شود، به علاوه موارد فوق ، ۲-۱ وعده غذای اضافه هر روز به او بدهید.			
(۱) - مقادیر ذکر شده را با یک فنجان / کاسه محلی نشان دهید. در این مقادیر، تراکم انرژی غذاها ۰/۸ تا ۱ کیلوکالری در هر گرم فرض شده است. (از کتاب مقیاس خانگی می توانید استفاده کنید)			

- همان طور که شیرخوار بزرگ تر می شود ، مقدار غذایی که به او می‌دهید را افزایش دهید . هر اندازه که شیرخوار می تواند غذا بخورد به او بدهید و او را فعالانه تشویق به خوردن کنید. مقادیری که در جدول فوق پیشنهاد شده وقتی توصیه می شود که دانسیته (تراکم) انرژی غذا حدود ۰/۸ تا ۱ کیلو کالری در هر گرم غذا باشد.

اگردانسیته یا تراکم انرژی غذا تقریباً ۶ کیلو کالری در یک گرم باشد، توصیه می شود که مادر تراکم انرژی را در هر وعده غذایی (با افزودن غذاهای خاص) افزایش دهد و یا مقدار غذا را در هر وعده غذایی افزایش دهد. برای مثال :

- برای شیرخوار ۶-۸ ماهه بتدریج به دو سوم فنجان افزایش دهید .

- برای شیرخوار ۹-۱۱ ماهه سه چهارم فنجان بدهید .

- برای شیرخوار ۱۲-۲۳ ماهه یک فنجان پر بدهید.

برای تعیین میزان حجم مواد غذایی مصرفی شیرخوار از کتاب راهنمای مقیاس‌های خانگی استفاده کنید. با مادر یا مراقبت کننده کودک مشاوره کنید تا کودک را با رعایت اصول حساس بودن و پاسخگویی به علائم گرسنگی و سیری تغذیه کند. تشخیص این علائم باید راهنمای تعیین مقدار غذای مورد نیاز کودک در هر وعده و نیاز او به میان وعده ها باشد .

پیام کلیدی هفتم

شیرخوار در حال رشد نیازمند افزایش مقدار غذا است .

روش های تغذیه کودک

روش های مراقبت تغذیه ای و اثرات آن ها بر میزان دریافت کودکان :

هر کودکی به غذا ، بهداشت و مراقبت برای رشد و نمو نیاز دارد . حتی زمانی که غذا و مراقبت های بهداشتی محدود هستند، با مراقبت خوب از کودک می توان کمک نمود که از این منابع محدود بهترین استفاده به عمل آید .
مراقبت عبارت است از رفتارها و روش های مراقبت کنندگان کودک و خانواده که غذا ، مراقبت بهداشتی ، تحریک و حمایت عاطفی روانی ضروری را برای تامین رشد و نمو کودک فراهم می کنند. یک زمان مهم برای بکار بردن روش های مراقبت خوب، وقت غذا خوردن است یعنی هنگامی که در حال کمک به کودکان خردسال برای غذا خوردن هستید .

روش های تغذیه مؤثر و حساس

- کودکان را در غذا خوردن کمک کنید و نسبت به علائم و نشانه های گرسنگی آنها حساس باشید .
- با آرامش و صبر و حوصله به کودک غذا بدهید و آنها را به غذا خوردن تشویق نمائید اما زور و اجبار به کار نبرید.
- در طول تغذیه کودک ضمن برقراری تماس چشم به چشم با کودک صحبت کنید .

کودکان را در غذا خوردن کمک کنید و نسبت به علائم و نشانه های گرسنگی آنها حساس باشید .

کودک نیاز دارد که نحوه غذا خوردن را یاد بگیرد ، با طعم ها و بافت یا ترکیب غذاهای جدید آشنا شود .
کودک نیاز دارد که جویدن ، حرکت دادن غذا در داخل دهان و بلعیدن غذا را به خوبی یاد بگیرد .
کودک نیاز دارد که یاد بگیرد چگونه غذا را بطور مؤثر به داخل دهان ببرد و چگونه از قاشق استفاده کند و چطور مایعات را با استفاده از یک فنجان بنوشد .
بنابراین اهمیت زیادی دارد که با مراقب کودک صحبت کنید و پیشنهادهای به او ارائه دهید که چگونه کودک را تشویق کند تا غذا خوردن را بیاموزد. این می تواند به خانواده ها کمک کند تا لحظات غذا خوردن را با شادی سپری نمایند .

خانواده ها از طریق یکی از سه روش زیر ، کودکان خردسال شان را تغذیه می کنند :

- یک روش ، کنترل شدید تغذیه توسط مراقب کودک است که زمان و مقدار غذای کودک را معین می کند . این روش در برخی موارد تغذیه اجباری و به زور را شامل می شود .
- یک روش دیگر برای تغذیه کودک این است که به کودکان اجازه داده می شود تا خودشان غذا بخورند . فرد مراقب کودک اعتقاد دارد که اگر وی گرسنه باشد، غذا خواهد خورد . مراقب کودک همچنین ممکن است معتقد باشد که وقتی کودک غذا خوردن را متوقف می کند، به اندازه کافی غذا خورده است .

- روش سوم تغذیه کودک عبارت است از : حساس بودن به علائم و نشانه های گرسنگی او با استفاده از تشویق و تمجید کودک به غذا خوردن .

تغذیه کودکان را با آرامش و صبر و حوصله انجام دهید و آنان را به غذا خوردن تشویق نمائید اما زور و اجبار بکار نبرید.

فنون تغذیه حساس و مؤثر

- با لبخند و تماس چشمی و بیان کلمات تشویق کننده به نیاز کودک برای خوردن پاسخ دهید.
- با آرامش ، صبر و حوصله و با خوشرویی به کودک غذا بدهید.
- به منظور تشویق کودکان به غذا خوردن از مواد غذایی مختلف با طعم ها ، بافت و ترکیبات متفاوت استفاده کنید.
- زمانی که کودک از خوردن باز می ایستد صبر کنید و مجدداً " غذا را عرضه کنید.
- غذاهای انگشتی را در اختیار کودک قرار دهید تا به تنهایی بتواند خودش غذا بخورد.
- اگر کودک علاقه اش را به غذا خوردن به راحتی از دست می دهد عوامل حواس پرتی او را به حد اقل برسانید.
- در هنگام غذا خوردن در کنار کودک باشید و به او توجه نمائید.

در طول تغذیه کودک ضمن برقراری تماس چشم به چشم با کودک صحبت کنید .

اوقات غذا دادن به کودک ، دوره های ابراز محبت و یادگیری است. اگر کودکان در زمانی که تغذیه می شوند خوشحال و شاد باشند، ممکن است بهتر غذا بخورند . بهترین موقع غذا دادن به کودک زمانی است که او بیدار و شاد باشد . اگر کودک خواب آلود، یا بیش از اندازه گرسنه و پریشان حال باشد ممکن است خوب غذا نخورد . داشتن وعده های غذایی منظم و توجه به خوردن غذا بدون وجود حواس پرتی می تواند کمک کند تا کودک غذا خوردن را یاد بگیرد .

پیام کلیدی هشتم

کودک خردسال نیاز دارد تا غذا خوردن را بیاموزد :
او را به غذا خوردن تشویق و کمک کنید و خیلی صبور و بردبار باشید.

فصل ۲۰

آماده کردن بهداشتی غذا

شرایط لازم برای تغذیه سالم و تمیز

همه شیرخواران پس از ۶ ماهگی نیازمند تغذیه تکمیلی می باشند. تهیه و خوراندن غذاهای کمکی به شیرخوار به طور سالم و تمیز برای کاهش خطر آلودگی و بیماری های ناشی از آن ها ضروری است.

نکات اصلی به منظور یاد آوری برای تهیه غذاهای سالم و تمیز عبارتند از:

- دست های تمیز
- ظروف تمیز
- آب و غذای سالم و بهداشتی
- ذخیره سالم غذا

آب و غذای سالم

- آب را برای نوشیدن و غذای شیرخوار بجوشانید
- آب را در منبع تمیز و سرپوشیده نگهداری کنید
- برای تهیه غذای کمکی از شیر پاستوریزه استفاده کنید.
- غذاهای کمکی را بصورت تازه تهیه کنید

آبی که برای تغذیه کودکان استفاده می شود باید سالم سازی شود یعنی قبل از استفاده به نقطه جوش برسد. جوشاندن اکثر میکروب های بیماری زا را از بین می برد. جوشانیدن شدید آب بطوری که سطح آن حرکت تند داشته باشد به مدت ۱ یا ۲ ثانیه لازم است. سپس این آب جوشیده شده را باید در یک ظرف سر پوشیده تمیز نگهداری کنید.

اگر این آب برای بیشتر از ۴۸ ساعت ذخیره و نگهداری شده، بهتر است که برای کارهای دیگر مثل پخت و پز یا برای نوشیدن بچه های بزرگ تر مورد استفاده قرار گیرد.

شیری که در مغازه ها عرضه می شود ممکن است به طرق مختلف حرارت دیده باشد از جمله پاستوریزاسیون ، استریلیزاسیون و یا حرارت فوق العاده (UHT). در این روش ها میکروارگانسیم های مضر از بین می روند و ضمناً امکان ماندگاری شیر تازمانی که باز نشود ، افزایش می یابد. این شیر را می توان بدون جوشانیدن استفاده کرد در صورتی که بعد از باز کردن فوری مصرف شود. اما پس از باز کردن ، همان مدتی که شیر تازه را نگهداری می کنید، این شیر را می توانید نگه دارید. اگر بیشتر از یک ساعت باز مانده باشد، قبل از استفاده شیرخوار نیاز به جوشانیدن دارد.

اگر مادری برای شیرخوارش غذاهای کمکی تهیه می کند باید برای هر بار تغذیه کودک غذا را تازه تهیه کند، بخصوص اگر غذا نیمه جامد باشد.

نگهداری سالم غذا



- غذاها را در ظروف سر پوشیده با درب محکم نگهداری کنید.

- شیری را که در یخچال نگهداری می شود طی یک روز مصرف کنید.

- غذاهایی را که تهیه کرده اید ظرف یک ساعت مصرف کنید.

مضرات تغذیه با بطری

- مادر به شیرخوار کمتر توجه می کند
- کودک بیشتر مستعد بیماری می شود
- تمیز کردن شیشه شیر کودک مشکل است

تمیز کردن فنجان :

فنجان نیاز به جوشانیدن ندارد. بعد از هر بار استفاده، فنجان را با آب داغ و صابون بشویید. قبل از استفاده از فنجان، در صورت امکان فنجان را در آب در حال جوش فرو ببرید یا آن را از آب جوش پر کنید، اما این عمل ضروری نیست. سطح فنجان صاف است و تمیز کردن آن راحت است. از فنجان نی دار یا با لوله تنگ، از سرپوش یا سطح زبر و ناهموار اجتناب کنید زیرا شیر به آنجا می چسبد و باکتری ها در آن رشد می کنند.

تمیز کردن شیشه شیر و سرشیشه :

شستن شیشه و سر شیشه مشکل تر از فنجان است و مادران باید از مصرف آن ها پرهیز کنند. بهر حال لازم است شما نحوه تمیز کردن آن را بدانید چون ممکن است مادری اصرار به استفاده از آن داشته باشد

شیشه و سرشیشه بعد از استفاده باید فوری با آب سرد شسته شوند سپس داخل آن ها را با آب داغ و صابون برس بکشید.

شیشه و سر شیشه باید حداقل روزی یک بار استریلیزه شوند. راه های استریلیزه کردن شیشه ها به شرح زیر می باشد :

- جوشانیدن : شیشه باید کاملا در آب غوطه ور شود. آب کاملا به جوش آمده و حداقل به مدت ۱۰ دقیقه سطح آب حرکت فعال داشته باشد .
- شیشه را حداقل به مدت ۳۰ دقیقه در محلول رقیق شده سفید کننده قرار دهید.

برای تمیز کردن سر شیشه، آن را پشت و رو کنید و با نمک یا برس تمیز کنید . سپس مثل تمیز کردن شیشه، آن را نیز بجوشانید یا با خیساندن در محلول بالا استریل کنید.

۵ نکته کلیدی برای سالم سازی غذا

تمیزنگه داشتن

- قبل از تهیه غذا و اغلب در حین تهیه دست هایتان را بشویید.
- بعد از توالت رفتن ، تعویض کهنه کودک و تماس با حیوانات دست هایتان را بشویید.
- سطوح و داخل ظروف و لوازمی را که برای تهیه و سرو غذا استفاده می کنید خیلی تمیز بشویید.
- سطوح و ظروف آشپزخانه و غذا را از تماس با حشرات ، آفات و دیگر حیوانات محافظت کنید.

جدا سازی مواد خام از غذاهای پخته شده

- گوشت خام و گوشت طیور و غذاهای دریایی را از غذاهای دیگر جدا نگهدارید.
- از لوازم و تجهیزات جدا مانند کارد و تخته برش برای آماده سازی غذاهای خام استفاده کنید.
- غذاها را در ظروف سرپوش دار نگهدارید و از تماس بین غذاهای خام و آماده شده پرهیز کنید.

پختن کامل

- غذاها بویژه گوشت قرمز ، طیور ، تخم مرغ و غذاهای دریایی و سایر غذاها را بطور کامل بپزید.
- غذاهایی مانند سوپ و خورش باید به نقطه جوش برسند. در مورد گوشت قرمز ، طیور و غذاهای دریایی مطمئن شوید که عصاره آن ها شفاف باشد نه صورتی.
- غذای پخته شده نگهداری شده را قبل از مصرف ، مجدداً بطور کامل بجوشانید یعنی گرم کنید بطوری که آن قدر داغ شود که نتوان به آن دست زد. غذا را موقع حرارت دادن هم بزنید.

نگهداری غذا در درجه حرارت مناسب و سالم

- غذای پخته شده را در درجه حرارت اتاق بیش از ۲ ساعت نگهداری نکنید.
- غذا را به مدت طولانی حتی در یخچال نگه ندارید.
- غذاهای فریز شده را در دمای اتاق ذوب نکنید .
- غذا را برای شیرخواران و کودکان خردسال بصورت تازه تهیه و مصرف کنید و بعد از پختن نگهداری نکنید.

استفاده از آب و مواد خام سالم

- از آب سالم استفاده کنید یا آب را سالم سازی کنید .
- غذاهای تازه و سالم انتخاب کنید.
- شیر پاستوریزه استفاده کنید.
- میوه و سبزی ها را با آب سالم بشویید بویژه اگر بصورت خام استفاده می شوند.
- غذاهایی را که تاریخ مصرف آن ها منقضی شده ، استفاده نکنید.

نحوه شروع و ادامه غذاهای کمکی

غذاهای کمکی باید از پایان ۶ ماهگی (۱۸۰ روزگی) شروع شود و همزمان با شروع غذاهای کمکی تغذیه با شیرمادر همچنان مکرر و برحسب میل و تقاضای شیرخوار ادامه داشته باشد. در صورتی که شیرخوار ۸ نوبت در روز با شیرمادر تغذیه شود، دفعات مطلوب مصرف غذای کمکی روزانه ۳ تا ۵ بار است. گرچه تمایل و اشتهای کودک تعیین کننده ی مقدار و دفعات مطلوب غذادهی به کودک است ولی اطلاع مادر از محدوده مطلوب این مقادیر می تواند برای اطمینان از کفایت تغذیه روزانه شیرخوار موثر باشد. همچنین در صورتی که شیرخوار در یک وعده غذای کمتری بخورد، مادر باید نیم تا ۱ ساعت بعد مجددا شیرخوار را با همان غذا و یا غذای دیگری تغذیه کند.

۶-۸ ماهگی:

- ✓ هر چقدر شیرخوار می‌خواهد حداقل ۸ بار در ۲۴ ساعت با شیر خود تغذیه کنید.
- ✓ برای تهیه اولین غذا به شیرخوار از آرد برنج استفاده کنید.
- ✓ غذای کمکی را با ۲-۳ قاشق مربا خوری از فرنی یا حریره بادام غلیظ ۲-۳ بار در روز شروع نموده و این میزان را به تدریج افزایش دهید در ضمن می توانید از انواع فرنی ها و حریره های محلی غلیظ نیز در تغذیه شیرخوار استفاده کنید.
- ✓ پس از معرفی غلات، می توانید پوره یا شکل نرم شده انواع گوشت ها، میوه ها و سبزی های متنوع را به شیرخوار بدهید. استفاده از پوره، له شده یا شکل نیمه جامد شده انواع موادی غذایی محلی/غذای خانواده شامل:
 - انواع گوشتهای (قرمز، مرغ، ماهی و پرندگان) خوب پخته شده و ریز ریز شده
 - تخم مرغ
 - سبزی های برگ سبز تیره و زرد و نارنجی و میوه های زرد، و نارنجی و رسیده مانند اسفناج، چغندر، گشنیز، هویج، گوجه فرنگی، انبه، مرکبات، کدو حلوايي
- ✓ حبوبات مانند عدس و ماش (خیساندن حبوبات قبل مصرف) در سوپ و آش اضافه شود.
- ✓ ماست پاستوریزه و پنیر کم نمک پاستوریزه در برنامه غذایی کودک اضافه شود.
- ✓ یک تا دو میان وعده غذایی مانند پوره سبزی ها (هویج یا سیب زمینی)، پوره میوه ها (موز) بین وعده های اصلی در روز بر حسب اشتهای شیرخوار به او بدهید.
- ✓ میزان غذای شیرخوار را تا نصف لیوان (هر لیوان ۲۵۰ سی سی) در هر وعده غذایی به طور تدریجی افزایش دهید.
- ✓ قطره های A+D و آهن را طبق دستورعمل به شیرخوار بدهید.
- ✓ آب جوشیده سرد شده به شیرخوار بدهید.
- ✓ اگر کودک شیر مادر نمی خورد روزانه ۱ تا ۲ وعده غذایی اضافه به او داده شود.

۹-۱۱ ماهگی:

- ✓ شیرخوار هر چقدر شیر می خواهد حداقل ۸ بار در ۲۴ ساعت با شیر خود تغذیه کنید.
- ✓ هر روز سه تا چهار وعده غذایی به شیرخوار بدهید.
- ✓ تنوع و استفاده از پنج گروه اصلی غذایی همچنان در برنامه غذایی شیرخوار در نظر گرفته شود.
- ✓ یک تا دو میان وعده غذایی بین وعده های اصلی در روز بر حسب اشتها شیرخوار مانند هویج یا کرفس پخته ، میوه (موز ، گلابی ، سیب) به شیرخوار بدهید.
- ✓ میزان غذای شیرخوار تا نصف لیوان (هر لیوان ۲۵۰ سی سی) در هر وعده غذایی افزایش یابد.
- ✓ استفاده از غذاهایی که له شده یا به خوبی ریز ریز شده ، تکه تکه شده و غذاهای انگشتی که شیرخوار بتواند با دست بگیرد شامل :
 - انواع گوشتهای (قرمز ، مرغ ، ماهی و پرندگان) خوب پخته شده و ریز ریز شده و تکه های کوچک گوشت بدون چربی یا کوفته قلقلی کاملاً پخته شده یا با پشت قاشق له شده
 - تخم مرغ
 - ماکارونی پخته شده
 - سبزی های برگ سبز تیره و زرد و نارنجی و میوه های زرد و نارنجی و رسیده مانند جعفری ، گشنیز، هویج ، انبه، کدو حلوایی
- ✓ حبوبات مانند عدس و ماش (خیساندن حبوبات قبل از مصرف) در سوپ و آش اضافه شود.
- ✓ قطره های A+D و آهن را طبق دستورعمل به شیرخوار بدهید.
- ✓ آب جوشیده سرد شده به شیرخوار بدهید.
- ✓ شیرخوار را در هنگام غذا خوردن مشارکت دهید (تشویق شیرخوار برای در دست نگهداشتن غذا یا استفاده از قاشق)
- ✓ اگر کودک شیر مادر نمی خورد روزانه ۱ تا ۲ وعده غذایی اضافه به او داده شود .

نحوه ارائه غذاهای کمکی به کودک:

چگونگی دادن غذای کمکی و رعایت موازین بهداشتی در تهیه و نگهداری آن در روند سلامت و رشد و نمو شیرخوار موثر است. غذاهای خیلی رقیق با پر کردن معده کودک، تمایل کودک به شیرمادر را کمتر کرده و باعث کاهش دریافت انرژی می شوند. تغذیه کودک با چنین غذاهایی خطرکند شدن رشد کودک و ابتلای او به سوء تغذیه را افزایش می دهد. گرچه توصیه می شود که غذا طوری به کودک داده شود تا اشتیاق او را برای غذا خوردن تحریک کند، اما رفتارهایی مانند پافشاری و اصرار بر خوردن یک غذای خاص یا یک مقدار مشخص از غذا، دادن جایزه برای غذا خوردن و استفاده از غذا بعنوان پاداش یا تنبه کودک، به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا این روشها شاید در کوتاه مدت موثر باشد ولی در درازمدت هم برای کودک و هم برای مادر عذاب آور است و می تواند رفتارهای غذایی نامناسب و بد غذایی را بدنبال داشته باشد.

مکمل یاری با ریزمغذی ها

برای شیرخوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند (اعم از شیر مادرخوار و یا شیرمصنوعی خوار) از پایان ماه ششم (۱۸۰ روزگی) و همزمان با تغذیه تکمیلی علاوه بر ارائه مکمل های ویتامین A و ویتامین D (۲۵ قطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین A+D)، باید مکمل آهن به صورت روزانه ۱۲/۵ میلی گرم آهن (معادل ۱۵ قطره آهن) تا پایان ۲۴ ماهگی داده شود. در صورتی که بدلیل اختلال رشد کودک، تغذیه تکمیلی بین ۴ تا ۶ ماهگی شروع شود ، قطره آهن هم زمان با شروع غذای کمکی به میزان ۱۵ قطره درروز باید داده شود.

در مورد کودکان نارس و شیرخوارانی که با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد می‌شوند (اعم از شیر مادر خوار و یا شیرمصنوعی خوار) از زمانی که وزن آنها به دو برابر وزن هنگام تولد می‌رسد روزانه ۲ قطره آهن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن شیرخوار و تا پایان ۲۴ ماهگی توصیه می‌شود.

بخش چهارم تغذیه کودک ۱ تا ۵ سال

فصل ۲۲

تغذیه کودک ۱ تا ۲ سال

میزان رشد بعد از سال اول زندگی به طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. اما در مقابل کودک با راه رفتن آشنا می‌شود و فعالیت بدنی و تحرک او افزایش می‌یابد. راه رفتن، صحبت کردن و بسیاری از جنبه‌های رشد روانی، شخصیتی و اجتماعی کودک در این سنین شکل می‌گیرد. تغذیه مطلوب کودک به همراه پیگیری و پایش شاخص‌های رشد او در تکامل فیزیکی و مغزی کودک نقش بسزائی دارد.

در این سن هنوز نزدیک به ۳۰ درصد نیازهای روزانه شیرخواران به انرژی از طریق شیرمادر تامین خواهد شد بنابراین استمرار تغذیه با شیرمادر از اهمیت بالایی برخوردار است. ۷۰ درصد مابقی نیاز به انرژی نیز باید با مصرف غذای کمکی، که به تدریج شبیه غذاهای سفره خانوار خواهد شد، تأمین می‌شود. غذای خانواده باید به صورت خرد شده و له شده به کودک داده شود. بر خلاف سال اول زندگی، در کودکان ۱ تا ۲ ساله تغذیه با شیرمادر بهتر است نیم تا ۱ ساعت پس از صرف غذای کودک انجام شود و در حقیقت تغذیه از سفره خانوار بر تغذیه با شیر مادر اولویت دارد.

اکثر مادران نگران ناکافی بودن غذای دریافتی کودک خود در این سنین هستند. به این مادران باید توضیح داده شود که رشد و تکامل کودک و افزایش مطلوب وزن و قد کودک بهترین معیار جهت اطمینان از کفایت تغذیه‌ای شیرخوار است و اگر رشد ماهانه شیرخوار به اندازه کافی باشد نباید نگران کفایت نداشتن تغذیه شیرخوار باشند.

با این وجود آشنائی مادر با میزان انرژی برخی از مواد غذایی معمول و مقدار مطلوب صرف غذا توسط شیرخوار در هر وعده می‌تواند در عملکرد مراقبتی مادر موثر باشد. البته باید به مادر گوشزد نمود که اگر شیرخوار کمتر از محدوده مناسب غذا بخورد هرگز نباید پافشاری و اصرار نمایند بلکه بهتر است نیم تا ۱ ساعت بعد دوباره غذا را به کودک ارائه نمایند.

در برنامه غذایی کودک ۱ تا ۲ ساله تنقلات بی ارزش نظیر غلات حجیم شده، شکلات، چیپس، آب میوه‌های تجاری و نظایر آنها جایگاهی نداشته به جای آن از میان وعده‌های مغذی مانند میوه‌ها، سبزی‌ها، ماست پاستوریزه، نان، پنیر کم نمک پاستوریزه و خرما استفاده شود.

علاوه بر تغذیه با شیر مادر، روزانه ۳-۴ وعده غذا به کودک داده شود. مقدار غذایی که یک کودک ۱ تا ۲ سال به طور متوسط در هر وعده غذایی مصرف می‌کند سه چهارم تا یک فنجان (۲۵۰ میلی‌لیتر) می‌باشد.

علاوه بر ۳-۴ وعده غذایی در روز، بر حسب اشتهای کودک، ۱-۲ میان وعده به کودک داده شود.

اگر کودک با شیر مادر تغذیه نمی‌شود، ۱-۲ وعده غذای اضافی در روز به او بدهید.

تغذیه منظم با شیرمادر در سال دوم زندگی همچنان یک ضرورت است زیرا :

- یک منبع خوب تامین پروتئین برای کودک است.
- حدود یک سوم انرژی مورد نیاز روزانه او را تامین می‌کند.
- مواد ایمنی بخش موجود در آن برای محافظت کودک در برابر عفونت‌ها موثر است.
- نیازهای عاطفی و روانی شیرخوار را تامین نموده و در تکامل ذهنی و جسمی او نقش بسزائی دارد.
- در مواقع ابتلای کودک به بیماری و به دنبال آن بی‌اشتهایی، یک منبع مهم تامین کننده انرژی برای کودک است زیرا اغلب کودکان در زمان بی‌اشتهایی ناشی از بیماری، فقط به شیرمادر تمایل دارند.
- در صورت ابتلا به اسهال و استفراغ، هیچ چیز به اندازه شیرمادر برای شیرخوار قابل تحمل نیست.
- با کاهش شدت و دفعات ابتلا به بیماری‌ها، در بهبود شرایط اقتصادی خانوار نقش قابل توجهی می‌تواند داشته باشد.

مکمل یاری با ریزمغذی ها

در سال دوم زندگی، مصرف ویتامین های A و D و قطره آهن باید مطابق دستورعمل ادامه داشته باشد. این مطلب که قطره آهن موجب سیاهی دندان می شود نباید مانع مصرف آن شود، بلکه باید قطره آهن را با قاشق چایخوری در عقب دهان ریخت و پس از آن به کودک آب داد و با پارچه‌ای تمیز روی دندان‌های او را نیز تمیز نمود.

فصل ۲۳

تغذیه در سنین ۲ تا ۵ سال

سرعت رشد در سال اول زندگی در بالاترین حد خود می باشد، در سال دوم کاهش محسوسی می یابد. در سنین بین ۳ تا ۵ سالگی نیز این کاهش سرعت رشد همچنان مشاهده می شود. رشد طولی استخوان ها و افزایش حجم عضلات از جمله تغییرات جسمی این دوران از زندگی است.

اطلاع مادر از الگوی غذایی مطلوب این دوران و اهمیت این سنین در ذائقه سازی و فراگرفتن رفتارهای مطلوب غذایی بسیار با اهمیت است. نیاز روزانه کودک به انرژی و پروتئین باید با مصرف روزانه ۳ وعده اصلی و ۲ تا ۳ میان وعده و از طریق ۵ گروه عمده غذایی تامین شود. در هر وعده به اندازه یک لیوان کامل (۲۵۰ سی سی) به کودک می توان غذا داد. میان وعده غذایی از بین گروه های اصلی غذا انتخاب شود. در این سنین نیز رشد و تکامل کودک نشان دهنده کفایت تغذیه ای اوست و رعایت الگوی غذایی صحیح تضمین کننده رشد کودک بوده و در جهت ایجاد ذائقه مناسب و رفتارهای تغذیه ای مناسب در سال های بعدی عمر نیز نقش بسزایی دارد.

برنامه غذایی کودکان در این سنین باید از ۳ وعده غذای اصلی و ۲ میان وعده تشکیل شده باشد. شیر پاستوریزه، نان و پنیر کم نمک پاستوریزه، میوه ها، سبزی ها و میوه های خشک (خشکبار) انتخاب های بسیار خوبی برای میان وعده کودکان هستند. مصرف برخی میان وعده ها مانند چیپس، غلات حجیم شده، آب میوه های صنعتی، ساندویچ های سوسیس و کالباس و به طور کلی تنقلات بی ارزش علاوه بر تغییر ذائقه کودک و افزایش احتمال ابتلای وی به بیماری های غیرواگیر در سنین بزرگسالی با تاثیر بر اشتها و در نهایت تمایل کمتر او به وعده های اصلی می توانند بر سرعت رشد کودک و به خصوص افزایش مطلوب قد تاثیر منفی داشته باشند.

ذائقه فرد در دوران کودکی شکل می گیرد و اثر آن تا آخر عمر باقی می ماند. بدین ترتیب لازم است تا ذائقه کودکان را به غذاهای سالم (به طور مثال غذاهای کم نمک و یا سرخ نشده) عادت دهیم. اگر به طور منظم در برنامه غذایی کودک سبزی ها و حبوبات پخته، مرغ، گوشت و حتی ماهی آب پز قرار دهیم، کودک به تدریج با طعم این غذاها آشنا و در بزرگسالی نیز نسبت به آنها علاقمند خواهد بود. بهتر است به جای اضافه کردن شکر و عسل به شیر و یا مصرف شیرکاکائو، کودکان را با طعم واقعی شیر آشنا کنیم.

الگوی غذایی خانواده، نقش مهمی در انتخاب غذای کودک دارد. معمولا کودکان غذایی را که یکی از اعضای خانواده از خوردن آن امتناع می کنند، نمی خورند. همچنین والدین هرگز در حضور کودک نباید بگویند که او فلان غذا را دوست ندارد، این گفتار باعث آن خواهد شد که کودک نخوردن آن غذا را به عنوان رفتار تثبیت شده خود بپذیرد و از آن به عنوان ابزاری جهت جلب توجه دیگران استفاده کند.

نقش میان وعده در سلامت کودکان زیر پنج سال

به دلیل شکل گیری عادات غذایی در سنین پائین، از همین زمان باید مواد غذایی سالم را در اختیار کودک قرار داد و به تامین مواد مغذی مورد نیاز او در وعده های اصلی و میان وعده های غذایی توجه نمود. استفاده از یک میان وعده با ارزش غذایی مناسب نظیر شیر پاستوریزه، میوه و سبزی در برنامه غذایی کودک موجب رشد جسمی و مغزی او می گردد. در حالیکه مصرف تنقلات غذایی کم ارزش به عنوان میان وعده موجب کاهش دریافت مواد مغذی مورد نیاز از جمله پروتئین، ویتامین و املاح گردیده و زمینه را برای تاخیر رشد کودک مساعد می کند.

از سوی دیگر مصرف تنقلات تجارتي کم ارزش به دلیل زیادی نمک، چربی و شکر موجب ایجاد بیماری های قلبی - عروقی، چاقی، پرفشاری خون، پوکی استخوان و افزایش کلسترول خون در دوران بزرگسالی می شوند. به علاوه این گونه تنقلات

دارای افزودنی های رنگی ، نگهدارنده ها و طعم دهنده های مصنوعی هستند که مصرف بی رویه آنان موجب پرتحرکی کودکان می گردد .

جایگاه و اهمیت میان وعده غذایی در برنامه غذایی کودکان

میان وعده غذای مختصری است که بین دو وعده غذای اصلی به کودک داده می شود. از آنجایی که معده کودک کوچک است ولی نیاز او به انرژی زیاد می باشد با خوردن سه وعده اصلی غذا نیازهای او تامین نمی گردد. به یاد داشته باشید که میان وعده تنها سهم کوچکی در تامین نیازهای غذایی کودک دارد و هیچگاه نمی تواند جایگزین وعده غذای اصلی شود. بنابراین در انتخاب نوع میان وعده باید دقت نمود. کودکان باید هر روز حداقل ۵ وعده غذا شامل سه وعده اصلی (صبحانه، نهار و شام) و دو میان وعده مصرف کنند.

نکات قابل توجه در هنگام دادن میان وعده به کودکان

- میان وعده ها از هر ۵ گروه اصلی غذایی (گروه شیر و لبنیات ، گروه نان و غلات ، گروه گوشت، حبوبات و تخم مرغ و مغز دانه ها ، میوه ها و سبزی ها) انتخاب شود تا تنوع و تعادل در رژیم غذایی او ایجاد گردد و بخشی از مواد مغذی مورد نیاز نیز از طریق میان وعده تامین شود.
- حداقل پانزده دقیقه زمان برای خوردن میان وعده غذا در نظر گرفته شود.
- بین وعده های اصلی و میان وعده، حداقل ۲ ساعت فاصله گذاشته شود. در صورتی که فاصله مصرف میان وعده تا وعده غذایی اصلی کم باشد کودک احساس سیری کرده و از مصرف غذاهای اصلی غذایی می کند.
- اگر کودک در بین وعده غذای اصلی و میان وعده احساس تشنگی کرد، به او آب داده شود زیرا در صورت مصرف آب میوه احساس سیری کرده از مصرف غذای اصلی خودداری خواهد کرد.
- شکلات، آب نبات، شیرینی ، چیپس، انواع پفک و آب میوه های صنعتی دارای مقدار زیادی مواد قندی ، نمک و چربی هستند. بنابراین مصرف آنها در کودکان باید بسیار محدود گردیده و به جای آن از میان وعده های غذایی سالم مانند شیر ، انواع مغز دانه ها و خشکبار (کشمش ، توت خشک ، برگه ها و...) و انواع میوه ها و سبزی های تازه استفاده شود.
- میان وعده می تواند عادات غذایی درست یا نادرست را در کودک ایجاد نماید با توجه به اینکه کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از مشکلات تغذیه ای کودکان می باشد و یکی از دلایل اصلی آن استفاده از برنامه غذایی نامناسب است، انتخاب میان وعده مناسب مانند انواع خشکبار (برگه های هلو، آلو، توت خشک ، کشمش ، نخودچی ، خرما و ...) و مغزها (پسته ، بادام و...) همراه با میوه ها بخشی از ویتامین ها و املاح معدنی مورد نیاز کودک را تامین می کند.

میان وعده های مناسب و نامناسب برای کودکان

میان وعده های مناسب	میان وعده های نامناسب
شیر پاستوریزه یا جوشیده شده	یخمک و نوشمک، لواشک، آلوچه و تمبر هندی
نان و پنیر کم نمک ، خرما	آب نبات ها ، شکلات ها و کاکائوها
انواع ساندویچ های خانگی : مرغ، تخم مرغ ، پنیر با گردو یا خیار و گوجه	ساندویچ های سوسیس و کالباس، پیتزا ، سیب زمینی سرخ شده ، فلافل ، سمبوسه
بیسکوئیت ساده ، کیک بدون کرم	کیک های شکلاتی ، کیک های کرم دار
خشکبار مانند انواع مغزها از نوع بدون نمک (بادام، گردو، پسته) ، کشمش، نخودچی ، برگه ها و توت خشک	آجیل و مغزهای بو داده شده و شور
ذرت بو داده خانگی کم نمک	چیپس و پفک ، چوب شور
انواع آب میوه های طبیعی در حد توصیه شده، دوغ بدون نمک و بدون گاز	آب میوه های صنعتی، نوشابه ها ی گازدار، آب میوه های شیرین که دارای قند افزوده هستند.
انواع میوه های تازه ، سالاد شامل انواع سبزی ها به همراه یک یا دو قاشق ماست خنک.	انواع سالادها با سس مایونز و سس سالاد ، ماست های پرچرب

تنقلات شور علاوه بر کاهش اشتها، ذائقه کودک را به طعم شوری عادت داده، احتمال ایجاد عارضه در سنین بزرگسالی به ویژه پرفشاری خون را بیشتر می کند. خوردن مواد غذایی شیرین مانند شیرینی؛ شکلات و آب نبات نیز در کودکان در حد کم مجاز است ولی مصرف روزانه و بی رویه این مواد توصیه نمی شود چون ذائقه کودک را به خوردن مواد شیرین عادت داده و موجب اضافه وزن و چاقی و هم چنین سبب پوسیدگی دندان می شود. مصرف غذاهای چرب و سرخ شده موجب اضافه وزن و چاقی در سنین کودکی و بالاتر نیز می شود. مصرف نوشابه ها نیز علاوه بر اضافه وزن و چاقی جذب مواد مغذی مانند کلسیم را کاهش می دهد.

توصیه هایی برای کاهش مصرف نمک :

- مصرف زیاد نمک زمینه را برای ابتلا به فشار خون بالا در بزرگسالی فراهم می کند بنابراین باید غذای کودک را کم نمک تهیه کرد که ذائقه او به غذاهای شور و پرنمک عادت نکند.
- کودکان باید کمتر از ۳ گرم (کمتر از نصف قاشق مرباخوری) در روز نمک بخورند و این کل مقدار نمکی است که از طریق غذای تهیه شده در منزل، غذاها و محصولات غذایی آماده مصرف می کنند.

- سر سفره نمکدان نگذارید. چون کودکان از والدین خود الگو می گیرند در حضور آنها از نمکدان برای اضافه کردن نمک به غذا و یا مثلا خیار، گوجه فرنگی و ... استفاده نکنید.

از دادن مواد غذایی شور، مثل : پفک و چیپس و چوب شور و سایر تنقلاتی که حاوی نمک زیاد هستند جدا خوداری گردد، تنقلات شور ذائقه کودک را به غذاهای پر نمک و شور عادت می دهد و شانس ابتلا به فشار خون بالا و بیماری های قلبی - عروقی در بزرگسالی را افزایش دهند.

تغذیه در بیماری‌های شایع

چرا کودکان نیاز به تداوم غذا خوردن در طول بیماری دارند

کودک در طول بیماری برای غلبه بر عفونت نیاز به مواد غذایی و انرژی بیشتری دارد. اگر کودکان بیمار غذای اضافی دریافت نکنند، چربی و بافت عضلانی آن‌ها بعنوان سوخت استفاده می‌شود. علت از دست دادن وزن، لاغر شدن و توقف رشد نیز همین است.

هدف از تغذیه کودک در طول بیماری و بعد از آن، برگرداندن وی به همان میزان رشدی است که قبل از بیماری داشته است.

نکته کلیدی ۱۰

کودک را به خوردن و آشامیدن در طول بیماری تشویق کنید و پس از بیماری برای او غذای اضافی فراهم کنید تا سریع‌تر بهبود یابد.

تغذیه مناسب در طول بیماری و دوره بهبودی (نقاهت)

کودکان بیمار در طول بیماری‌ها مثل تب و اسهال، غذا و مایعات بیشتری نیاز دارند. البته کودکان بیمار ممکن است تغذیه با شیر مادر را به سایر غذاها ترجیح دهند. از تغذیه کودک بیمار دریغ نکنید.

تغذیه کودک بیمار

- کودک بیمار را با صبر و حوصله به خوردن و آشامیدن تشویق کنید.
- او را با مقدار کم غذا ولی به دفعات مکرر تغذیه کنید.
- غذاهائی که کودک دوست دارد به او بدهید.
- غذاهائی که سرشار از انواع مواد مغذی است به کودک بدهید.
- به تغذیه او با شیرمادر ادامه دهید- اغلب کودکان بیمار به دفعات بیشتری شیرمادر می‌خورند.

تغذیه در دوره بهبودی (نقاهت):

اشتهای کودک هنگام بیماری ممکن است کاهش یابد. حتی اگر او را تشویق کنید، ممکن است خوب غذا نخورد. اما پس از بیماری معمولاً اشتهای وی افزایش می‌یابد. از این رو ادامه توجه بیشتر به تغذیه کودک پس از بیماری او بسیار اهمیت دارد و این زمان فرصت خوبی برای خانواده‌هاست که غذای اضافی به کودک بدهند تا وزن از دست رفته‌اش را دوباره بازیابد.

تغذیه در طول بهبودی (نقاوت)

- تغذیه کودک با شیرمادر را بیشتر کنید.
- وعده های غذایی او را بیشتر کنید.
- مقدار غذای بیشتری به او بدهید.
- غذاهای غنی از مواد مغذی بیشتر به او بدهید.
- او را با صبر و شکیبایی بیشتری تغذیه کنید.

*تغذیه کودک مبتلا به اسهال

در بیماری های اسهالی به دلایل زیر افزایش نیاز به غذا وجود دارد:

- افزایش نیازهای متابولیکی همراه با تب
 - ترمیم آسیب های وارده (به طور مثال در اسهال ترمیم آسیب های وارده به اپی تلیوم روده)
 - تامین نیازهای سیستم ایمنی جهت مقابله با عامل مهاجم
 - جبران پروتئین از دست رفته از طریق مخاط آسیب دیده روده
- علل کاهش دریافت غذا و اتلاف مواد غذایی را نیز در بیماری های اسهالی می توان به دلایل زیر دانست:
- بی اشتها و استفراغ
 - کاهش پرزهای روده و عبور سریع مواد غذایی از روده، کاهش غلظت اسیدهای صفراوی در روده برای جذب چربی ها، کمبود دی ساکاریداز که سوء جذب دی ساکاریدها (به خصوص لاکتوز) را سبب می شود.
 - پرهیز های غذایی: این عادت نادرست که در جریان اسهال باید تغذیه کاهش یابد به وخیم تر شدن وضعیت اسهال می انجامد، این در حالی است که در کودکان مبتلا به اسهال :
 - غذا خوردن، ترمیم مخاط روده را تسریع می کند و بازگشت سریع تر عملکرد لوزالمعده و تولید آنزیم دی ساکاریداز را تحریک می کند و این کار باعث بازگشت سریعتر هضم به وضعیت طبیعی می شود.
 - شیرمادر معمولاً در زمان اسهال خوب تحمل می شود و در جریان اسهال حجم مدفوع کودکان بهره مند از شیرمادر نسبت به کودکانی که از شیرمادر تغذیه نمی کنند کمتر است و دوره بیماری آنها نیز کوتاه تر است.

تغذیه در اسهال حاد

تغذیه کودک در اسهال حاد، در پیشگیری از بروز علائم کم آبی و سوء تغذیه نقش مهمی دارد. به جز در موارد عدم تحمل لاکتوز و پروتئین شیر گاو (که از طریق شیرمادر نیز انتقال می یابد) که در جریان اسهال پایدار ممکن است دیده شود، در اسهال حاد آبکی معمولاً غذا خوب جذب می شود.

بدین منظور توصیه می شود:

- ✓ در تغذیه انحصاری با شیر مادر، تغذیه با شیر مادر به دفعات بیشتر و مدت طولانی تر در هر نوبت ادامه یابد.
- ✓ در شیرخواران کمتر از ۶ ماه که تغذیه انحصاری ندارند، دفعات تغذیه با شیر مادر افزایش یابد و ترجیحاً شیرخوار به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شود.
- ✓ اگر کودک شیر مادر خوار نیست، علاوه بر شیرمصنوعی به او آب جوشیده خنک یا او.آر.اس هم بدهد.
- ✓ در صورت شروع تغذیه کمکی برای کودک، غذاهای آبکی (مانند سوپ و دوغ) داده شود.
- ✓ از مایعات خیلی شیرین مثل نوشابه و آب میوه های صنعتی استفاده نشود.
- ✓ بر حسب سن کودک هر مقدار مایعی که کودک بخواهد تا زمانی که اسهال متوقف گردد، به او بدهد.
- ✓ به کودک بیش از معمول مایعات (علاوه بر او. آر. اس مایعاتی نظیر سوپ ساده، دوغ و آب) داده شود.

- ✓ در کودکان بالاتر از ۶ ماه مصرف غذاهایی مانند ماست، تخم مرغ، غلات و گوشت و مرغ و همچنین میوه‌ها و سبزی‌ها به خصوص آب میوه‌های طبیعی توصیه می‌شود.
- ✓ در صورت مشاهده استفراغ بعد از خوردن او، آر. اس و یا غذاهای مایع باید به کودک آهسته‌تر و در حجم کمتر و دفعات بیشتر غذا داد.
- ✓ مصرف موز کال و سیب با پوست و هویج پخته بهتر است صورت گیرد. خوراندن بقیه میوه‌ها و سبزی‌ها تا زمان قطع اسهال مجاز نیست.
- ✓ غذای این کودکان باید تازه باشد و به خوبی پخته شده باشد.
- ✓ غذاهای توصیه شده پس از قطع اسهال نیز ادامه یابد و به کودک روزانه ۱ وعده اضافی تا ۲ هفته بعد از قطع اسهال داده شود. این غذاها باید مقوی سازی شوند.

تغذیه در اسهال پایدار

هنگامی که اسهال ۱۴ روز یا بیشتر طول بکشد به آن اسهال پایدار یا مقاوم گفته می‌شود. این نوع اسهال در بیماران سوء تغذیه ای و کودکان محروم از شیرمادر بیشتر دیده می‌شود. یکی از دلایل اسهال پایدار می‌تواند حساسیت کودک به پروتئین شیرگاو باشد. که حسب تشخیص پزشک در اینصورت مادر مصرف فراورده‌های لبنی و حتی گوشت گاو را باید محدود کند.

توصیه های تغذیه ای مربوط به اسهال حاد آبکی در این کودکان نیز کاربرد دارد، علاوه بر آن توصیه های زیر نیز در این کودکان می‌تواند موثر باشد :

- ✓ هدف از تغذیه در اسهال پایدار دریافت حداقل ۱۱۰ کالری به ازای هر کیلوگرم وزن در روز می‌باشد.
- ✓ مصرف ماست افزایش یابد و در کودکان بالای ۲ سال مصرف ماست، جایگزین شیر شود.
- ✓ کودکان بالای ۶ ماه روزانه با شش وعده غذا تغذیه شوند و در برنامه غذایی کودک گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ گنجانده شود.
- ✓ برای اطمینان از دریافت ویتامین‌ها و املاح توصیه می‌شود در طبخ سوپ از انواع سبزی‌ها و صیفی جات زرد و سبز استفاده شود.
- ✓ دریافت بیشتر منابع غذایی حاوی اسیدفولیک (سبزی‌های برگ سبز) آهن و روی (گوشت‌ها، تخم مرغ و حبوبات) و مکمل روی (۱۰ میلی‌گرم در سن کمتر از ۶ ماه و ۲۰ میلی‌گرم در سن بیشتر از ۶ ماه) و فولات (۵۰ میکروگرم) روزانه و حداقل به مدت ۲ هفته و تداوم مکمل ویتامین به صورت روتین توصیه می‌شود.
- ✓ آب هویج و آب سیب طبیعی نیز انتخاب های خوبی برای تغذیه این کودکان هستند.
- ✓ غذاهای توصیه شده پس از قطع اسهال نیز ادامه یابد و به کودک روزانه ۱ وعده غذای اضافی تا یکماه بعد از قطع اسهال داده شود. این غذاها باید مقوی سازی شوند.

اگر کودک غیر از شیر مادر، شیر دیگری استفاده می‌کند:

- الف- سن کمتر از ۶ ماه:
تغذیه انحصاری با شیر مادر و قطع شیر دام
- ب- سن بیشتر از ۶ ماه:
 - ✓ جایگزین کردن با افزایش تغذیه با شیر مادر
 - ✓ جایگزین کردن با فراورده‌های شیر مانند ماست (در صورت عدم امکان، حداکثر ۵۰۰ میلی‌لیتر در روز شیر حیوانی داده شود) یا جایگزین کردن نصف شیر با غذاهای نیمه جامد و غلات غنی شده.
 - ✓ در صورت استفاده از شیر مصنوعی، شیر با غلظت همیشگی تهیه شود و آب جوشیده خنک با او، آر. اس هم بدهد.

✓ پس از ۵ روز رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای در صورت وجود علائم کمبود لاکتاز (وجود اسهال حجیم و آبکی، نفخ، تهوع و استفراغ و سوختگی ناحیه کهنه کودک) شیر فاقد لاکتوز تجویز و ۲ روز بعد پیگیری شود. در صورت عدم بهبودی به بیمارستان ارجاع و در صورت بهبودی ۲ هفته دیگر شیر فاقد لاکتوز ادامه یابد.

تغذیه کودک مبتلا به عفونت حاد تنفسی

در این شرایط بواسطه کم شدن اشتها ی کودک و همچنین افزایش متابولیسم او خطر تعادل منفی انرژی و به دنبال آن کاهش رشد و آسیب پذیر شدن نسبت به سوء تغذیه وجود دارد. تغذیه صحیح کودک در هنگام بیماری و پس از آن در کنترل عوارض این بیماری و جبران عقب افتادگی های رشد دوران بیماری موثر است.

- ✓ دفعات تغذیه با شیر مادر بیشتر شود.
- ✓ به کودکان بزرگتر از ۶ ماه غذاهایی داده شود که نسبت به حجم آن از بالاترین میزان کالری و مواد غذایی برخوردار باشد.
- ✓ مایعات غذایی گرم نظیر سوپ به کودکان مبتلا به سرماخوردگی و سرفه داده شود.
- ✓ از منابع غذایی حاوی ویتامین C (میوه‌ها و سبزی‌های تازه) جهت تقویت سیستم ایمنی کودک استفاده شود.
- ✓ در کودکان بالای یک سال، دادن مقداری عسل با چای ولرم به بهبود کودک دچار عفونت تنفسی و سرفه کمک می‌کند.

تغذیه در هنگام بیماری

- ✓ برای کودکان کوچکتر از ۶ ماه یا کودکانی که غذای کمکی برای آنها شروع نشده است باید دفعات تغذیه یا شیر مادر بیشتر شود.
- ✓ به کودکان بزرگتر از ۶ ماه غذاهایی داده شود که نسبت به حجم آن از بالاترین میزان کالری و مواد غذایی برخوردار باشد. براساس سن کودک این غذاها باید مخلوطی از غلات، حبوبات موجود محلی یا مخلوطی از غلات و گوشت و مرغ باشد و برای مقوی تر شدن این غذاها می توان به آنها کمی روغن مایع یا کره اضافه کرد. فراورده های لبنی و تخم مرغ نیز مناسب اند. باید کودک را ترغیب کرد تا جایی که میل دارد غذا بخورد.
- ✓ دادن مایعات غذایی گرم نظیر سوپ به کودکان مبتلا به سرماخوردگی و سرفه در بهبود علائم بالینی و جبران آب از دست رفته از طریق تب کمک می کند.
- ✓ استفاده از منابع غذایی حاوی ویتامین C (میوه ها و سبزی های تازه) و روی (گوشت و حبوبات) جهت تقویت سیستم ایمنی کودک افزایش یابد.
- ✓ در کودکان بالای یکسال دادن مقداری عسل با چای ولرم به بهبود کودک دچار عفونت تنفسی و سرفه کمک می کند.

تغذیه بعد از بیماری (دوران نقاهت)

وقتی که کودک بیمار باشد معمولا کمتر غذا می خورد بنابراین پس از برطرف شدن عفونت تنفسی باید به مدت دو هفته یا تا وقتی که کودک دوباره به وزن طبیعی برسد روزی یک وعده غذای اضافی به کودک داده شود. این کار به او کمک خواهد کرد که سلامت طبیعی خود را بازیافته و از ابتلای او به سوءتغذیه جلوگیری شود. سوء تغذیه احتمال بروز مجدد عفونت تنفسی و اسهال را بصورت وخیم تر بیشتر می کند.

تغذیه کودک تب دار

تب با کاهش اشتها و افزایش متابولیسم بدن در روند تغذیه کودک اختلال ایجاد می کند. در این موقع توصیه های زیر مفید است :

- ✓ در کودکان کمتر از ۶ ماه تداوم تغذیه با شیرمادر و یا شیر مصنوعی (در شیرخواران محروم از شیرمادر)

- ✓ تداوم تغذیه با شیرمادر همراه با غذاهای مایع در کودکان بالای ۶ ماه
- ✓ افزایش تعداد دفعات تغذیه حتی با حجم کم جهت جبران کاهش اشتهای کودک
- ✓ توجه به تغذیه بعد از بیماری جهت جبران عقب افتادگی های احتمالی رشد

توصیه های تغذیه ای کودکان بیمار

با توجه به اهمیت تغذیه کودک بیمار در زیر توصیه های کاربردی برای این کودکان آمده است:

- ✓ قبل از دادن غذا به کودک، دست ها و صورت او شسته شود تا کودک احساس آرامش بیشتری کند.
- ✓ در حالتی که کودک خواب آلود است به او غذا داده نشود.
- ✓ تداوم شیردهی در کودکان شیرخوار تاکید می شود.
- ✓ غذا به دفعات بیشتر و با حجم کمتر به کودک داده شود.
- ✓ در صورت گرفتگی بینی ابتدا بینی را تمیز کرده و بعد غذا داده شود.
- ✓ در صورت تهوع :
- به مدت ۴ تا ۶ ساعت دادن غذا قطع شود ولی هر ۱۰ دقیقه مقداری حدود ۱۰ میلی لیتر مایعات داده شود.
- اگر بعد ۴ تا ۶ ساعت استفراغ کودک متوقف شد کمی غذا مثلاً حدود ۳۰ میلی لیتر شیر یا پوره نسبتاً رقیق به کودک داده شود.
- در صورتی که کودک ۳۰ میلی لیتر غذا را تحمل نمود مجدداً ۲ ساعت بعد هم از آن داده شود و کم کم به مقدار و غلظت غذا افزوده شود.
- در صورتی که کودک دوباره استفراغ کرد تغذیه کودک مجدداً با ۱۰ میلی لیتر مایعات شروع شود.
- در صورتی که کودک بعد از هر بار غذا دادن استفراغ کند و نشانه هایی از کم آبی دیده شود ممکن است نیاز به دریافت سرم داشته باشد.
- در صورتی که استفراغ کودک ناشی از شدت سرفه (سرهاوردگی) باشد، بعد از دادن غذا باید کودک مدتی به حالت نشسته باشد و در صورت استفراغ مدتی بعد مجدداً به کودک غذا داده شود.

مشاوره در مورد سلامت دهان و دندان

والدین باید در هنگام تمیز کردن دندان‌های شیرخوار خود، با دقت به دندان‌ها نگاه کرده و در صورت مشاهده‌ی هرگونه علائم تغییر رنگ و لکه بر روی دندان‌ها، به‌خصوص طوق دندان‌های پیشین که محل شایع پوسیدگی می‌باشد و باید با بالا زدن لب شیرخوار بررسی گردد، به دندان‌پزشک مراجعه کنند.

تمیز کردن لثه و دندان‌های شیرخوار

تمیز کردن لثه‌ها، اهمیت بسیاری دارد. نحوه‌ی تمیز نمودن لثه‌ها و دندان‌های کودک به شرح زیر است:

- ابتدا دست‌های خود را بشویید.
- راحت‌ترین راه جهت تمیز کردن لثه و دندان‌های شیرخوار این است که کودک را درحالی که سرش به سمت بدن شما و پاهایش از شما دور باشد در آغوش خود بخوابانید.
- برای بازکردن دهان کودک، بهتر است انگشت سبابه‌ی خود را به آهستگی، به گونه‌ی شیرخوار فشار دهید تا فک پایین باز شود.
- یک تکه گاز تمیز را دور انگشت سبابه پیچیده و لثه‌ی بالا و پایین را به آهستگی تمیز نمایید. یا در صورت دسترسی به مسواک انگشتی، آن را روی انگشت اشاره قرار دهید و به آرامی و با حرکات ملایم چرخشی، لثه و سطوح دندان‌های کودک را تمیز کنید.
- فشار را به اندازه‌ی کافی وارد کنید تا پلاک میکروبی برداشته شود.
- این کار را دو بار در روز، بعد از اولین و آخرین وعده‌ی غذایی انجام دهید که روی هم رفته ۲ دقیقه بیش تر طول نمی‌کشد. هم‌چنین، در صورت دسترسی به مسواک انگشتی، می‌توان با حرکات چرخشی ملایم، از آن برای ماساژ لثه بر روی ناحیه‌ای که دندان در حال رویش است، استفاده نمود تا از درد و ناراحتی کودک بکاهد. مسواک انگشتی، وسیله‌ی ساده و مؤثری جهت کمک به رعایت سلامت دهان و دندان و ماساژ لثه در هنگام رویش دندان‌ها است که از زمان تولد تا ۳ سالگی قابل استفاده می‌باشد. لازم به ذکر است که مسواک انگشتی برای مدت ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده بوده و باید، پس از آن تعویض گردد. مسواک انگشتی را باید بعد از استفاده شسته و در محلی خشک و به دور از آلودگی قرار داد.



برخی از مزایای مسواک انگشتی عبارتند از:

- پس از استفاده، با مایع ظرفشویی قابل شستشو است.
- در آب جوش، استریل شده و قابل فریز کردن نیز می‌باشد.
- از حجم کمی برخوردار بوده و به راحتی قابل حمل است.

تمیز نگه داشتن لثه‌ی شیرخوار با گاز مرطوب



مسواک انگشتی و نحوه‌ی استفاده از آن



برای مسواک زدن دندان‌های کودک بهتر است پدر یا مادر روی زمین نشسته و پاهای خود را در مقابل کودک دراز نمایند و سر کودک را بین پاهای خود به‌گونه‌ای قرار دهند که بازوها و پاهای او توسط والدین کنترل شود و سپس مسواک زدن را آغاز نمایند.

مسواک زدن برای کودکان ۱ تا ۲ ساله

زمان ایده‌آل برای مسواک زدن ۳ تا ۴ دقیقه می‌باشد. زمان‌های مناسب برای مسواک زدن بعد از صبحانه، بعد از ناهار و قبل از خواب شب هستند. استفاده از خمیردندان برای کودکان مفید است مسواک جزء وسایل شخصی می‌باشد و هیچ‌کس نباید از مسواک دیگری استفاده نماید.

بهترین روش مسواک زدن برای کودکان این گروه سنی، روش افقی است. در این روش، مسواک به‌طور افقی و جداگانه بر روی سطوح داخلی و خارجی و جونده‌ی دندان‌ها گذاشته شده و با حرکت مالشی، به جلو و عقب حرکت داده می‌شود. توصیه می‌شود که در این دوران، کودک حتماً با مسواک آشنا شده و در حدود ۲ سالگی استفاده از خمیردندان را نیز شروع نمود. اگر کودک قادر به نگاه‌داری خمیردندان در دهان است، برای هربار مسواک کردن تنها به اندازه‌ی یک نخود، خمیردندان استفاده شود. ولی در کودکانی که خمیردندان را قورت می‌دهند بهتر است تا رفع این عادت، از خمیردندان استفاده نشده یا از خمیردندان بدون فلوراید استفاده گردد.

مسواک زدن برای کودکان ۳ تا ۵ ساله

والدین احساس می‌کنند فرزندانشان در این محدوده‌ی سنی مهارت‌های لازم را برای تمیز نمودن دندان‌هایشان به دست آورده‌اند، در صورتی که، نقش اصلی رعایت سلامت دهان و دندان این کودکان به عهده‌ی والدین است. ایده‌آل آن است که بعد از هربار مصرف مواد غذایی دندان‌ها مسواک زده شوند. در هر حال، مسواک کردن دندان‌ها حتماً باید شب قبل از خواب (به‌دلیل این‌که در زمان خواب، جریان بزاق و حرکات زبان و گونه جهت تمیز کردن محیط دهان کاهش یافته و دندان‌ها مستعد پوسیدگی می‌شوند) و صبح بعد از صبحانه صورت گیرد.

لازم است مسواک کردن حتماً با خمیردندان انجام شود زیرا فلوراید داخل خمیردندان به کنترل پوسیدگی‌های دندانی کمک کرده ولی در صورت عدم دسترسی به خمیردندان با آب هم می‌توان مسواک نمود. استفاده از نمک خشک، جوش شیرین یا سایر پودرها جهت مسواک کردن درست نیست، زیرا سبب ساییدگی مینای دندان و خراشیده شدن لثه می‌گردد. استفاده از آب نمک رقیق (نصف قاشق چای‌خوری در یک لیوان آب جوشیده‌ی سرد) به‌صورت دهان‌شویه جهت ضدعفونی محیط دهان، کمک کننده است.

این سنین معمولاً زمان شروع استفاده از نخ دندان می‌باشد. استفاده از نخ دندان برای نواحی بین دندانی با تماس نزدیک ضروری است. البته، در دوران دندان‌های شیری، استفاده از نخ دندان تنها برای دندان‌های خلفی توصیه می‌شود.

نحوه‌ی صحیح برای تمیز کردن دندان‌های کودک به این صورت است که والد، درحالی پشت سر کودک قرار می‌گیرد که هر دو به یک جهت نگاه می‌کنند. کودک در این حالت سر خود را به سمت عقب برده و به بازوی چپ پدر یا مادر تکیه می‌کند. در این زمان، گونه‌ی کودک با همان دست کنار زده شده و از دست دیگر برای مسواک زدن دندان‌ها استفاده می‌شود. برای این کار، باید مسواک با ملایمت و به آرامی روی سطح داخلی، خارجی و جونده‌ی دندان‌ها به‌طور افقی به حرکت درآید. این موقعیت برای استفاده از نخ دندان نیز کارآیی دارد.




جهت آموزش نحوه مسواک زدن به کودک، والد پشت سر کودک و هم جهت با او اقدام به مسواک زدن برای او می‌کند. این کار با کنار زدن لب توسط انگشت یک دست و مسواک زدن توسط دست دیگر انجام می‌گردد.

بسیاری از والدین برای مسواک زدن دندان‌های فرزندشان، درمقابل وی قرار می‌گیرند که باعث اضطراب کودک شده و سر او نیز بدون حمایت می‌ماند. بنابراین، باید والدین را از استفاده از این روش منع نمود. در این دوره‌ی سنی به شرط قورت ندادن خمیردندان، می‌توان از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده نمود. به هیچ وجه، برای مسواک زدن دندان کودک از خشونت استفاده نکنید. بلکه، باید با آموزش و تشویق مداوم کودک را راضی نمود. برای آموزش کودکان، بهتر است والدین در حضور فرزندانشان دندان‌های خود را مسواک بزنند. جهت اطمینان از فراگیری صحیح کودک می‌توان در پایان، از کودک خواست تا در حضور والد مسواک بزند.

مسواک زدن کودکان ۶ تا ۲۱ ساله

ابتدا دهان را با آب بشویید، سپس به‌اندازه ی یک نخود خمیردندان روی مسواک قرار داده و خمیردندان را به‌داخل موهای مسواک ببرید. در این سن، کودک، می‌تواند خودش مسواک بزند. روش صحیح این است که دندان‌های بالا و پایین جداگانه مسواک‌زده شوند. مسواک کردن از قسمت عقب یک سمت دهان شروع شده و به‌نحوی که سر مسواک در هر مرحله دو تا سه دندان را تمیز نماید، به‌ترتیب سطوح داخلی، خارجی و چونه‌ی کلیدی دندان‌ها مسواک زده می‌شود. هنگام مسواک کردن باید موهای مسواک با زاویه‌ی ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار گیرد.



مسواک را باید طوری روی دندان و لثه قرار داد که با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان و به سمت لثه باشد.

بعد از قرار دادن مسواک روی دندان و لثه، ابتدا باید حرکت لرزشی (حرکات سریع و کوتاه) در محل صورت گیرد و سپس با حرکت میج دست، موهای مسواک روی سطح دندان به طرف سطوح چونه‌چرخانیده شود. این حرکت، باید برای هر دندان، چندین بار انجام گیرد.



دندانهای فک بالا را با حرکت مسواک به سمت پایین تمیز می کنیم.



روش مسواک زدن فک بالا و پایین دندانهای فک پایین را با حرکت مسواک به سمت بالا تمیز می کنیم.

برای سطوح داخلی دندانهای جلو، مسواک را باید به صورت عمودی بر روی سطح داخلی دندانها قرار داد و با حرکات بالا و پایین این سطوح را تمیز نمود

برای مسواک کردن سطح جونده، موهای مسواک را در تماس با سطوح جونده قرار داده و کمی فشار دهید تا موهای مسواک به خوبی به داخل شیارهای سطح جونده وارد شود. سپس، چند بار مسواک را به جلو و عقب بکشید تا این ناحیه، به خوبی تمیز گردد. مسواک زدن به صورت افقی و با شدت زیاد می تواند منجر به تحلیل لثه و حساسیت در نواحی طوق دندانها گردد. چون خرده های مواد غذایی و میکروبها روی سطح زبان جمع می شوند، بهتر است روی زبان را هم با مسواک تمیز نمود. برای این کار مسواک در عقب زبان قرار گرفته و به طرف جلو کشیده می شود. تمیز کردن زبان نقش مهمی در از بین بردن بوی بد دهان دارد. پس از مسواک کردن دندانها و زبان، باید دهان چندین بار با آب شسته شود. وقتی مسواک کردن دندانها تمام شد، مسواک را خوب بشویید و در جایی دور از آلودگی نگه داری کنید. توجه کنید که هیچ گاه مسواک خیس را در جعبه ی سر بسته نگذارید؛ چون رطوبت هوای داخل جعبه زیاد شده و رشد میکروبها را تسریع می کند.



با عمودی گرفتن مسواک و بالا و پایین بردن آن سطح داخلی دندانهای جلوی فک بالا و پایین را مسواک می کنیم.



سطح جونده دندانهای فک بالا و پایین را با عقب و جلو بردن مسواک تمیز می کنیم.

روش استفاده از نخ دندان

حدود ۰۳ تا ۵۴ سانتی‌متر از نخ دندان را ببرید و دو طرف نخ را که بریده‌اید در هر دو دست به دور انگشت وسط یا انگشت بی‌چید. سه انگشت آخر را ببندید و دو دست را از هم دور کنید تا نخ محکم کشیده شود. به این ترتیب، انگشت نشانه و شست هر دست آزاد می‌ماند



طول نخ که بین انگشتان دست آزاد باقی می‌ماند، کافی است ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر طول داشته باشد.

قطعه‌ای از نخ، به طول ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر را بین انگشتان شست و اشاره‌ی دست‌ها نگه دارید برای وارد کردن نخ بین دندان‌های فک پایین از دو انگشت اشاره و بین دندان‌های فک بالا از دو انگشت شست و اشاره استفاده کنید. نخ را با حرکتی شبیه اره کشیدن به آرامی به فضای بین دندان‌ها وارد کنید



جهت نخ کشیدن دندانها، حداقل ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر نخ جدا کنید.



با بستن سه انگشت آخر، انگشت نشانه و شست دو دست آزاد مانده و قدرت مانور بالایی به شما می‌دهد.

پس از این که نخ را وارد فضاهای بین‌دندانی کردید، ابتدا، نخ را به سطح کناری دندان جلویی تکیه داده، با ملایمت به زیر لثه برده، آن را به دیواره‌ی دندان چسبانده و چندبار به طرف بالا و پایین حرکت دهید (شکل ۱-۲-۷۲). بعد از آن، نخ را از لای دندان‌ها خارج کنید. آن قسمت از نخ را که استفاده کرده‌اید، جابه‌جا کرده و نخ کشیدن دندان بعدی را شروع کنید. این کار را برای تمام سطوح بین‌دندان‌ها تکرار کنید.



مرحله بعد این است که نخ
به آرامی با حرکتی شبیه
اره کشیدن به فضای بین
دندانها وارد شود.



نخ را به کناره یکی از دندانها تکیه داده و
به زیر لبه لثه ببرید و سپس به دیواره
دندان کناری بچسبانید و چند بار به طرف
بالا و پایین حرکت دهید. مواظب باشید
فشاری به لثه توسط نخ وارد نشود.

توجه کنید:

- پشت آخرین دندان هر فک را نیز مانند دندانهای دیگر نخ بکشید.
- استفاده از نخ دندان برای کودک باید با کمک والدین آموزش دیده، انجام پذیرد. پس از این که کودک مهارت کافی را به دست آورد، بهتر است این کار را تا مدتی با نظارت والدین انجام دهد.
- بهتر است روزی دوبار (شبها قبل از خواب و صبحها بعد از صبحانه) از نخ دندان استفاده کنید. در غیر این صورت حداقل شبها قبل از خواب ابتدا از نخ دندان استفاده کرده، سپس دندانها را مسواک کنید.
- اگر هنگام مسواک زدن و نخ کشیدن دندانها، درد و خونریزی وجود داشت، جای نگرانی نیست. در اکثر مواقع با ادامه ای این کار و برطرف شدن التهاب لثه، درد و خونریزی هم از بین می رود. اگر پس از یک هفته علائم برطرف نشد، باید به دندانپزشک مراجعه شود.
- کشیدن نخ دندان برای تمام دندانها حدود ۳ تا ۴ دقیقه طول می کشد.
- برای تمیز کردن سطوح بین دندانها، به جای نخ دندان از هیچ نوع نخ دیگر یا وسایل سخت و نوک تیز مثل سنجاق و چوب کبریت استفاده نکنید. در ضمن، توجه داشته باشید که خلال دندان وسیله ای است که به آسانی به لثه آسیب رسانده و معمولاً استفاده از آن توصیه نمی شود.
- استفاده از نخ دندان در کودکان برای نواحی بین دندانی با تماس نزدیک ضروری است. در دوره ای دندانهای شیری، استفاده از نخ دندان تنها برای دندانهای خلفی توسط والدین توصیه می شود.

آسیب دیدگی و شکستگی دندانها

در دوران دبستان، صدمات سر و صورت در کودکان دیده می شود. عواملی نظیر زمین خوردن، ورزش، ضربه هنگام آب خوردن از شیر آب، دعوای کودکان و... سبب وارد شدن آسیب به سر و صورت می گردد. ضربه به دندانها، در حین بازی کودکان شایع بوده و می تواند آسیبهایی با شدت های متفاوت از یک ترک ساده می تا شکستگی استخوان فک ایجاد نماید. در این گونه موارد، چگونگی برخورد با کودک آسیب دیده، بسیار اهمیت دارد و باید به نکات زیر توجه نمود:

- ۱- در هنگام مواجه شدن با چنین آسیب دیدگی‌هایی، ضمن حفظ خونسردی، شرح حادثه (کی، کجا و چگونه) را جویا شده، به سرعت با والدین کودک تماس گرفته و کودک به‌طور اورژانس به دندان‌پزشک ارجاع شود.
- ۲- در آسیب‌های دندان‌های شیری که بیش‌تر به‌صورت لق‌شدگی دندان مشاهده می‌گردد در صورتی که جراحی در اطراف دندان باشد، ابتدا محل را با آب شستشو داده و سپس برای توقف خون‌ریزی گاز تمیزی به‌مدت ۵ دقیقه روی ناحیه‌ی آسیب دیده با فشار نگه داشته شود. سپس جهت بررسی‌های بیش‌تر به دندان‌پزشک ارجاع گردد.
- ۳- در آسیب‌هایی که به دندان‌های دائمی وارد می‌شود در صورتی که فقط قسمتی از تاج دندان شکسته شده باشد، کودک به همراه تکه‌ی دندان به دندان‌پزشک ارجاع داده شود. دندان‌پزشک معمولاً با استفاده از مواد ترمیمی هم‌رنگ، دندان را بازسازی می‌کند. تکه‌ی دندان شکسته باید در محیط مرطوب نگه داشته شود.

بیرون افتادن دندان از دهان

الف. دندان دائمی: بعضی از اوقات ضربه به دندان‌های قدامی باعث بیرون افتادن کامل دندان می‌شود. در مورد دندان‌های دائمی، بهترین کار این است که دندان از سمت تاج نگه داشته شده و زیر جریان ملایم آب یا آب جوشیده‌ی سرد گرفته شود. در این حالت، به‌هیچ وجه دندان و به‌خصوص ریشه نباید با پارچه یا دست پاک شود. سپس باید دندان در یک محیط مرطوب مثل سرم شستشو، شیر، آب جوشیده‌ی سرد و یا بزاق قرار گیرد و بلافاصله در حداقل زمان ممکن به دندان‌پزشک ارجاع شود.

ب. دندان شیری: به‌دلیل آسیبی که ممکن است به دندان دائمی زیرین برسد، نباید تلاشی در جهت گذاشتن دندان شیری در محل حفره‌ی دندان‌ی مربوطه صورت گیرد، ولی بیمار باید فوراً به دندان‌پزشک ارجاع شود. در صورتی که کودک قبلاً به‌طور کامل واکسینه نشده و زخم آلوده باشد، لازم است یک نوبت واکسن کزاز به وی تزریق گردد.

توصیه می‌گردد در صورت وارد آمدن هرگونه ضربه به دندان‌ها، در صورتی که در ظاهر هم شکستگی دیده نشود، دندان‌های کودک توسط دندان‌پزشک معاینه شده و راهنمایی‌های بعدی صورت گیرد.

توصیه‌های سلامت دهان و دندان جهت آموزش والدین

قطره‌ی آهن

برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان‌ها، قطره‌ی آهن را در عقب دهان کودک بچکانید و پس از دادن قطره، به شیر مادرخواران، شیر و به کودکان بزرگ‌تر آب بدهید.

راه‌های پیش‌گیری از پوسیدگی دندان

راه‌های پیش‌گیری از پوسیدگی را که می‌توان به مادر آموزش داد به شرح زیر است:

۱- مسواک زدن

هدف اصلی از مسواک زدن، پاک نمودن پلاک میکروبی از روی دندان‌ها و لثه می‌باشد. درست مسواک کردن وقتی است که تمام سطوح دندان‌ها و لثه به خوبی از پلاک میکروبی پاک گردد. بنابراین، بهتر است این کار در فرصتی مناسب، با زمان کافی و با آرامش صورت پذیرد؛ چرا که، کیفیت مسواک کردن بهتر از تعداد دفعات آن می‌باشد. البته، ایده‌آل آن است که بعد از هر بار مصرف مواد غذایی و به ویژه مواد قندی، دندان‌ها مسواک شود، ولی اگر مقدور نبود، مسواک کردن دندان‌ها حتماً باید صبح‌ها بعد از صبحانه و شب‌ها قبل از خواب صورت گیرد. حداقل زمان برای مسواک زدن، ۴ دقیقه می‌باشد.

۲- استفاده از نخ دندان

سطوح بین‌دندانی به‌هیچ وجه با استفاده از مسواک تمیز نمی‌شوند و تنها به کمک نخ دندان می‌توان این سطوح را تمیز کرد. استفاده از نخ دندان، از سن ۳-۴ سالگی برای نواحی بین‌دندانی آغاز شده و در دوره‌ی دندان‌ی شیری، تنها در صورت داشتن تماس بین دندان‌های خلفی استفاده از آن الزامی است.

۳- فلوراید

فلوراید یک ماده‌ی طبیعی است که باعث افزایش مقاومت دندان‌ها در برابر پوسیدگی می‌شود. این ماده، معمولاً از راه آب آشامیدنی و کم‌تر از آن با غذاهای دریایی مثل ماهی و میگو، چای و بعضی از میوه‌ها به بدن انسان می‌رسد. میزان مناسب فلوراید آب آشامیدنی $1/2 - 0/7$ ppm می‌باشد. حداکثر فواید فلوراید، تنها زمانی حاصل می‌گردد که فلوراید مورد نیاز بدن از راه‌های مختلف مانند فلوراید تراپی، مصرف دهان‌شویه، آب فلورایددار، خمیردندان حاوی فلوراید، قرص و ... تأمین گردد. وارنیش فلوراید در کودکان کوچک‌تر از ۶ سال به‌عنوان یک روش ایمن، بی‌خطر، بدون درد و مؤثر در کاهش پوسیدگی، دوبار در سال استفاده می‌گردد.

فلوراید از طرق مختلف بر دندان‌ها تأثیر می‌گذارد:

۱- مصرف فلوراید سبب ورود آن به عاج و مینای دندان‌های رویش نیافته شده و باعث استحکام دندان و افزایش مقاومت آن در برابر پوسیدگی می‌گردد.

۲- فلوراید مصرفی به‌داخل بزاق ترشح می‌شود. اگر چه غلظت بزاقی آن کم است، اما غلظت آن در پلاک میکروبی زیاد بوده و با کاهش تولید اسید باعث کاهش پوسیدگی دندان می‌گردد.

۳- مصرف موضعی فلوراید (دهان‌شویه، خمیردندان، ژل، وارنیش و...) باعث ورود آن به ساختمان دندان شده و در محکم شدن ساختمان دندان مؤثر است. فلوراید باعث کاهش بروز پوسیدگی در دندان‌های شیری به‌میزان $0/5 - 0/4\%$ و در دندان‌های دائمی به‌میزان $0/6 - 0/5\%$ می‌شود. افزودن فلوراید به آب آشامیدنی جامعه، می‌تواند مؤثرترین روش برای پیش‌گیری از پوسیدگی دندان باشد. روش‌های مختلف استفاده از فلوراید عبارتند از:

الف) روش‌های موضعی شامل دهان‌شویه‌ی سدیم فلوراید، خمیردندان حاوی فلوراید و ژل و وارنیش فلوراید.

ب) روش‌های خوراکی مانند افزودن فلوراید به آب آشامیدنی، افزودن فلوراید به نمک، شیر و ... و استفاده از قرص و قطره‌ی فلوراید. قرص و قطره‌ی فلوراید برای کودکان کوچک‌تر از ۲۱ سال مؤثر بوده و باید توسط دندان‌پزشک تجویز گردد.

اگر مقدار فلوراید آب آشامیدنی یک منطقه بیش از اندازه باشد (2 ppm و یا بیش‌تر)، نقاط سفیدرنگ ماتی روی دندان‌ها دیده می‌شود یا دندان‌ها زرد و قهوه‌ای رنگ می‌شوند که به این حالت فلوروزیس می‌گویند. وقتی فلوروزیس خیلی شدید باشد، مینای دندان نرم و مانند سنگ پا، سوراخ می‌شود.

نحوه‌ی استفاده از دهان‌شویه‌ی سدیم فلوراید:

- حدود ۵ میلی‌لیتر از دهان‌شویه برای هر دانش‌آموز در درب بطری بریزید.
 - برای پیش‌گیری از قورت دادن دهان‌شویه از دانش‌آموزان بخواهید که دهان‌شویه را به داخل دهان بریزند و سرشان را کمی به‌طرف جلو خم کنند. سپس باید به‌مدت ۱ دقیقه دهان‌شویه را داخل دهان به‌گونه‌ای بچرخانند که تمام سطوح دندان‌ها با آن تماس پیدا کرده و سپس آن را بیرون بریزند.
 - باید به دانش‌آموزان یادآوری گردد که پس از مصرف دهان‌شویه، تا مدت نیم‌ساعت چیزی نخورند و نیاشامند.
 - اگر مقدار کمی از دهان‌شویه قورت داده شود نگران نشوید، چون مقدار فلوراید آن ناچیز است؛ ولی اگر مقدار زیادی از آن قورت داده شود، باید:
 - مقداری شیر یا داروی ضد اسید معده (مثل شیر منیزی یا آلومینیوم ام جی اس) که از جذب فلوراید جلوگیری می‌کند، به او بخورانید.
 - دانش‌آموز را به مرکز بهداشتی‌درمانی ارجاع دهید.
- نکات لازم در استفاده از دهان‌شویه‌ی سدیم فلوراید $0/2$ درصد در مدارس عبارتند از:
- بطری $0/52$ میلی‌لیتر دهان‌شویه برای مصرف یک‌سال هر دانش‌آموز کافی است.
 - هفته‌ای یک‌بار حدود ۵ میلی‌لیتر (به اندازه‌ی درب بطری) از دهان‌شویه در هر بار، مصرف می‌شود.

- هر دانش‌آموز باید یک بطری مجزا داشته و نام و نام خانوادگی او بر روی آن درج گردد.
 - پس از هر بار استفاده از دهان‌شویه، درب بطری محکم بسته شود.
 - دانش‌آموزان اول ابتدایی بهتر است مراحل استفاده را چندبار با آب خالی تمرین کنند تا مطمئن شوید دهان‌شویه را قورت نمی‌دهند.
 - دهان‌شویه در طی سال تحصیلی حتماً در مدرسه استفاده شده و پس از آموزش لازم به والدین در طی تعطیلات تابستانی به ایشان تحویل گردد تا دانش‌آموز به‌طور مرتب در منزل با نظارت والدین از دهان‌شویه استفاده نماید.
 - در جلسات اولیا و مربیان جهت آگاهی والدین در رابطه با نقش فلوراید در تقویت دندان‌ها و نحوه‌ی استفاده از دهان‌شویه صحبت شود.
 - محل نگهداری دهان‌شویه باید دور از نور شدید و حرارت باشد.
 - برای جذب بهتر و بیش‌تر فلوراید بهتر است دانش‌آموزان قبل از استفاده از دهان‌شویه دندان‌های خود را مسواک کنند و تا نیم‌ساعت پس از استفاده چیزی نخورند و نیاشامند و حتی دهان خود را با آب نشویند.
 - بهتر است روز معینی در هفته جهت استفاده‌ی دانش‌آموزان تعیین گردد و اگر دانش‌آموزی در آن روز غایب بود، حتماً روز بعد از دهان‌شویه استفاده کند.
 - استفاده از دهان‌شویه از سنین ۶-۷ سالگی زمانی که دندان‌های دائمی شروع به رویش می‌کنند توصیه می‌شود. استفاده از دهان‌شویه می‌تواند تا سنین بالا ادامه پیدا کند. استفاده‌ی هم‌زمان از خمیردندان و دهان‌شویه‌های حاوی فلوراید اثر پیش‌گیری‌کننده‌ی بهتری دارد.
- ماده‌ی وارنیش فلوراید به‌طور گسترده در جهان برای بیش از ۰۳ سال به‌عنوان یک ماده‌ی مؤثر جهت پیش‌گیری از پوسیدگی دندان استفاده شده است. در کودکان کوچک‌تر از ۶ سال، استفاده از وارنیش فلوراید دوبار در سال روش ایمن، بی‌خطر، بدون درد و مؤثر کاهش پوسیدگی است.
- وارنیش فلوراید توسط دندان‌پزشک یا بهداشت‌کار دهان و دندان به‌راحتی به‌وسیله‌ی برس‌های یک‌بار مصرف بر روی دندان‌های کودک مالیده می‌شود. وارنیش‌های فلوراید غالباً باعث تغییر رنگ دندان، به‌رنگ زرد می‌گردد که موقتی بوده و با پاک شدن وارنیش از سطح دندان این تغییر رنگ از بین می‌رود.

نکات قابل توجه در استفاده از وارنیش فلوراید عبارتند از:

- جهت اثر بخشی این ماده باید حداقل دوبار در سال از آن استفاده کرد. دندان‌پزشک می‌تواند برحسب وضعیت دهان و دندان کودک فواصل استفاده از وارنیش را تغییر دهد.
- قبل از فلورایدتراپی با وارنیش باید دندان‌های کودک به‌خوبی مسواک زده شود.
- بعد از استفاده از وارنیش باید حداقل ۲ تا ۴ ساعت از خوردن و آشامیدن پرهیز شود.
- کودک نباید تا روز بعد، از مسواک یا نخ دندان استفاده کند تا وارنیش زمان کافی را جهت تماس با دندان داشته باشد.

۴- مسدود کردن شیارهای دندانی توسط مواد شیارپوش (فیثورسیلانت)

شیارها و فرورفتگی‌های عمیق سطح جونده که با موهای مسواک قابل تمیز کردن نیستند از مناطق مستعد آغاز پوسیدگی‌های دندانی شناخته شده‌اند. جهت جلوگیری از تجمع مواد غذایی در این نواحی و متعاقب آن جلوگیری از پوسیدگی، دندان‌پزشک با مواد مخصوص شیارپوش (فیثورسیلانت) این شیارها را پر کرده و مسدود می‌کند که باعث می‌شود تا مواد غذایی دیگر در این نواحی تجمع نکنند (شکل ۹۲-۲). با این روش راحت و کم‌هزینه، احتمال پوسیدگی دندان‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.



شکل ۲۵-۴: دندان ۶ سالگی بدون
شیارپوش (فیشر سیلانت) که درزهای
مستعد پوسیدگی دارد (تصویر سمت
راست). شیارهای دندان توسط
شیارپوش پوشانده شده است و
دسترسی بزاق و مواد غذایی به شیارها
قطع شده است (تصویر سمت چپ).



مسدود کردن شیارهای دندان

نکات قابل توجه:

- به والدین آموزش داده شود که انجام فیشرسیلانت به تنهایی بر روی دندان دلیلی بر عدم پوسیدگی دندان نیست باشد بلکه به دلیل سهولت در انجام عمل مسواک زدن، کاهش احتمال پوسیدگی را به دنبال دارد.
- باید با تشخیص دندان پزشک انجام درمان فیشرسیلانت برای دندان‌های کودکان صورت گیرد.
- پس از فیشرسیلانت دندان‌ها، بررسی شش‌ماهه و یک‌ساله‌ی دندان‌های کودک توصیه می‌گردد.

۵- رژیم غذایی

تغذیه و رژیم غذایی در رشد و نمو دندان، سلامت مخاط دهان و بافت لثه، استحکام استخوان و پیشگیری و کنترل بیماری‌های دهان نقش مهمی دارد. کمبود مواد مغذی مورد نیاز در زمان رشد سلولی، باعث ایجاد عوارض غیرقابل برگشتی در شکل‌گیری بافت‌های دهان خواهد شد. در صورتی که کودک در سال‌های اول زندگی، دچار سوءتغذیه گردد، احتمال ابتلا به پوسیدگی دندان‌های شیری بیش‌تر می‌شود. تغذیه در هر دو مرحله‌ی پیش از رویش دندان‌ها و پس از آن تأثیرگذار است. البته، تأثیر رژیم غذایی در ایجاد پوسیدگی بعد از رویش دندان‌ها بیش‌تر بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. عادات غذایی در زمان کودکی شکل می‌گیرند و بر سلامت عمومی و سلامت دهان بسیار مؤثر می‌باشند. مشکل مصرف مواد قندی به‌میزان زیاد، معمولاً از همان اوایل دوران کودکی با دادن غذاها و نوشیدنی‌های حاوی مواد قندی در ماه‌های اول زندگی شروع می‌شود. مدارس، از جمله مکان‌هایی هستند که نقش مهمی را در آموزش سلامت کودکان داشته و در ایجاد عادات غذایی سالم در کودک کمک می‌کنند. البته، آموزش‌ها باید با عملکرد و فعالیت مؤثر در مدرسه همراه باشد مانند اجرای برنامه‌هایی در خصوص عرضه‌ی میان‌وعده‌ها و خوراکی‌های سالم در بوفه‌های مدارس. پس از خوردن غذا و رسیدن مواد قندی به میکروب‌های پلاک میکروبی، حدود ۲ تا ۵ دقیقه‌ی بعد، اسید تولید شده، در طی ۰۱ دقیقه، میزان این اسید به حداکثر رسیده و تا حدود یک‌ساعت، محیط دهان در حالت اسیدی باقی می‌ماند تا به حال عادی برگردد. به همین علت، بسیار تأکید می‌شود که در صورت همراه نداشتن مسواک، حداقل دهان خود را پس از مصرف مواد غذایی با آب شستشو دهید. کربوهیدرات‌های قابل تخمیر (قندها یا نشاسته‌های پخته)، از عوامل مهم ایجادکننده‌ی پوسیدگی هستند. قندهای موجود در مواد غذایی مختلف یا نوشیدنی‌ها دارای خاصیت پوسیدگی‌زایی متفاوتی می‌باشند. قندهای موجود در میوه‌ها و سبزی‌ها و غذاهای حاوی نشاسته‌ی پخته مثل برنج و سیب‌زمینی دارای خاصیت پوسیدگی‌زایی پایین می‌باشند. قندهای موجود در فرآورده‌های لبنی (شیر و مشتقات آن) غیر پوسیدگی‌زا هستند. قندهای موجود در مواد غذایی مانند عسل، آب میوه، شکر، شیرینی، نوشابه و بیسکویت بسیار پوسیدگی‌زا می‌باشند.

به‌طور کلی پوسیدگی‌زایی مواد غذایی تحت تأثیر عوامل زیر قرار می‌گیرد:

۱- شکل ماده‌ی غذایی: شکل ماده‌ی غذایی (جامد یا مایع)، مدت زمان تماس دندان با ماده‌ی غذایی را مشخص می‌کند. در مقایسه با غذاهای جامد مانند بیسکویت و کیک، مایعات به‌سرعت از محیط دهان پاک می‌شوند، لذا خاصیت

پوسیدگی‌زایی کم‌تری دارند. مواد قندی مانند آب‌نبات و خوشبوکننده‌های نعنایی دهان که به آهستگی در دهان حل می‌شوند دارای خاصیت پوسیدگی‌زایی بیش‌تری می‌باشند.

۲- قوام ماده‌ی غذایی: تنقلاتی که قدرت چسبندگی بیش‌تری بر سطح دندان‌ها دارند (از قبیل چیپس، گز، سوهان و شکلات) مدت زمان طولانی‌تری در تماس با دندان می‌باشند. بنابراین، میزان پوسیدگی‌زایی آن‌ها بیش‌تر خواهد بود.

۳- دفعات مصرف مواد غذایی: با هر بار مصرف مواد قندی، محیط پلاک میکروبی، اسیدی شده و منجر به پوسیدگی می‌شود. بنابراین، هرچه دفعات مصرف این مواد کم‌تر باشد، احتمال ابتلا به پوسیدگی کاهش می‌یابد. باید از استفاده‌ی مکرر از خوردنی‌ها و تنقلات شیرین در فواصل وعده‌های غذایی اصلی خودداری شود.

۴- ترکیب و ترتیب غذاهای مصرفی: مصرف غذاها با هم می‌توانند اثرات پوسیدگی‌زایی را کاهش یا افزایش دهند. برای مثال، استفاده از نوشابه‌ها و غذاهای حاوی مواد قندی همراه با سایر مواد غذایی دیگر، فرصت مناسبی برای تولید اسید فراهم می‌کند. درحالی‌که استفاده از غذاهای حاوی کلسیم (مثل ماست بدون چربی و پنیر) یا فلوراید (از قبیل اسفنج پخته شده، پنیر و ذرت کنسرو شده) و نیز غذاهای سفت و حاوی فیبر (مثل میوه و سبزی‌های خام و مرکبات) هم‌زمان با سایر مواد غذایی تأثیر مثبتی در کاهش پوسیدگی‌زایی دارد.

توصیه‌های تغذیه‌ای:

- بهتر است به‌عنوان میان‌وعده به‌جای شیرینی از میوه‌های تازه و سبزی‌ها، ماست ساده و مغزها (بادام، گردو و ...) استفاده شود.
- مصرف مواد قندی محدود به وعده‌های غذایی اصلی (صبحانه، نهار و شام) گردد که پس از آن‌ها مسواک زده شود.
- درصورت مصرف هر نوع ماده‌ی قندی، لازم است بلافاصله دندان‌ها را مسواک زد و درصورت عدم دسترسی چند مرتبه دهان و دندان را با آب شستشو داد.
- غذاهای آماده، نوشابه‌ها و تنقلات شیرین ناپیستی به‌صورت روزمره به کودکان داده شود.
- استفاده از محصولات لبنی مثل پنیر در پایان وعده‌ی غذایی باعث کاهش میزان اسید در دهان می‌گردد. شاید خوردن لقمه‌ای نان و پنیر در آخر هر وعده‌ی غذایی مانند گذشتگان، عادت غذایی مناسبی باشد.
- درصورت مصرف شیرینی جهت کاهش اثر پوسیدگی‌زایی آن، استفاده‌ی هم‌زمان با شیر به‌دلیل داشتن فسفر و کلسیم که یون‌های لازم را برای آهکی شدن مجدد مینا در اختیار دندان قرار می‌دهد، توصیه می‌گردد.
- استفاده از آب بین وعده‌های غذایی اصلی توصیه می‌گردد.
- بهتر است کودک پس از وعده‌ی غذایی شام و قبل از خوابیدن از میان وعده‌های حاوی کربوهیدرات استفاده نکند.
- بلافاصله پس از مصرف نوشیدنی‌های اسیدی مثل آب پرتقال نباید دندان‌ها را مسواک کرد زیرا می‌تواند باعث سایش بر روی دندان‌ها گردد.
- از مصرف غذاهای پرکربوهیدرات و غذاهایی که به دندان‌ها چسبیده یا به کندی حل می‌شوند پرهیز شود.
- خوردن غذاهای سفت و حاوی فیبر مانند سیب، هویج، کرفس و ... به‌علت تحریک غدد بزاقی و کمک به پاک شدن مواد غذایی از سطح دندان‌ها برای کودک مفید است.
- آب میوه‌ها قبل از ۶ ماهگی به رژیم غذایی شیرخوار افزوده نشود.
- آب میوه‌های طبیعی یا صنعتی با شیشه، فنجان‌های سرپوشیده یا در زمان خواب مصرف نشود.
- بهتر است به‌جای آب میوه، از میوه‌های تازه استفاده شود.
- جهت پاک شدن سطح دندان‌ها بعد از هر بار مصرف شربت‌های دارویی و تقویتی شیرین، آب کافی داده شود.
- درصورت تمایل کودک به مصرف آدامس، استفاده از آدامس‌های بدون قند توصیه می‌گردد.

اهمیت حفظ دندان‌های شیری

- دندان‌های شیری فضای لازم و محیط مناسبی را برای رویش دندان‌های دائمی فراهم کرده و به‌عنوان راهنمایی جهت رویش صحیح دندان‌های دائمی محسوب می‌شوند. بنابراین، اگر زودتر از دست بروند به دلیل کمبود فضا، سبب جابه‌جایی و نامرتب شدن دندان‌های دائمی خواهند شد که درمان آن هزینه‌ی گزافی را به خانواده‌ها تحمیل خواهد کرد. هم‌چنین، در صورتی که دندان‌های شیری بیش از زمان لازم در دهان باقی بمانند موجب بروز مشکلات رویش دندان‌های دائمی می‌گردند.
- دندان‌های شیری به رشد و تکامل صورت کمک می‌کنند. در صورتی که دندان‌های شیری زود کشیده شوند، رشد فک‌ی به درستی انجام نخواهد شد.
- دندان‌های شیری در جویدن و هضم غذا نقش دارند. کودک در حال رشد به تغذیه‌ی مناسب نیاز دارد. تغذیه‌ی کودک دارای دندان‌های پوسیده دچار اشکال شده و سلامت کودک به مخاطره می‌افتد.
- دندان‌های شیری در تکلم و بیان صحیح حروف مؤثرند. بنابراین، از لحاظ رفتاری کودک راحت‌تر با کودکان دیگر ارتباط برقرار می‌کند.
- آسیب‌هایی که به دندان‌های قدامی شیری وارد می‌شود، ممکن است سبب عفونی شدن آن‌ها شده و باعث تغییراتی از قبیل تغییر رنگ، نقص در شکل و کج شدن جوانه‌ی دندان‌های دائمی زیرین در دندان‌های دائمی گردد. لازم به ذکر است که پوسیدگی دندان شیری نیز می‌تواند موجب آسیب به جوانه‌ی دندان‌های دائمی زیرین خود گردد.
- باید توجه نمود که دندان ۶ سالگی (اولین دندان آسیای بزرگ دائمی)، الگوی رویش سایر دندان‌های دائمی است و اگر در جای صحیح خود در زمان مناسب رویش یابد، تقریباً می‌توان انتظار داشت که سایر دندان‌های دائمی هم صحیح و مرتب رویش یابند. محل رویش آن، پشت آخرین دندان شیری (دندان آسیای دوم شیری) است. چون این دندان، اولین دندان دائمی است که جانشین دندان شیری نشده و بدون افتادن دندان شیری، رویش می‌یابد، اکثر والدین تصور می‌کنند که این دندان، شیری است و با این باور غلط که اگر دندان شیری بیافتد، دندان دیگری بدون هیچ مشکلی به‌جای آن می‌روید، تلاشی برای تمیز نگاه داشتن آن نمی‌شود و این درحالی است که دندان ۶ با تمام اهمیتی که برای آن ذکر شد، باید تا پایان عمر در دهان باقی بماند، اما ممکن است به این ترتیب، زودتر پوسیده شده و از بین برود و در نتیجه، مشکلات متعدد دهان و دندانی بعد را در آینده ایجاد نماید. با صلاح‌دید دندان‌پزشک باید آن را فیشرسیلانت نمود.

عادات دهانی غلط در کودکان

رویش دندان‌ها فرآیند بسیار پیچیده‌ای است و از نظم خاصی پیروی می‌نماید. محل قرارگیری دندان‌ها توسط چندین عامل کنترل می‌شود:

- ۱- نیروی ناشی از زبان که به دندان فشار می‌آورد.
 - ۲- نیروی عضلات لب که دندان را سرجایش نگاه می‌دارد.
 - ۳- حرکت عضلات گونه و فشار دندان مقابل.
- به‌طور طبیعی تعادل نیروهای فوق باعث ردیف شدن دندان‌ها می‌شود ولی در بعضی موارد عادات دهانی غلط کودک تعادل نیروهای فوق را برهم زده و مشکلاتی را ایجاد می‌نماید که تشخیص به‌موقع این عادات غلط و کمک به رفع آن‌ها باعث پیش‌گیری از به‌هم خوردن ترتیب دندان‌ها می‌گردد. از عادات دهانی غلط کودک موارد زیر حائز اهمیت می‌باشد.
- گاز گرفتن لب: این عادت غلط سبب کج شدن دندان‌ها می‌شود. اکثر والدین متوجه این عادت غلط نمی‌شوند. در مدرسه هم گاز گرفتن لب پایین را معمولاً به حساب تمرکز و توجه بیشتر دانش‌آموز می‌گذارند. برای تشخیص، باید به‌دقت به لب پایین نگاه کرد. معمولاً حاشیه‌ی لب مشخص نمی‌باشد و لب پایین قرمزتر از لب بالا بوده و محل فشار دندان‌های بالا بر روی آن قابل تشخیص است. به‌دلیل این که لب، داخل دهان قرار می‌گیرد و زبان چربی‌های نرم

کننده‌ی آن را پاک می‌کند دچار خشکی می‌شود. به‌همین دلیل، این کودکان لب خود را به‌طور مداوم با زبانشان مرطوب می‌کنند. استفاده از کرم‌های مرطوب کننده‌ی لب به ترک این عادت کمک می‌کند.

- قرار دادن زبان بین دندان‌ها: این مسئله نیاز به توجه و دقت فراوان دارد. چنانچه این عادت غلط در سنین پایین اصلاح گردد، سبب پیش‌گیری از مشکلات ارتودنسی در آینده می‌شود. برای تشخیص این مشکل، هنگام بلع به‌دقت به زبان و عضلات لب پایین و چانه توجه کنید. اگر هنگام بلع، زبان بین دندان‌ها فاصله اندازد یا عضلات چانه و لب پایین زیاد و به‌صورت غیر عادی منقبض شوند، احتمال ابتلا به این عادت وجود دارد. برای کمک به ترک این عادت بهتر است کودک در مقابل یک آینه قرار گرفته و سعی کند در هنگام بلع، زبان او از لای دندان‌هایش بیرون نرزد.
- جویدن ناخن: ممکن است کودک از ۲ سالگی به این عادت مبتلا گردد. والدینی که متوجه می‌شوند کودکشان نیاز به کوتاه کردن ناخن پیدا نمی‌کنند باید به این مسئله توجه بیشتری نمایند. آگاه کردن کودک، یادآوری، تشویق و استفاده از دوستان و معلمین برای رفع این عادت مفید می‌باشد.
- جویدن گونه: جویدن گونه عادت غلطی است که معمولاً والدین دیرتر متوجه آن می‌شوند. هنگام جویدن گونه، قسمت جلوی لب تغییر حالت می‌یابد. برای تشخیص آن باید به‌داخل دهان و قسمت داخل گونه توجه نمود. معمولاً یک خط برجسته و برافروخته در آن ناحیه دیده می‌شود. آگاه کردن کودک، یادآوری و تشویق برای رفع این عادت مفید می‌باشد.
- سائیدن دندان‌ها روی هم (دندان قروچه): این عادت غلط بیش‌تر مربوط به عضلات جونده می‌باشد که با انقباض خود، سبب سائیده شدن دندان‌ها می‌شوند. کودک ممکن است از صدای آن خوشش بیاید و برایش یک عادت شود. این عادت به‌خودی‌خود نمی‌تواند سبب نامرتبی دندان‌ها شود ولی هنگامی که در دوره‌ی دندان‌های شیری انجام شود، سبب تأخیر و اشکال در رویش دندان‌های دائمی می‌گردد.
- مکیدن انگشت: این عادت معمولاً در کودکانی مشاهده می‌گردد که از شیر مادر محروم می‌باشند. متأسفانه این عادت غلط در صورت عدم توجه، بعد از سن چهار سالگی عوارض بسیاری در شکل‌گیری و رشد دندان‌ها، فک‌ها و شکل صورت ایجاد می‌کند. برای تشخیص آن می‌توان به تمیز بودن انگشت مکیده شده و وضعیت کودک هنگام خواب دقت نمود.
- جویدن اشیا: کودک ممکن است چیزهایی مانند خودکار، آستین پیراهن یا اسباب‌بازی‌های خود را جایگزین مکیدن انگشت یا پستانک کند. این اشیا، اگر برای مدت کوتاهی استفاده شوند معمولاً عارضه‌ای ندارند ولی اگر این عمل به‌صورت عادت درآید، حتماً مشکلاتی را در سیستم دهان و دندان ایجاد می‌نماید.
- پستانک: یکی دیگر از عادات غلط استفاده از پستانک می‌باشد. باید در نظر داشت که در صورت ایجاد این عادت، اگر جدا کردن کودک از پستانک با زور صورت گیرد، ممکن است مشکلات دیگری از قبیل شب‌ادراری را به‌وجود آورد. بهترین راه برای ترک پستانک یا عادات دیگر، بالا بردن سطح آگاهی کودک نسبت به مسئله می‌باشد. نباید یادآوری به کودک بیش از حد باشد.

پیشگیری از حوادث و سوانح

سوختگی ها:

حس کودکان برای گرما بطور کامل تشکیل نشده است. آب داغ و مایعات داغ دیگر مثل روغن داغ ، نور شدید خورشید، آتش، رادياتور ، کفگیر داغ ، درپوشها، بخاری ها و درب آنها ، تنور و منقل و غذاهای داغ و انواع دیگر سوزاننده ها وجود دارند که باید مراقب بود. آب حمام قبل از وارد کردن شیرخوار کنترل شود. آفتاب نیز می تواند سوختگی درجه ۱ یا ۲ ایجاد کند. بهتر است در آفتاب سرو صورت پوشانیده شود.

جلو هردستگاه حرارتی محافظ وجود داشته و کودک در مقابل آن محافظت شود. تنور و منقل و اجاق محافظ داشته باشد.

فردی که در حال سیگار کشیدن یا نوشیدن مایعات داغ است ، کودک را بغل نکند. سیگار، شمع و دستگاه بخور خارج از دسترس کودک باشد، دستگاه بخور گرم می تواند خطرناک باشد . در اطراف کودک هیچگونه دود وجود نداشته باشد (دود سیگار، تریاک وغیره)

صدمه حرارتی دیگر در اتومبیل درب بسته است لذا هیچگاه کودک را در اتومبیل پارک شده بخصوص اگر در معرض آفتاب باشد، نگذارید زیرا سوختگی توسط آلات فلزی و پلاستیک صندلی و بند آن در اتومبیل پارک شده در آفتاب اتفاق می افتد. قسمت های فلزی کمر بند ایمنی نیز امتحان شود و بهتر است بند آن رنگ روشن داشته باشد که حرارت را کمتر جذب کند.

برق گرفتگی:

خروجی ها و ویریزهای برق را ببوشانید و اجازه ندهید کودک با سیم برق، چراغ برق یا فندک برقی، تلویزیون و دستگاه های برقی بازی کند. سیم های برق پوشش داشته باشد و مراقب باشید سیم اطو و وسایل برقی دیگر آویزان نباشد و بطور کلی خارج از دسترس کودک باشد.

خفگی و غرق شدگی

خفگی بعلت جسم خارجی از علل عمده مرگ کودکان زیر یکسال است، این خطر از زمانی است که کودکان می توانند اشیاء را به دهان برده و بلعند ، لذا : اشیاء کمتر از ۳/۲۵ سانتیمتر ی ، اگر بلعیده شوند ، بطور کامل راه هوایی رامی بندند. همه اسباب بازیها که قطعات جدا شونده ریز دارند ، جفجغه هایی که شکسته و دانه ها و قطعات جدا شدنی دارند، چشمان عروسکها یا دماغ آنها، دکمه های جدا شدنی یا اجزاء پلاستیکی ، اشیاء آویزان متحرک بالای سر کودکان که ممکن است آنها را چنگ زده و به دهان ببرند و اگر شیئی جدا شدنی داشته باشد بلعند و خفه شوند ، باید دور از دسترس کودکان باشند. اسباب بازیها، بزرگ ، ستر و محکم و بدون لبه تیز یا قطعات ریز جدا نشدنی باشد. به مجرد توان خزیدن یا بازی در کف اتاق باید هر شیئی ریز مثل سکه وغیره نیز از دسترس آنها دور باشد.

لباس کودکان ، از جلو دکمه نداشته باشد که کنده و بلعیده شود . هنگام عوض کردن کهنه شیرخوار (چنانچه از سنجاق قفلی استفاده می شود،) سنجاق قفلی دور از دسترس او باشد.

از دیگر علل مهم خفگی ها ، غذا و مواد غذایی است، دقت شود که لقمه ها و تکه های بزرگ و گرد گوشت ، سوسیس ، جگر، ماهی با استخوان و قطعات بزرگ کره در دهان او نگذارید و آنها را به قطعات ریز تبدیل کنید. از دادن میوه های دانه دار یا

هسته دار ودانه‌های مختلف روغنی (مانند بادام زمینی، ذرت، پسته)، آب نبات سفت، آدامس، آجیل، ذرت، خشکبار و کشمش و مشابه اینها اجتناب کنید.

احتمالاً خطرناکترین غذاها، حبوبات ودانه های خشک است که وقتی وارد راه هوایی شوند با جذب آب راه هوایی را مسدود می کنند.

هرگز از گول زنک استفاده نشود زیرا ممکن است کنده و وارد راه هوایی شده و سبب خفگی کودک گردد. سر سوزنها و پوشش روی سوزن نیز دور از دسترس کودکان باشد. هرگز از پودر برای پوست کودک استفاده نشود زیرا ورودش به ریه خطرناک می باشد. (اگر لازم شد نشاسته ذرت را به کف دست پاشیده و به چین های کودک بمالید سپس درب آن را محکم نموده و خارج از دسترس کودکان قرار دهید).

مرگ کودکان، اغلب به علت انسداد راه هوایی (دهان یا بینی) یا فشار روی حلق و سینه و یا حبس شدن در فضای بسته مثل یخچال و غیره است. یخچال های قدیمی، اجاق گاز و بخاری های قدیمی و غیره را دور بیندازید. اگزوسایکل قدیمی را نگه می دارید درب آنها را جدا کنید. کنترل درب های اتوماتیک در دسترس کودک نباشد. جعبه اسباب بازیها یا جعبه ها و صندوق ها ایمن باشد و درب سنگین و آویزان نداشته باشد. نخ و طناب های پرده کرکره و غیره را که کور هستند خارج از دسترس کودک نگه دارید. درب وسایلی چون لباسشویی، کمد، صندوق، فریزر صندوقی و غیره توسط قفل های ایمنی محکم شود.

بادکنک کمی باد کرده، بدون باد و یا ترکیده علت اصلی مرگ در اثر خفگی است و باید از دسترس کودکان دور باشد (همچنین در مراکز درمانی دستکش های لاتکس باید از دسترس کودکان دور باشد)

- باید بزرگترها بادکنک ها را باد کنند
- کودکان تحت نظر والدین با بادکنک بازی کنند
- بزرگترها، بادکنک های ترکیده را از محیط دور کنند
- کودکان بزرگتر را از خطر وارد کردن و جویدن یا مکیدن تکه های بادکنک آگاه کنند

چنانچه شیرخوار در زیر پتو، نتواند آزاد حرکت کند ممکن است درون آن گیر بیفتد. بالش خیلی نرم که صورت نوزاد در آن فرو می رود نیز می تواند نوزاد را خفه کند.

گیرافتادن سر نوزاد بین نرده های تخت یا بین تشک و نرده یا اشیاء نزدیک به آن، ممکن است باعث خفگی شود. فاصله افتادن بین تشک های بزرگ سالان یا تخت های تاشو نیز خطرناک است. فاصله نرده های تخت نباید بیشتر از ۶ سانتیمتر باشد (سه عرض انگشت افراد بزرگسال) و تشک کیپ تخت یا گهواره باشد. اگر فاصله تشک و کناره تخت یا گهواره بیش از ۲ عرض انگشت فرد بزرگسال باشد تشک خیلی کوچک است و باید یک حوله لوله لوله کرده و در این فاصله جا داد که درست کیپ شود.

تخت و گهواره دور از وسایل بزرگ باشد همچنین دور از پنجره زیرا ممکن است نخ پرده دور گردن کودک بیفتد و خفه اش کند.

علت دیگر خفگی کودکان کیسه های پلاستیکی است. پوشش های پلاستیکی کهنه کودکان و سایر کیسه های پلاستیکی نیز برای کودکان خردسال خطرناک است .

کیسه های پلاستیکی که روی لباس کشیده می شوند سبک هستند و ممکن است شیرخوار فعال، براحتی و بسرعت آنرا دور سرش بپیچد یا روی صورت خودبفشارد. به همین دلیل نباید روی بالش یا تشک را پلاستیک کشید.

طناب ها و بندها نیز می توانند باعث خفگی کودک شود. لذا پیش بند در موقع خواب برداشته و هیچ چیزی بگردن شیرخوار آویزان نشود. اسباب بازیهای بنددار مثل تلفن یا آنچه با بند به تخت کودک بسته می شود خطرناک است و ممکن است دورگردن کودک بیفتد . لذا همه بندها باید کمتر از ۳۰ سانتی مترطول داشته باشد اسباب بازیهای آویزان شده بر روی تخت کودک یا گهواره نباید آنقدر بلند باشد که کودک درون آنها گیربافتد و هنگامی که کودک می تواند خود را به آنها برساند دیگر نباید چنین اسباب بازیهایی را استفاده کرد.

بندهای صندلی کودک نیز بایستی خوب بسته شده باشد که بین آنها گیر نکند.

غرق شدگی :

همه کودکان خردسال وقتی نزدیک آب هستند درخطر سقوط وخفگی قرار دارند، او خیلی کنجکاو است و توان تفحص دارد اما درآب توان دفاع و نجات خود را ندارد. از خطر آب آگاه نیست و باید بدانیم که عمق آب مهم نیست گاهی حتی چند اینچ آب، کودک را دراین سن خفه می کند. هرگاه نزدیک آب از هر نوع منبع آب از جمله دلو آب است مواظب او باشید. لذا همیشه مراقبت در وان ، استخر ، رودخانه، حوض آب، توالی ، دلو آب ، لگن و غیره لازم است درب حمام و توالی و دریچه های آب بسته باشد. اطراف استخر و حوض آب نرده داشته باشد و درب آنها قفل باشد. شنا و روشهای ایمنی آب را برایش توضیح دهید.

مسمومیت :

مسمومیت ها یکی دیگر از علل مرگ کودکان کمتر از ۵ سال است که به ترتیب در ۲ ساله ها و یکساله هاشیوع زیاده تری دارد. آنها که هنوز نمی خزند کمتر در خطرند. حدود ۵۰۰ ماده سمی در خانه ها وجود دارد که یک سوم آنها مربوط به آشپزخانه است . دلیل عمده مسمومیت نگهداری آنها درمحل نامناسب است. برای پیشگیری از مسمومیت شیرخوار بایستی عوامل سمی در طبقات پایین قفسه ها ، روی میز ، کف اتاق نباشد. در کیف دستی وغیره دارو نباشد. هیچگاه کودک درآشپزخانه تنها نباشد.

پماد، کرم ، روغن ، پودر تالک که موقع تعویض کهنه استفاده می شود، گلدانها وبرگ آنها و گلها که کودک را جذب می کند (چون بیشتر از ۷۰۰ گونه گیاهی بیماری زا وجود دارد) دور از دسترس باشد.

باتریهای دکمه ای چون براق و درخشان هستند جلب کننده بوده می تواند موجب مرگ باشد ، انسداد مری ، سوزاندن مری بخاطر قلیائیت آن از عوارض دیگر آن است .بخار کلر از تمیز کننده های خانگی یا استخر، دود کواکسین ، دود مواد آفیونی نیز خطرناک است و نباید در اطراف کودک استفاده شود.

چون این شیرخوار بزودی نوپای بالا رونده می شود سموم باید در قفسه قفل دار باشند.

انواع مواد تمیز کننده و شوینده ، براق کننده ، لباسشویی ، رنگ ها، حشره کش ها، حلال ها خطرناک است .هیچ نوع ماده سمی در بطری هایی که مواد غذایی در آنها می ریزند نگهداری نشود.

حوادث وسایل نقلیه :

حوادث وسایل نقلیه در بچه های بالای یکسال علت مهم مرگ است . از جمله این حوادث نبودن صندلی و کمر بند ایمنی مخصوص این سن و بودن شیرخوار در بغل فرد دیگر است ، بایستی شیرخواران در صندلی مخصوصی که پشت به جلو و در صندلی عقب جاسازی شده قرار گیرند. این صندلی زاویه منفرجه دارد که روی آن به طرف پشت اتومبیل است . این نوع صندلی می تواند سربزرگ و گردن ضعیف یک کودک خردسال را محافظت کند.

بایستی شیرخواران تا ۲۰ پوند (۱۰ کیلوگرم) و تا نزدیک یکسال در چنین صندلی هایی قرار داشته باشند.

صدمات بدنی :

اشیاء تیز ، خلال دندان ، چنگال ، چاقو، قیچی و غیره نباید در دسترس کودک باشد واز دادن قاشق به دست کودک تا سن ۱۸ ماهگی که توان استفاده از قاشق را پیدا می کند، اجتناب کنید . صداهای زیاد نیز می توانند منجر به اختلال شنوایی شوند. جوراب ، چنانچه کش نامناسب داشته باشد و مو یا نخ که اطراف انگشت کودک بیچد می تواند صدمه برساند. مراقب باشید که سگ و گربه و سایر حیوانات خانگی به شیرخواران حمله نکنند.

توصیه هایی برای مراقبت از تکامل کودک

هر چه کودکان بزرگتر می شوند توانا تر می شوند. آن ها یاد می گیرند صحبت کنند، راه بروند و بدونند، فکر کنند و مسائل را حل کنند، این تغییرات نمونه هایی از تکامل کودک است، مادر و یا دیگر افرادی که از کودک مراقبت می کنند، می توانند کمک کنند تا بچه با ارتباط برقرار کردن و بازی کردن بخوبی رشد کرده و یاد بگیرد. ارتباط و بازی رشد و تکامل فکری و اجتماعی کودک را تحریک می کنند. در بعضی موارد ممکن است والدین دانش کافی برای بازی کردن و یا ارتباط برقرار کردن با کودکان نداشته باشند، چنین والدینی نیازمند یاری، تشویق و حمایت می باشند تا اطمینان حاصل شود که کودکانشان تا حد پتانسیل کاملشان رشد و تکامل پیدا کنند. مطالعات نشان داده اند که توجه بیشتر در بازی کردن و ارتباط برقرار کردن به موازات یک تغذیه کامل، بسیار پر اهمیت برای کودکان با تغذیه ضعیف و نوزادان با جثه کوچک می باشد. مراقبت بیشتر از کودکی که دچار ضعف تغذیه می باشد، بسیار مهم است، یک کودک کم وزن به نسبت سن خود ممکن است بصورت فعالانه کاوش نکرده و یاد نگیرد و ممکن است توجه مادر خود را نیز طلب نکند، مادرش برای بازی کردن و ارتباط برقرار کردن با او نیازمند تشویق است تا او را در امر یادگیری یاری کند، زمان غذا دادن از اهمیت بالایی برخوردار است. یک مادر ممکن است نیاز به همکاری از سوی دیگر اعضای خانواده داشته باشد تا بتواند زمان بیشتری را با کودک خود سپری کند. یک مادر مشغول نیز می تواند در حین انجام کارهای خانه با کودکش بازی و ارتباط برقرار کند و برای بازی با کودک از اشیاء ساده ای که معمولاً در هر خانه ای موجود است استفاده کند. او می تواند به کودکش لغات و ایده های جدید بیاموزد و می تواند کمک کند که کودک خود را بخشی از خانواده احساس کند. لذت دیدن پاسخگویی کودک، مادر را تشویق می کند تا مراقبت اضافی که کودک نیازمند آن است را فراهم کند. برنامه مراقبت از تکامل کودک، نمونه هایی از بازی و ارتباط گفتاری را که مناسب سن کودک است پیشنهاد می دهد. بازی و ارتباط گفتاری با کودک بایستی از زمان تولد شروع شود. نباید کودک را بصورت محکم در لباس محدود کرد. کودک باید قادر به حرکت کردن، نگاه کردن و لمس کردن دنیای اطراف خود باشد. زمانی که یک کودک به سن ۴ ماهگی می رسد از دسترسی به اشیاء رنگی مطمئن بهداشتی خانگی مانند فنجان پلاستیکی و یا کاسه فلزی لذت خواهد برد همچنین کودکان در این سن دوست دارند صورت افراد را ببینند. صداهای جدید مانند جیغ زدن و یا خندیدن را در بیاورند که پاسخی به صدای یک نفر می باشد. آن ها تلاش می کنند تا صداهایی را که می شنوند و یا حرکاتی را که می بینند تقلید کنند. آن ها حتی قبل از اینکه بتوانند کلمه ای بگویند، شروع می کنند به یادگیری اینکه چگونه با یک فرد دیگر مکالمه کنند. اینگونه فعالیت های بازی و ارتباط همچنان که کودک رشد و تکامل می یابد تغییر می کند. یک کودک یک و نیم ساله دوست دارد سنگریزه ها را در قوطی بگذارد ولی کودک ۴ ساله می تواند شمارش آن ها را نیز به هنگام گذاشتن سنگ ها در قوطی یاد بگیرد. یک کودک یک و نیم ساله می تواند یاد بگیرد که اعضای صورت را نشان دهد، یک کودک ۴ ساله می تواند یاد بگیرد که درستی شکل یک بینی را در بین دیگر قسمت های صورت در یک پازل خانگی ساده جایگذاری کند. این آموزش ها خانواده را مجهز به یک سری دانش ها و مهارت ها می کند تا کودکان خود را به مراحل بعدی مناسب سوق دهند و در انجام آن یک تفاوت مثبتی را در تکامل کودکان ایجاد می کنند. آن ها می توانند کودک را برای یک شروع موفق در مدرسه آماده کنند.

برای ارزیابی چگونگی مراقبت از تکامل کودک و چگونگی مشاوره دادن به مادر از مهارت ارتباطی که قبلاً یاد گرفته اید استفاده کنید. پیرسید و گوش دهید، تحسین کنید، مشاوره بدهید، از فهم طرف مقابل اطمینان حاصل کنید.

مراقبت از تکامل کودک را ارزیابی کنید:

- ۱- بعد از اینکه به مادر در مورد غذا دادن به کودک مشاوره دادید، مراقبت از تکامل کودک را ارزیابی کنید.
- ۲- در ابتدا در حین مشاوره مادر و کودک را زیر نظر بگیرید.

- a. مادر چگونه با کودک خود در تعامل است؟
 - b. کودک چگونه به مادر پاسخ می دهد؟
 - c. از مادر سوالاتی در مورد نحوه مراقبت از تکامل کودک پرسید.
- i. پرسید چگونه با کودک خود بازی می کنید؟ (از کلماتی استفاده کنید که مادر متوجه آن ها بشود، شاید برای مادر گفتن اینکه چگونه با کودک خود بازی می کند سخت باشد. شاید نیازمند نشان دادن چند مثال یا نمایش دادن شوید)
 - ii. پرسید چگونه با کودک خود ارتباط برقرار می کند؟ (حتما از کلماتی استفاده کنید که مادر متوجه آن ها بشود، بعضی مواقع یک مادر نمی داند چگونه به یک سوال پاسخ دهد) ممکن است نیاز داشته باشید نحوه ارتباط برقرار کردن با کودک و اهمیتی که ارتباط برقرار کردن با کودکش دارد را به او نشان دهید. حتی قبل از اینکه قادر به صحبت کردن باشد، مادر با جواب دادن به صداهایی که کودک به هنگام گرسنگی تولید می کند، با کودکش ارتباط برقرار می کند و به کودکش کمک می کند تا برقراری ارتباط را یاد بگیرد. او همچنین با خندیدن و صدا در آوردن و بعضی حرکات با او ارتباط برقرار می کند. شما می توانید از مادر بخواهید نشان دهد که چگونه کودکش را می خنداند. به جواب های مادر گوش دهید. نگاه کنید که چگونه با کودکش ارتباط برقرار می کند. به آن چه مادر بخوبی انجام می دهد، گوش کنید و نگاه کنید و ببینید چگونه می توانید باعث پیشرفت مادر شوید. از آموخته های خود در مورد مراقبت کودک به هنگام مشاوره مادر برای حمایت از تکامل کودکشان استفاده کنید. فعالیت های خاص ارتباط و بازی را نسبت به سن کودک به مادر پیشنهاد دهید و در آخر به مادر در حل مشکلات کمک کنید تا مادر و دیگر افرادی که در امر مراقبت کمک می کنند بتوانند از تکامل سالم کودک حمایت کنند.

جهت مشاوره دادن برای کارهایی که یک مادر می تواند با کودکش انجام دهد به توصیه های ذکر شده در جدول زیر مراجعه کنید:

توصیه ها بی برای مراقبت از تکامل کودک					
۲ سال و بزرگتر	۱۲ ماه تا ۲ سال	۹ ماه تا ۱۲ ماه	۶ ماه تا ۹ ماه	۱ هفته تا ۶ ماه	نوزاد تولد تا یک هفتگی
 <p>بازی به کودک خود کمک کنید تا اشیا را بشمارد، نام ببرد و مقایسه کند. برای او اسباب بازی ههای ساده بسازید. مثلاً اشیایی با رنگ ها و شکل های متفاوت برای دسته بندی، بر چسب یا تخته وایت برد و پازل.</p>  <p>ارتباط برقرار کنید او را تشویق کنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهید. به کودکستان داستان، آواز و بازی یاد بدهید. در مورد تصاویر یا کتاب ها با او صحبت کنید. نمونه اسباب بازی: کتاب مصور</p>	 <p>بازی چیزهایی به کودک بدهید تا روی هم بچیند و داخل ظرف بیندازد و در بیاورد.</p> <p>نمونه اسباب بازی: اشیایی که داخل هم یا روی هم می گذارند، ظرف و گیره های لباس.</p>  <p>ارتباط برقرار کنید سوالات ساده از کودک بپرسید. به تلاش های کودک خود در صحبت کردن جواب بدهید. اشیا، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهید و درباره آن ها با او صحبت کنید.</p>	 <p>بازی اسباب بازی مورد علاقه کودک را زیر پارچه یا جعبه پنهان کنید. ببینید آیا کودک می تواند آن را پیدا کند. با کودک خود دالی موشه بازی کنید.</p>  <p>ارتباط برقرار کنید نام اشیا و افراد را به کودک بگویید. به او یاد بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بای بگوید. نمونه اسباب بازی: عروسکی با صورت</p>	 <p>بازی وسایل خانگی تمیز و بی خطری را به کودک خود بدهید تا دستکاری کند، به هم بزند و بیندازد (مانند ظروف درب دار، قابلمه و قاشق فلزی)</p>  <p>ارتباط برقرار کنید به صدا و علائق کودک خود پاسخ دهید. نام کودک را صدا کنید و پاسخ او را ببینید.</p>	 <p>بازی فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا کودک شما ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیا رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آنرا ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جفجغه)</p>  <p>ارتباط برقرار کنید به کودک خود لبخند بزنید و بخندید. با کودک خود صحبت کنید. با تقلید صدا یا ژست کودکستان با او مکالمه کنید.</p>	 <p>بازی فرصت هایی را برای نوزاد خود فراهم کنید تا کودک شما ببیند، بشنود و دست و پای خود را آزادانه حرکت دهد.</p>  <p>ارتباط برقرار کنید به چشمان کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید. زمان تغذیه با شیر مادر فرصت خوبی است. حتی یک نوزاد هم صورت شما را می بیند و صدایتان را می شنود</p>
<p>• تلاش کودکستان را در یادگیری مهارت های جدید تحسین کنید.</p>		<p>• از علائق کودک خود مطلع شوید و به آن ها پاسخ دهید</p>		<p>• به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به او نشان دهید</p>	

نوزاد تا یک هفتگی:

با کودک خود بازی کنید: زمینه ای فراهم کنید تا کودک شما بتواند ببیند، بشنود، احساس کند و حرکت کند. برای بازی کردن با یک نوزاد بهتر است او را از هر گونه لباس رها کرده و صورتش را باز کنید، این امر آزادی عمل بیشتری را به کودک می دهد.

با کودک خود ارتباط برقرار کنید: به چشم هایش نگاه کنید و به رویش بخندید. زمان شیر دادن بهترین موقع برای این کار است.

تا ۶ ماهگی:

با کودک خود بازی کنید: اشیای بزرگ و رنگی را در دسترس کودک خود قرار دهید تا هم بتواند به آن ها برسد و هم اشیای جدید را ببیند.

با کودک خود ارتباط برقرار کنید: با کودک خود صحبت کنید و مکالمه خود را با صداها و حرکات دست ادامه دهید.

۶ ماهگی تا دوازده ماهگی:

با کودک خود بازی کنید: به کودک خود اشیای خانگی مطمئن بهداشتی بدهید تا بتواند ننگه دارد، بکوبد و بیاندازد.

با کودک خود ارتباط برقرار کنید: به علایق و صداها ی کودک خود پاسخ دهید. نام اشیا و افراد را به کودک خود بگویید.

۱۲ ماهگی تا ۲ سالگی:

با کودک خود بازی کنید: اشیایی را در اختیار کودک خود قرار دهید تا بر روی هم بگذارد و یا در داخل قوطی گذاشته و یا خارج کند.

با کودک خود ارتباط برقرار کنید: از کودک خود سوالات ساده بپرسید. به تلاش های کودک خود جهت صحبت کردن پاسخ دهید. بازی هایی مانند (بای بای) را انجام دهید.

کودک ۲ ساله و بزرگتر:

با کودک خود بازی کنید: به کودک خود کمک کنید تا بشمارد، بنامد و اشیا را مقایسه کند. اسباب بازی های ساده ای برای کودک خود تهیه کنید. بعنوان مثال کودک شما از جدا و مرتب کردن سر بطری های رنگی لذت خواهد برد.

با کودک خود ارتباط برقرار کنید: کودک خود را تشویق به صحبت کردن کنید و به سوالاتش پاسخ دهید. به کودک خود بازی، آواز و قصه بیاموزید. وقتی به یک مادر مشاوره می دهید نمونه هایی از ارتباط و بازی را که مناسب سن کودک می باشند به او نشان دهید. همچنین نمونه هایی از وسایلی که می توان با آن ها بازی کرد و معمولا در همه خانه ها موجود می باشد را به مادر پیشنهاد دهید. به مادر در فهم اینکه چگونه می تواند کودک خود را همزمان با رشدش در یاد گرفتن مهارت های جدید تشویق کند کمک کنید. یک کودک یک و نیم ساله علاقمند گذاشتن سنگ ها در داخل قوطی است. همچنین می تواند یاد بگیرد اعضای صورتش را نشان دهد. یک کودک ۴ ساله می تواند قطعات پازل یک صورت را بدرستی کنار هم بگذارد.

در اینجا چند مثال از اسباب بازی ساده ساخته شده در خانه، آورده شده است:



رابطه متقابل کودک و والدین

وزن مغز کودک در طی سال اول زندگی دو برابر می شود. این افزایش وزن تا حدودی ناشی از افزایش تعداد سلولهای مغزی و تا حدودی به دلیل رشد " اتصالات " بین سلولها و قسمت‌های مختلف مغز است. بدون این اتصالات ماقادربه فکر کردن نخواهیم بود و یادگیری نیز از طریق این اتصالات شروع می شود. این اتصالات در نوزاد هنگامی که وی به چیزی علاقمندی شود و تلاش ذهنی می کند، شروع به تشکیل یک شبکه می کنند. هنگام تحریک هر یک از حواس کودک، همین کار انجام می گیرد. بنابراین از بدو تولد، هر صدا، تصویر، تماس، احساس، بو و مزه موجب ساخته شدن اتصالات بیشتری می شود.

ایجاد درک عمومی مستلزم کنار هم قرار گرفتن قسمت‌های متعددی است. برای پیشرفت رشد ذهنی بایستی بینایی، شنوایی، حافظه و مهارت‌های حرکتی با هم پیش بروند. قوای عقلی کودک برای درک اینکه در اطراف او چه می گذرد وابسته به حواس و حرکات بدن می باشد. به عنوان نمونه، بدون بینایی کودک نمی تواند یک اسباب بازی را ببیند. بدون حافظه، اسباب بازی مورد علاقه اش او را هیجان زده نمی کند. بدون گرفتن و بازی کردن با اسباب بازی، کودک نمی تواند تصویری از آن اسباب بازی داشته باشد.

همگام با افزایش درک عمومی، بسیاری از مهارت‌های مغزی و بدنی به سرعت رشد می کنند و توسعه می یابند. عوامل تعیین کننده در این زمینه عبارت اند از اجتماعی بودن و شخصیت کودک، و محیطی که شما برای او ایجاد می کنید. شما می توانید با فراهم آوردن محرک‌های بیان شده در هر بخش از نمودار، به رشد و توسعه مغز کودک خود کمک کنید. انجام این کار بخصوص در سال اول زندگی، و بار دیگر در سال سوم، که در هر دو مورد مغز جهش‌های رشدی عمده ای را به عمل می آورد، حائز اهمیت است.

کلیه کودکانی را که برای وضعیت تکامل کنترل کرده اید و مشکل تکاملی ندارد، با توجه به سن شان با مادر در مورد ارتباط با کودک آموزش مناسب را بدهید.

توصیه ها برای سن ۲ ماهگی

برقراری ارتباط عاطفی

کودک روی شما تمرکز حاصل می کند، بنابراین تا حد امکان با حالت زنده صورت خود و حفظ تماس چشمی به او کمک کنید. (۶ هفتگی)

برای جلب توجه کودک، انگشتان خود یا اسباب بازیها را به حوزه دید او وارد و خارج کنید. بطور متناوب در دو طرف صورت او صحبت کنید. (۶ هفتگی)

حواس او را تحریک کنید

با کودک صحبت کنید و برایش آواز بخوانید، او را در آغوش بگیرید و آرام حرکت دهید، اشیاء را از فاصله کاملا نزدیک صورتش به او نشان دهید طوری که آنها را ببیند. کودک شما حرکات صحبت کردن را می فهمد و دهانش را به تقلید از تکلم باز بسته می کند. او رفتارش را با آهنگ صدای شما تطبیق می دهد، اگر با آرامش صحبت کنید ساکت می شود و اگر صدای خشن یا بلند استفاده کنید، مضطرب می شود. (نوزادی)

علاقه کودک به فعالیتهای موزون را با صحبت کردن به شیوه آهنگین ارضا کنید. لالایی بخوانید، زیاد بخندید. تماس جسمانی داشته باشید. او را به خوبی در آغوش بگیرید و آرام حرکت دهید، تاب دهید، و بچرخانید. از سندی یا گهواره از نوعی که می توان کودک را تاب داد استفاده کنید. (۴ هفتگی)

با صدای آهنگین با کودک صحبت کنید، برایش لالایی بخوانید، و در حالی که در آغوشتان است حرکت کنید و او را آرام تکان و تاب دهید. وقتی با کودک تان صحبت می کنید به شمال بچند کوتاهی می زند و سرش را تکان می دهد. هنگامی که با او صحبت می کنید صداهای کوتاه و حلقی از خود در می آورد. (۶ هفتگی)

علاقه او را ببیدار کنید: هنگام حرف زدن تماس چشمی خود را با کودک حفظ کنید و قیافه جالب توجهی به خود بگیرید؛ از طرف صورت کودک با او حرف بزنید تا صداهار از جهت مختلف بشنود. (۶ هفتگی)

اکنون کودک شما به راحتی و مکرر لبخند می زند. او با نگاه کردن در جهت صداهای و حرکات، به محیط اطراف خود توجه نشان می دهد و به اشیای مختلف خیره می شود، چنانکه گویی می خواهد آنها را با چشم بگیرد. (۶ هفتگی)

بازتاب چنگ زدن

اجازه دهید انگشتان شما را بگیرد و برای تشویق به شل کردن انگشتان، یکی یکی آنها را باز کنید

اجازه دهید با اشیاء بازی، دما و جنس های مختلف را لمس کند

تقویت عضلات پشت و گردن

روزی ۲ تا ۳ بار او را طوری نگه دارید که صورتش رو به پایین باشد (در وضعیت دمر) و در حالی که به پشت خوابیده است، شی رنگی را در میدان دیدش حرکت دهید تا به حرکت کردن سر خود تشویق شود

توصیه ها برای سنین ۳-۴ ماهگی

پاسخ های اغراق آمیز

با واکنشی نمایشی و اغراق آمیز به تمام رفتارهای کودک خود پاسخ دهید. (۱۲ هفتگی)

شعرهای کودکانه را با آدا و اطوار برای او بخوانید. (۱۲ هفتگی)

از بازیهای جسمانی ساده مانند تکانهای ملایم، خم کردن زانو، کشیدن دست و غلغلک دادن پاها، استفاده کنید.

اسباب بازیهای کوچک و محکمی با وزنهای مختلف و جنسهای مختلف به او بدهید که بتواند آنها را بگیرد، دستکاری و لمس کند. (۱۲ هفتگی)

شادی خود را به او نشان دهید: تمام رفتارهای کودک خود را، اعم از حرکات، ژستها، و ابراز احساساتی که نشان می دهد، با حرکاتی اغراق آمیز که نشان دهنده خوشحالی تان باشد، پاداش دهید. (۱۲ هفتگی)

برای اینکه کودک بیاموزد که به خواستههایش پاسخ داده می شود و شما منبع کمک و آسایش برای او هستید، هنگامی که سعی می کند توجهتان را جلب کند، با صدا، چرخاندن بدن تان، ایجاد ارتباط چشمی، و حرکت کردن به طرف او، پاسخ دهید. (۲۰ هفتگی)

تحریک کنجکاو

کنجکاو کودک شما آشکار است. او به اسباب بازیهای جدید، مکانهای جدید، افراد جدید و حسهای جدید علاقه مند است. او همچنین اشیاء و مکانهای آشنا را می شناسد و کارهای همیشگی را درک می کند. او با دیدن سینه مادر هیجان زده می شود. کم کم نوعی حس شوخ طبعی از خود نشان می دهد. دوست دارد در حالت تکیه کرده به اطراف خود نگاه کند. (۱۶ هفتگی)

کنجکاو او را ارضاء کنید: با صحبت کردن با کودک در مورد آنچه می بینید و انجام می دهید، به آنچه می بیند و احساس می کند عمق و غنا ببخشید. تا آنجاکه می توانید در مورد هر شیء یا فعالیت با جزئیات بیشتری صحبت کنید. (۱۶ هفتگی)

کودک شمای بازی کردن، از جمله آب بازی در حمام را دوست دارد. افزایش تمرکز خود را با صرف وقت بیشتر جهت بررسی اشیاء نشان می دهد. او در آینده به خود لبخند می زند، سرش را به طرف صدامی گرداند، و دست و پایش را برای جلب توجه تکان می دهد. (۲۰ هفتگی)

اشیای متناسب

یک جغغه در دستان کودک بگذارید و چند بار آنرا تکان دهید و همچنین اشیاء متفاوتی را به او نشان دهید تا دستش را به طرف آن دراز کند بدین ترتیب به او کمک می کنید که مهارت های دست کودک تقویت گردد (۱۶ هفتگی)

تقویت عضلات تنه و پشت

کودک را به پشت بخوابانید و با گرفتن دست ها و آرام به حالت نشسته بلند کنید و همچنین طوری در یک طرف کودک قرار گیرید که او مجبور باشد برای یافتن شما، تنه خود را بچرخاند و باعث تقویت عضلات تنه و پشت گردد

(۱۶ هفتگی)

توصیه ها برای سنین ۴/۵ تا ۶ ماهگی

تشویق حرکات جدید

همه مهمانان را به کودک تان معرفی کنید.

برای اینکه کودک بیاموزد که به خواسته هایش پاسخ داده می شود و شما منبع کمک و آسایش برای او هستید، هنگامی که سعی می کند توجهتان را جلب کند، با صدا، چرخاندن بدن تان، ایجاد ارتباط چشمی و حرکت کردن به طرف او، پاسخ دهید. (۲۰ هفتگی)

دالی کردن بازی است که کودک از آنها لذت می برد. تاملی توانید همراه با کودک تان بخندید. (۲۰ هفتگی)

کودک شما با ایجاد صداهای مختلف سعی در جلب توجه می کند. وقتی صدای پای کسی را می شنود هیجان زده می شود، و دستانش را برای اینکه بغلش کنید بلند می کند. او با تصویر خود در آینه صحبت می کند و به آن لبخند می زند، و باد هانش حساب تولید می کند. کم کم از غریبه ها خجالت می کشد، ممکن است از خود ترس نشان دهد. (۲۴ هفتگی)

تحریک حس خود آگاهی

تاملی توانید او را به اسم صدا کنید. (۲۸ هفتگی)

تصویر کودک تان را در آینه به او نشان دهید و اسم او را صدا کنید تا تصویری از خود به دست آورد. تاکید کنید که “اون تویی، اون ...” برای نشان دادن پاسخ منفی بگویید؛ نه؛ (۲۸ هفتگی)

تمرین دادن و گرفتن

برای اینکه به او کمک کنید اراده ایجاد و تغییر چیزها را به دست آورد، کارهای مختلف و نتایج آنها را نمایش دهید. به عنوان مثال، توپ را رها کنید و به او بگویید که توپ می غلتد. (۲۴ هفتگی)

بازی بده بستانی را با او انجام دهید. (۲۴ هفتگی)

به جلب توجه او پاسخ دهید: وقتی کودک شما نشان می دهد که شمارامی خواهد باغوش باز به سوی او بر رویید، اسم او را صدا بزنید و کاری کنید که بداند دارید می آید. (۲۴ هفتگی)

کودک شما شروع به مکالمه کرده است و صداهای قابل فهم زیادی را از او خواهید شنید. او نام خود را می داند. دستش را برای اینکه بغلش کنید دراز می کند. و استقلال خود را تلاش برای اینکه خودش غذا بخورد نشان می دهد. و شروع به تقلید کارهای ساده کرده است و هر کاری را می بیند منتظر می ماند تا تکرار شود. (۲۸ هفتگی)

توصیه ها برای سنین ۷ تا ۹ ماهگی

محبت جسمانی زیاد

در هر فرصتی کودک را لمس و او نیز شمارا لمس کند.

صداهای او را تقلید کنید سپس صدای جدید درآورد و صبر کنید تا پاسخ دهد.

تحریک حس استقلال

تمام صداهایی را که کودک شما در می آورد، مثل با دا کا تکرار کنید. (۲۸ هفتگی)

با غذاهایی که با انگشت می توان خورد، کودک را به غذا خوردن مستقل تشویق کنید. (۲۸ هفتگی)

حس خود آگاهی او را تقویت کنید: تصویر کودکتان را در آینه به او نشان دهید. به تصویر اشاره کنید و نام او را با صدای بلند به زبان آورید. نام او را هر قدر که ممکن است صدا بزنید. (۲۸ هفتگی)

کودک شما شروع به درک معنی کلمات کرده است. می داند؛ نه؛ یعنی چه. او نشانه هایی دال بر حس اراده و تصمیم از خود نشان می دهد، مثلا به طرف اسباب بازی هایی که خارج از دسترس است می رود. کودک شما علاقه زیادی به بازی دارد و عمیقا روی اسباب بازیهایش تمرکز حاصل می کند و به دنبال اسباب بازی که انداخته است می گردد.

(۳۲ هفتگی)

زیاد با آب بازی کنید. به او ظروفی بدهید تا در آنها آب بریزد و آنها را پر و خالی کند. (۳۲ هفتگی)

اسباب بازیهایش را کمی خارج از دسترس او قرار دهید و هر موقع آنها را خواست در اختیارش بگذارید. (۳۲ هفتگی)

بازیهای زیادی که با بدن انجام می شوند (مثل دس دسی) را به او یاد دهید. (۳۲ هفتگی)

بگذارید خودش غذا بخورد تا حس استقلال او تقویت شود. (۳۲ هفتگی)

بسیاری از لوازم خانه و نیز اسباب بازیهایی را که مخصوص آب بازی ساخته شده اند، می توان برای بازیهای داخل حمام به کاربرد. (۳۲ هفتگی)

کودک شما بازیها و شعرهای آشنا را می شناسد و در قسمتهای مناسب می خندد و می تواند حرکات را پیش بینی کند. وقتی اسمش را صدای زنی در سرش را برمی گرداند، دستهایش را دراز می کند تا شسته شود. ولی از لایف حمام روی برمی گرداند. (۳۶ هفتگی)

کارهای روزمره را با تاکید برای کودک جابیندازید، به طوری که مفهوم زندگی را بر اساس فعالیتهای روزمره درک کند. کارهایی را که می کنید توضیح دهید، مثلا وقت ناهار است. اول پیشبندت را می بندیم، بعد توکنار سفره (روی صندلی ات) می نشینی، آن وقت مامان غذایت را می آورد، به به به، چه غذای خوبی... (۳۶ هفتگی)

به صدا درآوردن اشیاء

اسباب بازیهای با صداهای مختلف یا اجازه دهید کودکتان با وسایلی بی خطر آشپزخانه بازی کند. (۳۲ هفتگی)

آمادگی برای حرکت کردن

کمی دورتر از کودک بنشینید و دستان خود را به طرف او باز کنید با صدای نامش و نشان دادن اشیاء مورد علاقه اش او را تشویق به حرکت کنید و همچنین می توانید با قلاب کردن دستهای او به ائاثیه ثابت منزل او را به ایستادن تشویق کنید

(۳۶ هفتگی)

توصیه ها برای سنین ۹ تا ۱۲ ماهگی

تحریک قوه تمرکز و تقلید

کارهای روزمره را شرح دهید: از زمان غذا خوردن، حمام کردن، و خوابیدن برای توضیح کارهای روزمره به کودک کتان استفاده کنید، تا بر اساس کارهای روزمره بازی آشنا شود. (۳۶ هفتگی)

کودک شما در حال آشناسدن با کارهای روزمره است - مثلا تکان دادن دست برای خدا حافظی، و جلو آوردن پایش برای جوراب پوشیدن. او می داند که عروسک چیست و آن را نوازش می کند او بعضی اشعار کودکانه را می شناسد. به دنبال اسباب بازی اش گوشه و کنار را می گردد. اگر پرسید - بابا کجاست؟ - به دنبال پدرش می گردد. (۴۰ هفتگی)

اسباب بازیهایی که صداتولید می کنند، بوق و زنگوله در اختیار او بگذارید بازیهای انداختن و برداشتن اشیاء، قایم باشک با اسباب بازی (برای تقویت حافظه او) و دالی بازی را انجام دهید. (۴۰ هفتگی)

گذاشتن اشیاء در داخل ظروف و خارج کردن آنها را به او نشان دهید. (۴۰ هفتگی)

کم کم با هم کتاب تماشا کنید: کتابهای کودکانه با جلد نرم با تصاویر خوش رنگ و بزرگ انتخاب کنید و هر روز وقت آرامی را مثل خواب، برای مطالعه کردن در نظر بگیرید. (۴۰ هفتگی)

کودک شما می تواند یک کلمه قابل فهم به زبان بیاموزد. او ممکن است چیزهایی را در کتابها به شما نشان دهد ولی مدت زیادی تمرکز حاصل نمی کند. او دائما اسباب بازیهایش را از کالسه که به بیرون پرت می کند، دنبال آنها می گردد و می خواهد که آنها را بردارد. او به تدریج مفهوم داخل و خارج، اینجا و آنجا را می فهمد. (۴۴ هفتگی)

کتابها و مجلات مختلف را برایش بخوانید سعی کنید میزان تمرکز او را با تعریف کردن یک قصه ساده و کوتاه در مورد چیزی که به آن نگاه می کنید، افزایش دهید. (۴۴ هفتگی)

بازی دس دسی را انجام دهید و به او یاد دهید چگونه دست بزند. دائما رابطه علت و معلول را به او نشان دهید. ستونی از مکعبها را با او آزمون کنید و بگویید "همشون می افتند" (۴۴ هفتگی)

به اشکال و اشیاء اشاره کنید: چند شکل موجود در یک صفحه کتاب یا مجله را نام ببرید. دست کودک خود را بگیرد، به اشیاء مختلف اشاره کنید، آنها را نام ببرید و تکرار کنید. (۴۴ هفتگی)

کودک شما علاقه شدیدی به کتابها و چیزهایی که در صفحات آنهاست دارد و دوست دارد به شکلهای موجود در آنها اشاره شود. او نام خود را تکرار می کند. او عاشق شوخی است و به خاطر خنده حاضر است هر کاری مثل تکرار حقه هایی که شما را می خندانند، انجام دهد. او بلد است با تکان دادن سر خود، نه بگوید. (۴۸ هفتگی)

روی نام اشیاء و قسمتهای بدن تمرکز کنید. آنها را بارها تکرار کنید. کارهایی انجام دهید که کودک شما بتواند تقلید کند. تمامی حرکات و واکنشهای او را با صدای او یادش دهید. (۴۸ هفتگی)

داستانهایی برای ایجاد صحنه ها و خلق سناریوهای مختلف تعریف کنید تا کودک باندنیای خودش ارتباط برقرار کند.
کمک کنید از شما تقلید کند: به بینی خود اشاره کنید و بگویید؛ این دماغ مامانه؛ انگشت او را بگیرید و با آن به بینی او اشاره کنید و بگویید؛ این دماغ محسن است. (۴۸ هفتگی)

تمرین رها کردن اشیاء

یک عروسک نرم شبیه بچه به او بدهید و نحوه پوشاندن لباس به آن و در آوردن لباس را به او نشان دهید.

بازی های بده بستانی را انجام دهید. (۴۰ هفتگی)

برای اینکه به او کمک کنید اراده ایجاد و تغییر چیزها را به دست آورد، کارهای مختلف و نتایج آنها را نمایش دهید. به عنوان مثال ، توپ را هل بدهید و به او بگویید که توپ می غلتد. (۴۰ هفتگی)

آمادگی برای راه رفتن (۴۰ هفتگی)

برای آمادگی برای راه رفتن کودک توصیه های زیر را انجام دهید.

- در حالت چهار دست و پا تشویق کنید که مسافتهای کوتاهی را طی کند
- انگشتان خود را به کودک نشان دهید تا بتواند خود را بالا بکشد
- در حالی که فقط یک دست او را گرفته اید با شامبه تمرین قدم زدن بپردازد

توصیه ها برای سنین ۱۲ تا ۱۵ ماهگی

شرکت در فعالیت ها

کودک شما بوسیدن را خوب می فهمد و داند مجموعه در حال گسترشی از احساسهای مختلف را به نمایش می گذارد. او می تواند عروسک را بلند کند، آن را به شما بدهد. و رهاش کند. او دوباره کلمه با معنی به زبان می آورد. ممکن است چیزی را در کتاب بشناسد و به آن اشاره کند. او شروع به فهم پرسشهای ساده کرده است. (۱۲ ماهگی)

داستانهای ساده بخوانید: داستانهای مربوط به حیوانات مادر و توله هایشان برای کودکان لذت بخش است و به آنها کمک می کند با صداهای جانوران آشنا شوند. (۱۲ ماهگی)

کودک نوپای شما اجزای بدن خود و برخی چیزهای داخل کتاب را می شناسد. می تواند صدای حیوانات را در آورد و اگر از او خواسته شود سعی می کند لباسهایش را در آورد. او اشیاء ساده را حمل می کند و برای شما می آورد. او مفهوم گربه بودن را درک کرده است، یعنی می داند که عکس گربه، گربه اسباب بازی و گربه واقعی، همگی گربه اند. (۱۵ ماهگی)

تحریک قوه تخیل

برای تحریک قوه تخیل و تشکیل مفاهیم انتزاعی در ذهن کودک ، شروع به خواندن داستانهای کوتاه برای او کنید.

ابراز محبت او را تشویق کنید، از او بخواهید عروسک را نوازش کند ماما را بوسه دهد و با رادراغوش بگیرد. کارهای خود را همراه بانسان دادن به او شرح دهید. مثل به پاک کردن جورابهایش و در آوردن کاپشن اش. (۱۲ ماهگی)

تمرین روی هم چیدن اشیاء (۱۵ ماهگی)

برای توانمندی بیشتر مهارت های دست ها توصیه های زیر را انجام دهید

- اورا برای رویهم چیدن اشیاء تمرین دهید
- یک مداد شمعی و کاغذ برای خط خطی کردن در اختیار وی بگذارید
- کتاب با اوراق ضخیم به او بدهید و به او نشان دهید چگونه آنها را ورق بزند
- گاهی غذاهای نیمه جامد که به قاشق می چسبند را بگذارید تا به تنهایی بخورد.

آمادگی برای بالارفتن از پله

سرپایستادن رابه او تمرین بدهید و همچنین صندلی محکمی برای نشستن و پایین آمدن از آن به تنهایی برای او فراهم آورید.
(۱۳ ماهگی)

توصیه ها برای سنین ۱۵ تا ۱۸ ماهگی

تحسین به اظهار محبت

وظایف کوچک و ساده ای را برای تحریک ماجراجویی و حس کامیابی به او محول کنید. او را تشویق کنید تا در انجام کارهای کوچک روزانه مثل مرتب کردن و گذاشتن وسایل در جایشان، به شما کمک کند. (۱۵ ماهگی)

به او کمک کنید تا با کنار هم گذاشتن سه یا چهار کلمه جملات ساده ای بسازد. مفهوم مالکیت رابه او بیانشانید، مثل ؛ اون توپ مجیده، اون توپ مال توئه. (۱۵ ماهگی)

در او احساس موفقیت ایجاد کنید: اجازه دهید تا جایی که می تواند به شما کمک کند. وظایف ساده ای مثل مرتب کردن کاملاً در حد توانایی کودک شما هست و احساس غرور او را تقویت می کند. (۱۵ ماهگی)

تحریک قوه حافظه

کودک نوپای شما چند شکل روی یک صفحه را تشخیص می دهد و اگر نام آنها را ببرد به آنها اشاره می کند. ممکن است تلاش کند برخی از کارهای کوچک را انجام دهد، سعی می کند کارهای شمارا تقلید کند. او می تواند درخواستهایی را که نیازمند استفاده از حافظه است، انجام دهد مثلاً بروخرس عروسکی ات را برابیم بیاور. (۱۸ ماهگی)

تمرین حرکات چرخشی

وسایل مختلفی همچون دستگیره، شماره گیر، زیپ، دکمه فشاری دوخته شده در اختیار او بگذارید که حرکات چرخاندن، پیچاندن، شماره گرفتن و لغزاندن را برای توانمندی بیشتر مهارت های دست ها انجام دهد. (۱۸ ماهگی)

تقویت عضلات باسن و زانو

او را وادار کنید عقب عقب رفتن را تمرین کند. (۱۸ ماهگی)

نشان دهید چگونه چمباتمه بزند. (۱۸ ماهگی)

باتوپ بازی آرام، او را به لگزدن به توپ تمرین دهید. (۱۸ ماهگی)

توصیه ها برای سنین ۱۸ تا ۲۴ ماهگی

ایجاد زمینه ارتباط و مشارکت

خصوصیات همه چیز را شرح دهید؛ مثلاً پرنده و هواپیما پرواز می کند، ماشین؛ فان می کند؛ چسب چسبنده است، پنبه نرم است، توپ گرد است و می غلتد، آجرهای اسباب بازی گوشه دارند و نمی غلتند. (۱۸ ماهگی)

رنگ تمام اشیاء را بگویید. او را با مفاهیم متضاد مانند زبر و نرم آشنا کنید. شروع به استفاده از اعداد کنید. ابتدا با انگشتان خود نشان دهید و سپس از انگشتان کودکتان استفاده کنید. (۱۸ ماهگی)

تحریک قوه ادراک و هوش

رشد زبانی بستگی به حافظه و ادراک دارد. یادگیری او را از طریق تکرار تشویق کنید و در وضعیت‌های مختلف از ابتدا تا انتها با او صحبت کنید؛ حالا اون کجاست؟ در حمام. بله اینجا است. برش دار. (۱۸ ماهگی)

او را با ضمیر ملکی آشنا کنید؛ دستمو بگیر، دستتو بده؛ (۱۸ ماهگی)

کودک خود را با استفاده از یک تابلو شکل ساده با شکل‌ها آشنا کنید. (۱۸ ماهگی)

خواص اشیاء را شرح دهید: هنگامی که چیزی را به کودکتان نشان می دهید، به او بگویید، اگر صدای آن را در آورد، و غیره

گنجینه لغات نام‌ها و اشیاء در ذهن کودک شما به سرعت در حال افزایش است. او می تواند خصوصیات اشیای آشنا را شرح دهد و آن‌ها را شناسایی کند. او می تواند فرمان‌های پیچیده را اجرا کند و می تواند چیزی را که قبلاً با آن بازی کرده است، پیدا کند. او بدون وقفه صحبت و گاهی پرسش می کند. (۲۴ ماهگی)

تمرین لباس پوشیدن

اجازه دهید کودکتان لباس‌هایش را تا آنجا که ممکن است خودش بپوشد و در آورد. (۲۴ ماهگی)

با استفاده از اسباب بازی که قطعاتش (ساختمان سازی) با هم جفت می شود برای او تمرین فراهم آورید. (۲۴ ماهگی)

تمرین تحمل وزن بدن

اجازه دهید کارهای مثل بالا رفتن پله‌ها، شستن صورت و... را همراه شما انجام دهد. (۲۱ ماهگی)

انتظار نداشته باشید به راحتی دورکنج‌ها بدود یا توقف کند. (۲۴ ماهگی)

توانمندی‌های تکاملی قابل انتظار در کودکان ۶ هفته تا ۵ ساله (WHO)

سن	حرکات درشت	حرکات ظریف	سخن و زبان	مهارت‌های تطبیقی و اجتماعی
۶ هفته	گه‌گاه چانه‌اش را به حال خوابیده روی شکم بلند می‌کند			
۲ ماه	بازوها را در حال خوابیده روی شکم به جلو می‌کشد	پارچه‌ها را می‌کشد	صدایی شبیه کو از خود درمی‌آورد	
۴ ماه	سر و سینه را در حال خوابیده روی شکم بالا می‌آورد، به جلو و عقب می‌غلطد، سرش عقب نمی‌ماند	به سوی اشیاء دست دراز می‌کند، آن‌ها را می‌قاپد و در دهان می‌گذارد	به صدا پاسخ می‌دهد	
۶ ماه	در حال خوابیده روی شکم روی دست‌ها بلند می‌شود، با سه تکیه‌گاه می‌نشیند	با ساعد اشیاء را می‌گیرد	شروع به درآوردن صداهای نامفهوم می‌کند، به نام‌ها پاسخ می‌دهد	دچار اضطراب غریبگی می‌شود
۹ ماه	تلاش می‌کند که بایستد	اشیاء را به کمک شست و انگشتان دیگر می‌گیرد	ماما، بابا، واژه‌ها را تقلید می‌کند	بازی می‌کند، دچار اضطراب جدایی می‌شود
۱۲ ماه	با کمک راه می‌رود، "دور شدن‌ها"	گرفتن اشیاء با دو انگشت، پرت کردن اشیاء	۲ واژه معنی‌دار به جز ماما و بابا	بازی قایم باشک می‌کند، با فنجان آب می‌نوشد
۱۵ ماه	بدون کمک راه می‌رود	خط می‌کشد	برخی واژه‌های من‌درآودی	به نیازهایش اشاره می‌کند
۱۸ ماه	با کمک از پله بالا می‌رود	سه مکعب را روی هم می‌گذارد، خطوط کج و کوله می‌کشد	۱۰ واژه، فرامین ساده را اجرا می‌کند	از قاشق استفاده می‌کند، به بخش‌های بدن اشاره می‌کند
۲۴ ماه	۲ پایی از پله‌ها بالا می‌رود، می‌دود، به توپ لگد می‌زند	۶ مکعب را روی هم می‌گذارد، لباس‌هایش را درمی‌آورد	عبارات ۲ تا ۳ کلمه‌ای، از من، مرا و تو استفاده می‌کند، ۲۵٪ حرف‌هایش مفهوم است	بازی دونفره، کمک می‌کند لباس‌هایش را درآوریم
۳ سال	سه چرخه، ۱ پایی از پله بالا می‌رود، ۲ پایی از پله پایین می‌آید، روی یک پا می‌ایستد، می‌پرد	دایره و علامت اضافه را کپی می‌کند، کفش‌هایش را می‌پوشد	حروف اضافه، جمع‌ها، ۷۵٪ حرف‌هایش مفهوم است، جنس و سن را می‌شناسد	لباس‌هایش را (به جز دکمه‌ها) کاملاً می‌پوشد و درمی‌آورد، تا ۱۰ می‌شمرد
۴ سال	روی ۱ پا می‌پرد، ۱ پایی از پله‌ها پایین می‌آید	مربع را کپی می‌کند، از قیچی استفاده می‌کند	قصه می‌گوید، اشکالات طبیعی در روانی سخن، حرف‌هایش مفهوم است	در بازی همکاری می‌کند، توالی رفتن را یاد گرفته، دکمه‌های لباسش را می‌بندد
۵ سال	هنگام رفتن می‌تواند از بعضی موانع بپرد، دوچرخه‌سواری می‌کند	مثلث را کپی می‌کند، اسامی را تقلید می‌کند، بند کفش‌هایش را می‌بندد	روانی سخن گفتن، زمان آینده، الفبا	چهار رنگ را می‌شناسد

مشاوره با خانواده در مورد مشکلاتی که خانواده در مراقبت از تکامل کودک دارند

<p>اگر کودک پاسخ نمی‌دهد یا بنظر آهسته است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • خانواده را تشویق کنید تا با او بیشتر بازی و ارتباط بیشتری برقرار کنند. • بررسی کنید که آیا کودک قادر به دیدن و شنیدن است. • کودکان دارای مشکل را به مراکز خاص ارجاع دهید. • خانواده را تشویق کنید تا از طریق لمس و حرکان و همچنین از طریق زبان با کودک خود بازی کرده و ارتباط برقرار کنند. 	<p>اگر مادر شیر خودش را نمی‌دهد به مادر مشاوره دهید:</p> <p>موقع شیر دادن به کودک او را بغل کند، نگاهش کند، با او صحبت کرده یا برایش آواز بخواند.</p>
<p>اگر والدین مجبورند کودک را به مدت زمانی از روز به فرد دیگری بسپارند:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حداقل فردی را پیدا کنند که از کودک بطور مرتب مراقبت کرده، او را دوست داشته و به او توجه کند. • اجازه دهید کودک به تدریج با آن فرد عادت کند. • والدین را تشویق کنید تا در هر فرصت ممکن با کودک خود وقت بگذارند. 	<p>اگر مراقب نمی‌داند کودک چه بازی‌هایی می‌کند و یا چگونه ارتباط برقرار می‌کند:</p> <ul style="list-style-type: none"> • به آن‌ها یادآور شوید کودکان از موقع تولد بازی می‌ند و ارتباط برقرار می‌کند. • به مراقبین نشان دهید که کودک چگونه به فعالیت‌ها پاسخ می‌دهد.
<p>اگر به نظر می‌رسد رفتار با کودک خشونت‌آمیز است: راه‌های بهتری برای رفتار با کودک توصیه کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> • خانواده را تشویق کنید که دنبال فرصت‌هایی باشند تا کودکان را برای رفتارهای خوب تشویق کنند. • به احساسات کودک احترام بگذارند، سعی کنند علت غم و عصبانیت کودک را درک کنند. • به جای اینکه به کودک بگویند "نکن" به او انتخاب‌هایی برای آنچه که می‌تواند انجام دهد بدهند. 	<p>اگر مراقبین در بازی یا ارتباط با کودک تحت فشار یا استرس هستند:</p> <ul style="list-style-type: none"> • به احساسات مراقبین گوش کنید، به آن‌ها کمک کنید تا یک فرد کلیدی را پیدا کنند که بتوانند احساسات خود را با آن‌ها در میان بگذارند و در مورد کودکان به او کمک کنید. • با نشان دادن آن‌ها در انجام یک فعالیت ساده اعتماد به نفس آن‌ها را افزایش دهید. • اگر لازم باشد و امکان آن وجود داشته باشد او را به سرویس‌های محلی ارجاع دهید. <p>اگر مراقبین فکر می‌نند که آن‌ها وقتی برای بازی و ارتباط با کودکان ندارند:</p> <ul style="list-style-type: none"> • آن‌ها را تشویق کنید تا بازی و فعالیت‌های ارتباطی را با سایر مراقبت‌های کودک ادغام کنند. • از سایر اعضا خانواده بخواهید تا در مراقبت کودک و یا کارهای خانه کمک کنند. <p>اگر مراقبان اسباب‌بازی برای بازی با کودک ندارند، به آن‌ها مشاوره دهید تا:</p> <ul style="list-style-type: none"> • از هر وسیله‌ای که در منزل دارند و تمیز و بی‌خطر هستند، استفاده کنند. • اسباب بازی‌های ساده درست کنند. • با کودک بازی کنند. کودک هنگام بازی با مراقبین و سایر افراد یاد می‌گیرد.

راه‌کارهایی برای خانواده در مورد مشکلاتی که در مراقبت از تکامل کودک دارند

<p>اگر کودک شما پاسخ نمی‌دهد یا به‌نظر آهسته است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • با او بیشتر بازی کنید و ارتباط بیشتری برقرار کنید. • بررسی کنید که آیا کودک قادر به دیدن و شنیدن است. • اگر فکر می‌کند کودک‌کتان دارای مشکل است از کارمند بهداشتی کمک بگیرید. • از طریق لمس و حرکات و همچنین از طریق زبان با کودک خود بازی کنید و ارتباط برقرار کنید. 	<p>اگر شیر خودتان را نمی‌دهید:</p> <p>موقع شیر دادن به کودک او را بغل کنید، نگاهش کنید، با او صحبت کنید یا برایش آواز بخوانید.</p>
<p>اگر مجبورید کودک را به مدت زمانی از روز به فرد دیگری بسپارید:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حداقل فردی را پیدا کنید که از کودک بطور مرتب مراقبت کرده، او را دوست داشته و به او توجه کند. • اجازه دهید کودک به تدریج با آن فرد عادت کند. • در هر فرصت ممکن برای کودک خود وقت بگذارید. 	<p>اگر نمی‌دانید کودک چه بازی‌هایی می‌تواند انجام دهد و یا چگونه ارتباط برقرار کند:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بدانید کودک‌کتان از موقع تولد بازی می‌کند و ارتباط برقرار می‌کند. • کودک شما به فعالیت‌ها پاسخ می‌دهد. • اعتماد به نفس داشته باشید.
<p>با کودک با خشونت رفتار نکنید، راه‌های بهتری برای رفتار با کودک وجود دارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> • دنبال فرصت‌هایی باشید تا کودک‌کتان را برای رفتارهای خوب تشویق کنید. • به احساسات کودک احترام بگذارید، سعی کنید غم و عصبانیت کودک را درک کنید. • به جای اینکه به کودک بگویید "نکن" به او انتخاب‌هایی برای آنچه که می‌تواند انجام دهد بدهید. 	<p>اگر در بازی یا ارتباط با کودک تحت فشار یا استرس هستید:</p> <ul style="list-style-type: none"> • یک فرد کلیدی را پیدا کنید که بتوانید احساسات خود را با آن‌ها در میان بگذارید و در مورد کودک‌کتان به شما کمک کند. • شما می‌توانید فعالیت‌های ساده‌ای انجام دهید، اعتماد به نفس داشته باشید. <p>اگر فکر می‌کنید که وقتی برای بازی و ارتباط با کودک‌کتان ندارید:</p> <ul style="list-style-type: none"> • می‌توانید بازی و فعالیت‌های ارتباطی را با سایر مراقبت‌های کودک ادغام کنید. • از سایر اعضا خانواده بخواهید تا در مراقبت کودک و یا کارهای خانه کمک کنند. <p>اگر برای بازی با کودک اسباب‌بازی ندارید:</p> <ul style="list-style-type: none"> • می‌توانید از هر وسیله‌ای که در منزل دارید و تمیز و بی‌خطر هستند، استفاده کنید. • اسباب‌بازی‌های ساده درست کنید. • با کودک بازی کنید. کودک هنگام بازی با مراقبین و سایر افراد یاد می‌گیرد.

ابزارهای کمکی برای مشاوره با مادر

بخش مشاوره با مادر بوکت کودک سالم به شما کمک می‌کند مواردی که نیاز است با همه مادران مشاوره کنید را به ترتیب انجام دهید، ابزارهای دیگری مانند شناسنامه سلامت، کارت مادر، کارت مشاوره شیردهی و کارت‌های پیشگیری از حوادث و ارتقای تکامل کودکان نیز به شما کمک می‌کند تا مشاوره بهتری به مادر ارائه دهید.

پایش مراقبت کودک

هر کودکی باید یک کارت مراقبت داشته باشد. شناسنامه سلامت کودک وضعیت حال و گذشته کودک، اعم از وضعیت زمان تولد، غربالگری‌هایی که در بدو تولد برای کودک انجام شده است، جدول واکسیناسیون و زمان‌هایی که نیاز است واکسن دریافت کند، راهنمایی برای تغذیه تکمیلی و نمودارهای رشد کودک می‌باشد. این نمودارها وضعیت سلامت و دریافت غذای کودک را نشان می‌دهند. معیار دیگری که علاوه بر وزن می‌توانید استفاده کنید قد یا طول است. کودکی که به مدت طولانی خوب تغذیه نشده باشد، دچار تأخیر رشد قدی می‌شود، یا عبارتی نسبت به سن‌اش خیلی کوتاه می‌شود.

بچه‌های کوتاه‌تر نسبت به بچه‌های بلندتر هم سن خود، وزن کمتری دارند، از این رو خطوط نمودار رشد برای وزن‌شان با هم یکسان نخواهد بود که البته این تفاوت طبیعی است. نکته حائز اهمیت این است که منحنی رشد کودک سیر بالا رونده‌ای داشته باشد که نشان می‌دهد رشد کودک طبیعی بوده و در معرض خطر نمی‌باشد.

روش‌های تغذیه خوب قبل از ۶ ماهگی و همچنین بعد از شروع تغذیه تکمیلی، از تأخیر رشد شیرخوار از نظر وزن و قد و همچنین از وزن‌گیری بیش از حد پیشگیری می‌کند.



مرکز ملی بهداشت و تغذیه کودکان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


پایش مراقبت کودک دختر

در هر مراجعه به واحد بهداشتی درمانی / مطب / مرکز غربالگری کارت مراقبت کودک را به همراه داشته باشید.



نام و نام خانوادگی کودک:
تاریخ تولد: روز..... ماه..... سال.....
کد ملی کودک:
کد ملی سرپرست کودک:
مشخصات زمان تولد: وزن..... قد..... فورس.....
هفته بارداری هنگام زایمان:
تلفن تماس:
تاریخ مراجعه بعدی: روز..... ماه..... سال.....

- برای غربالگری پس از تولد، روز سوم تا پنجم به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه سلامت / خانه بهداشت محل زندگی خود مراجعه کنید.
- در سنین ۳ تا ۵ روزگی، ۲ هفتگی، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۲، ۳۶، ۴۰، ۴۴، ۴۸ ماهگی برای مراقبت کودک خود مراجعه کنید.
- شیرمادر هیچ جایگزینی ندارد. تا پایان ۶ ماهگی کودکان را فقط با شیرمادر تغذیه کنید و پس از آن مطابق توصیه‌های تغذیه‌ای، غذای کمکی را شروع کرده و شیرمادر را تا ۲ سالگی ادامه دهید.
- در سنین ۲، ۶، ۱۲، ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی برای واکسیناسیون کودک خود مراجعه کنید.
- به علائم هشدار دهنده تکامل کودک در سنین مختلف توجه کنید.
- به توصیه‌های مراقبت از تکامل کودک عمل کنید.
- پرسشنامه غربالگری تکامل ASQ را در سنین ۶، ۱۲، ۱۸، ۲۴، ۳۶ و ۴۰ ماهگی کودکان از پزشک / مراقب سلامت / بهورز دریافت کنید. بعد از تمرین مناسب با کودکان، به سوالات این پرسشنامه به دقت پاسخ دهید و سپس تحویل دهید.




این نمودار وزن برای دختران است. سن کودک در محور افقی و وزن او در محور عمودی ثبت می شود. پنج منحنی در این نمودار وجود دارد. خط منحنی صفر، میانه (median) است که در محاوره، میانگین (average) هم نامیده می شود. همچنین به آن منحنی پنجاهمین پرستایل هم گفته می شود، زیرا وزن ۵۰٪ کودکان سالم زیر این منحنی و ۵۰٪ هم بالای آن است. اکثر کودکان سالم، نزدیک این منحنی، کمی بالا تر یا پایین تر آن قرار می گیرند.


خطوط دیگر که Z Score نامیده می شوند، فاصله از میانگین را نشان می دهند . هر نقطه یا روندی که از خط میانه فاصله می گیرد ، مثل ۳- یا ۳ معمولاً بیانگر مشکل رشد کودک می باشند . منحنی رشد کودکان سالم معمولاً روندی موازی با خط میانه را طی می کند .

اگر منحنی وزن برای سن کودکی زیر منحنی Z Score -۲ (-۲ انحراف معیار) یعنی چهارمین منحنی از بالا باشد، کم وزن محسوب می شود. منحنی رشد کودکی که بطور طبیعی یا ژنتیکی کوچک است، ممکن است نزدیک این خط باشد، اما رشد خوبی داشته باشد . خط پایینی (یعنی -۳ انحراف معیار) ، وزن خیلی کم نسبت به سن یا کم وزنی شدید را نشان می دهد . کودکی که نمودار رشدش نزدیک این خط است احتمالاً سالم نبوده و نیاز به توجه دارد.

با یک بار ثبت وزن، اطلاعات زیادی بدست نخواهید آورد، بلکه باید الگوی نقاط علامت گذاری شده وزن روی نمودار را داشته باشید تا بتوانید در مورد روند رشد قضاوت کنید.




در اینجا نمودار رشد پسران را داریم . این تصویر منحنی های رشد سه کودک را که وزن گیری منظم داشته اند، نشان می دهد .



خطوط رشد در این نمودار وضعیت مشابهی با منحنی های استاندارد را نشان می دهد ، اما رشد هر کودک روند خاص خود را دارد. توجه داشته باشید که وزن تولد آنها از ابتدا متفاوت بوده است.

در تصویر زیر، نمودار رشد پسری را می بینید که وزن گیری منظم داشته است :




رشد او در چند ماه اول خوب بوده ولی در سه ماه آخر اصلاً خوب رشد نکرده است و حالا هم وزن گیری وی متوقف شده است. شما باید چند سؤال از مادرش بپرسید. از جمله :

- ✦ در ۶ ماه اول چگونه تغذیه شده است ؟
- ✦ در حال حاضر چه شیری می خورد ؟
- ✦ در حال حاضر چه غذایی می خورد ؟ چند بار در روز ؟ و چقدر ؟
- ✦ چه نوع غذاهایی می خورد ؟
- ✦ وضعیت سلامت او در چند ماه گذشته چگونه بوده است ؟

متوجه می شوید که کودک در ۶ ماه اول ، تغذیه انحصاری باشیر مادر داشته و تا امروز هم مکرراً با شیر مادر تغذیه می شود، و در طول شب نیز شیر مادر می خورد. در ۶ ماهگی مادرش شروع به دادن حریره رقیق غلات ، دو بار در روز به او کرده است. اما او وزن نمی گیرد چون به غذاهای کمکی سرشار از مواد مغذی و به دفعات بیشتر در روز نیاز دارد.

در تصویر زیر ، نمودار رشد دختری را می بینید که بطور منظم به درمانگاه مراجعه می کند :



رشد این کودک خیلی آهسته است . برای اینکه بفهمید او چگونه تغذیه می شود بهتر است چند سؤال از مادرش بپرسید :

- ✦ کودک شما چطور است؟
- ✦ چگونه تغذیه می شود؟
- ✦ چند بار تغذیه می شود؟
- ✦ کجا می خوابد؟
- ✦ (اگر با شیر مادر تغذیه می شود) روند شیردهی چگونه است؟

برای ارزیابی تغذیه باشیر مادر به وضعیت شیرخوار هنگام شیرخوردن ، نحوه گرفتن پستان و مدت زمان شیر خوردن توجه کنید.

مادر به شما می گوید کودکش بچه خوبی است و کم گریه می کند و فقط ۵-۴ بار در روز شیر می خواهد و این برای مادرش که در طول روز مشغول است خیلی کمک کننده است. او شب ها در کنار مادرش به خواب می رود. وزن گیری مریم آهسته است چون به اندازه کافی با شیرمادر تغذیه نمی شود.

کارت راهنما برای تغذیه با شیر مادر



کارت راهنما برای تغذیه با شیر مادر



تغذیه انحصاری یا شیرمادر

از بدو تا ۶ ماهگی، فقط شیر مادر را به کودک بدهید. شیر مادر بهترین غذا برای کودک است و به او کمک می کند تا قوی و سالم بماند.



آرامش خاطر داشته باشید و به توانایی خود دار شیردهی نزدیک شوید.

شروع به موهف تغذیه با شیر مادر

آماده باشید تا شیر مادر را به نطفه خود از همان ابتدا بدهید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.



روش صحیح پلنگ کردن و بستن گرفتن شیرمادر

از روش صحیح پلنگ کردن و بستن گرفتن شیرمادر استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی شیر را از سینه خود خارج کنید.



تغذیه مکرر در طول شبانه روز

در تمام مدت شبانه روز، هر آنقدر که کودک بخواهد شیر بخورد، به او شیر بدهید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.



ظرفات تغذیه با شیر مستقیم

ظرفات تغذیه با شیر مستقیم، بهترین روش برای تغذیه کودک است. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.



روش صحیح پلنگ کردن و بستن گرفتن شیرمادر

از روش صحیح پلنگ کردن و بستن گرفتن شیرمادر استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی شیر را از سینه خود خارج کنید.



عدم استفاده از شیشه و پستانک

از پستانک و شیشه استفاده نکنید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.



شیرمادر را با شیر مستقیم

شیرمادر را با شیر مستقیم بدهید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.





کارت راهنما برای تغذیه با شیر مادر



روش صحیح پلنگ کردن و بستن گرفتن شیرمادر

از روش صحیح پلنگ کردن و بستن گرفتن شیرمادر استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی شیر را از سینه خود خارج کنید.



شیردهی مادران شاغل

اگر شاغل هستید، به روش صحیح شیرمادر را جمع کنید و در یخچال یا یخچال کوچک نگهداری کنید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.



تشدید کافی بودن شیر مادر

بهترین راه تشخیص کافی بودن شیر مادر، افزایش وزن کودک است. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.



روش صحیح پلنگ کردن و بستن گرفتن شیرمادر

از روش صحیح پلنگ کردن و بستن گرفتن شیرمادر استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی شیر را از سینه خود خارج کنید.



شیردهی مادران شاغل

اگر شاغل هستید، به روش صحیح شیرمادر را جمع کنید و در یخچال یا یخچال کوچک نگهداری کنید. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.













تشدید کافی بودن شیر مادر

بهترین راه تشخیص کافی بودن شیر مادر، افزایش وزن کودک است. این کار به شما کمک می کند تا به راحتی با شیردهی کنار بیایید.



کارت پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان و رابطه متقابل کودک و والدین

رابطه متقابل کودک و والدین		پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان	
<p>تا ۲ ماهگی</p> <p>حالات و حرکات در برخورد با کودک طوری باشد که به راحتی برود، که به او توجه هرگز نباشد.</p>  <p>بسیار مراقب رفتار از نظر</p>	<p>تا ۲ ماهگی</p> <p>لباس چشمه به چشم و پوست به پوست داشته باشید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>زیر ۲ ساله</p> <p>کودک را در معرض مایعات داغ و وسایل سوزاندنی قرار ندهید. سوزاندنی را جایی نگذارید. شعله، توراگو و... قرار ندهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>سومشگی</p> <p>در زمان بخت کردن کودکان مایعات داغ و دیگران نگاه کنید.</p> 
<p>از بازی های جسمانی ساده مانند تکان دادن ماکر، پرتاب کردن توپ، کشیدن دست و مفلک گف یا ها استفاده کنید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>هر هنگام اگر به او را چال کنید و به حرکات و صدای او پاسخ مناسب بدهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>هرگز کودک خود را در جامه های بلند نشاند. سوز خفوت خواب بدون حفاظت و ضد آتش تنها بگذارید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>ساک حمل شیر خود را از زو بگریزید.</p>  <p>سومشگی</p>
<p>بگ مجسمه در دستن کودک بگذارید و چند بار تکان دهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>با آرامش و با صدای با آهنگ از هر دو طرف صورت با کودک صحبت کنید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>محیط زندگی کودکان را از سوزناپذور پارک، منقل و... نگاه دارید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>هرگز کودک خود را در نشاند آب یا وان تنها بگذارید همیشه با یک دست از آن حفاظت کنید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>
<p>اجاره دهید با شیر بازی غذا و جنس مختلف را لمس کند.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>روزی ۲ تا ۳ بار او را طوری نگاه دارید که صورتش رو به پایین باشد و وضعیت صحیح را نشان دهد.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>صدای موبایل این تویین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>بعد از آنست حمل و نقل کودک با وسیله نقلیه این در محل ترافیک باشد و مسافت ایمن از قبل محاسبه کرده ایمن و پوشش مناسب را رعایت کنید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>

رابطه متقابل کودک و والدین		پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان	
<p>۶ تا ۱۵ ماهگی</p> <p>بیمه ها را به او معرفی کنید تا به افراد غریبه هدایت کند.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>واکنش های متنوعی از پر و پند کردن صدا، شست و شو حرکت و رفتار او نشان دهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>۶ تا ۲ ساله</p> <p>در بریزهای برقی محافظت بلاستیک قرار دهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>شیرین سنگین یا ظرف های حاوی مایعات داغ را روی میز نگذارید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>
<p>تصور کودک را در آینه به او نشان دهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>مکرر او را به اسم صدا کنید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>محافظت در ابتدا و انتهای راه پله ها قرار دهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>در هیچ سن و سالی کودک را در روزگ نگذارید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>
<p>با گاوچون چیزی در دست او و به باز کردن انگشتانش و پس گرفتن آن، با او بازی کنید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>شیرین کوچک با نوک نیز و دور از دسترس کودک قرار دهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>سردکلن، سیم های الکتریکی، نوارهای پرده و... که در از نزدیک بخت خواب کودکان را محل بازی او شود کنید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>
<p>وقتی دستها را به طرف شما فرز میکند شستش کنید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>کودک را به آرامی و مکرر تکان دهید تا سرخ را کامل استوار نگه دارید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>مواد شیمیایی آشوبنده، پاک کننده، سموم و... داروها را دور از دسترس کودک قرار دهید.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>	<p>درب کابینت و گند توسط کودک قفل میز کردن نشاند.</p>  <p>توجه از نگاه مهربانی</p>

رابطه متقابل کودک و والدین		پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان	
۱۲ تا ۱۷ ماهگی		۱۲ تا ۱۷ ماهگی	
<p>صداهای او را تقلید کنید سپس صدای جدید در آورید و صبر کنید تا پاسخ دهد.</p> 	<p>در هر فرصتی کودک را لمس و او نیز شما را لمس کند.</p> 	<p>در پیراهنی برفی محافظت پلاستیکی قرار دهید.</p> 	<p>پیش از حمام کردن کودکان دمای آب را با پشت دست خود امتحان کنید.</p> 
<p>با اسباب بازی های صدایار یا وسایل آنتیژن خفته بازی کند.</p> 	<p>با غذاهایی که با انگشت می توان خورد او را به غذا خوردن مستقل تشویق کنید.</p> 	<p>از اسباب بازی های ترم یا اسباب بازی های حلقه دار استفاده نکنید.</p> 	<p>در هنگام خواب کودک را به پشت یا پهلو بخوابانید.</p> 
<p>با قلاب کردن دستهای او به سندی کودک را به ایستادن تشویق کنید.</p> 	<p>کسی دورتر از کودک بنشینید و نشان خود را به طرف او بچرخانید. با صدا زدن نامش و نشان دادن اشیاء مورد علاقه اش او را تشویق به حرکت کنید.</p> 	<p>صدای غلب ایمن ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است.</p> 	<p>از صدای مخصوص کودک در اوموبیل استفاده کنید.</p> 
<p>گازهای کودک را بصورت افقی آویز نکنید.</p> 	<p>حالات و حرکات در برخورد با کودک طوری باشد که به راحتی بفهمد که به او توجه می کنید.</p> 	<p>مواد شیمیایی شوینده، پاک کننده، سموم و داروها را دور از دسترس کودک قرار دهید.</p> 	<p>اشیاء خطرناک و آلوده روی سطح زمین در معرض دید کودک قرار ندهید.</p> 

رابطه متقابل کودک و والدین		پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان	
۱۲ تا ۱۷ ماهگی		۱۵ تا ۱۷ ماهگی	
<p>او را به مامان یا دیگران عادت دهید.</p> 	<p>او را تا حد امکان در فعالیت ها شرکت دهید و بر تجربه های مثبت به چنج بنشانید.</p> 	<p>ظروف خوراکی بزرگ و مایعات را دور از دسترس کودکان قرار دهید.</p> 	<p>ظروف خوراکی بزرگ و مایعات را دور از دسترس کودکان قرار دهید.</p> 
<p>کتاب یا اوراق خشکی به او ندهید و به او نشان دهید چگونه آنها را ورق بزند.</p> 	<p>بگ ماده و کاغذ برای خطا عملی کردن در اختیار وی نگذارید.</p> 	<p>روی پنجره ها و پنل ها محافظت قرار دهید.</p> 	<p>در هیچ سن و سالی کودک را در روروک نگذارید.</p> 
<p>صدای مچکلی برای نشستن پایین آسان از آن به نمایان بزرگ و فراموش آورید.</p> 	<p>چرخ یا ایستادن را به او تمرین دهید.</p> 	<p>صدای غلب ایمن ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است.</p> 	<p>از صدای مخصوص کودک در اوموبیل استفاده کنید.</p> 
<p>دستگاههای گوناگون برای او بخوانید.</p> 	<p>گازهای خود را همراه با نشان دادن به او شرح دهید.</p> 	<p>کودکان را تنها نگذارید.</p> 	<p>کودکان را با حیوانات خانگی تنها نگذارید و از نگهداری حیوانات در محل زندگی خودداری کنید.</p> 

رابطه متقابل کودک و والدین		پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان		
<p>۱۸ تا ۱۹ ماهگی</p> <p>هرگز از زور استفاده نکنید و فشار همدستان نداشته باشید.</p> 	<p>اجازه دهید بعضی لباسهای اجزای کلاه را خودش بپوشد.</p> 	<p>۱۸ تا ۱۹ ماهگی</p> <p>کسی بلامنتهی یا پاداشها را مریضی کودک قرار ندهید.</p> 	<p>شنا و قوسن ایمن آب را به کودک آموزش دهید.</p> 	علاقه‌مندی و همکاری
<p>وقتی کاری انجام می‌دهید، بر شیء ابراز کنی و با کلماتی آن را تکرار کنی.</p> 	<p>یادگیری او را از طریق تکرار نشود کنید.</p> 	<p>۹۰ و پایین رفتن از پله را به کودک آموزش دهید.</p> 	<p>۹۰ و پایین رفتن از پله را به کودک آموزش دهید.</p> 	سلامت
<p>تکرار کردن را به صورت تفریحی آموزش دهید.</p> 	<p>وسایل مختلفی همچون دستگیره، شماره کمر، زیپ، دکمه فشاری، فن اشتراک و یگانه‌ی که حرکات پرشماره، پیچش، شماره گرفتن و قوسن را انجام دهد.</p> 	<p>مهارت بازی ایمن اسباب بازی را به کودک بیاموزید.</p> 	<p>مهارت بازی ایمن اسباب بازی را به کودک بیاموزید.</p> 	حوادث ترافیکی
<p>نشان دهید چگونه پست‌نامه بزند.</p> 	<p>با نوب بازی آریه او را به نگه‌داری تمرین دهید.</p> 	<p>از محل کودک خود در همه زمان مطلع باشید.</p> 	<p>شماره نشان مهر پست را به کودک آموزش دهید.</p> 	مسئولیت پذیری

رابطه متقابل کودک و والدین		پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان		
<p>۲۰ تا ۲۲ ماهگی</p> <p>هر گونه مشارکت و کارهای ساده‌کننده نشان‌دهنده‌ی آمیزش‌های اجتماعی است.</p> 	<p>بازیهای گروهی می‌تواند و وسایل بازی را بین همه تقسیم کنید.</p> 	<p>۲۰ تا ۲۲ ماهگی</p> <p>قرب‌نازدی و گداز توسط کودک قابل بازگردان نیست.</p> 	<p>موانع مسدودکننده را دور از دسترس و ممنوع کردن کودک قرار دهید.</p> 	مسئولیت
<p>با وسایلی که می‌تواند از وسیله‌های بازی باهاش استفاده کند.</p> 	<p>هنگامی که چیزی را به کودک نشان می‌دهید، حواس آن را از وسایل بی‌ربطی که در صحنه آموزش دیده حذف کنید.</p> 	<p>بر ایمنی محیط‌های بازی تأکید کنید.</p> 	<p>کلاه ایمنی در زمان سوارخانه با دو چرخه را به کودک بیاموزید.</p> 	سلامت
<p>اسباب بازی یا اسباب‌های بازی که با حوصله استفاده می‌کنند، او را آموختن آوری.</p> 	<p>از اشتباه بعدی که برای قرار دادن شکل‌های مختلف در شکاف‌های مخصوص هر آریه می‌شود، تشویق کنید و انگیزه‌ی او را تقویت کنید.</p> 	<p>مطمئن شوید محل بازی کودک ایمن است.</p> 	<p>قوسن ایمنی کلاه و آریه‌ها را به کودک آموزش دهید.</p> 	حوادث ترافیکی
<p>انتظار نداشته باشید به راحتی خود را کجیای بدهد یا نوبت کند.</p> 	<p>اجازه دهید کارهایی مثل ۹۰ رفتن از پله‌ها، بستن حورت و آریه‌ها خود شما انجام دهد.</p> 	<p>چگونگی ارتباط با غریبه‌ها را به او آموزش دهید.</p> 	<p>کودک هرگز افراد غریبه‌ی جایی خود را نپذیرد.</p> 	مسئولیت پذیری



کارت مادر



دادن مایعات اضافی

در کودک بیجان

- اگر شیر مادر می خورید، به مایعات بیشتر، بیز و شیب و به ندرت شیرانی که در هر وعده شیر بندهید.
- در صورت شروع همان گرسنگی، مایعات بیشتر مادر بندهید.
- مایع را با شکر بندهید.

در کودک مبتلا به اسهال

- شیر مادر و مایعات بیشتر را مطابق توصیه ادامه دهید.
- سیاهلایق را از شیر تهیه کنید و بر بچه‌ها بکارید و پس از سه روز در هر چهار گوبه‌ها میل داشته باشید.



در دادن مایعات اضافی را تا زمان قطع اسهال ادامه دهید.

در صورت مشاهده هر یک از نشانه‌های زیر، کودک را فوراً به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی ببرید



در کودک، بیشتر اکثر:

- کمتر یا بیشتر از حالت
- حالت بیقرار شود
- تب کند
- خوب شیر نخورد

در کودک مبتلا به اسهال اگر:

- خون در مدفوع دیده شود
- خون در مدفوع دیده شود
- کم بنشیند
- تب کند

در کودک مبتلا به سرخه یا سرخه‌رنگی مکن اکثر:

- تب کند که بیشتر از یک روز باشد
- تب کند که بیشتر از یک روز باشد
- تب کند که بیشتر از یک روز باشد
- تب کند که بیشتر از یک روز باشد

دادن مایعات به کودک مبتلا به اسهال

نوبات پیش زدن اوست.

جدول واکسیناسیون کودک

این جدول برای بررسی واکسیناسیون کودکان برنامه‌ریزی شده است.

بیمه	تعداد	نوع واکسن	نوع واکسن
۱۰۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
۱۰۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
۱۰۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪

توصیه‌های تغذیه‌ای در زمان سلامت و بیماری

اگر کودک در زمان بیماری خوب غذا نمی‌خورد:

- در صورت امکان مکرر او را با شیر بران تغذیه کنید.
- کودک را به مایعات بیشتر با حجم کمتر تغذیه کنید.
- از غذاهای نرم، منوع، اشتهاآور و لذت‌بخش که کودک دوست دارد تا حد امکان به او بدهید.
- اگر گرسنگی بیش‌موقع بعلیه او احساس آن را تجربه کنید.
- با بهتر شدن اشتها و حال کودک میزان غذای او را افزایش دهید.
- کباب او بنشیند، او را به خوردن تشویق کنید.



بزرگ منتهی رشد کودک مناسب‌ترین راه تشخیص کمبود تغذیه او می‌باشد.

<p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p> <p>• از پستک و بطری استفاده کنید.</p> <p>• از ۱ تا ۲ روزگی کودک شیرین را با وی تغذیه شروع کنید و تا یک ماهگی ادامه دهید.</p>		<p>۶ تا ۶ ماهگی</p>
<p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p> <p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p> <p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p>		<p>۱۳ تا ۱۶ ماهگی</p>
<p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p> <p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p> <p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p>		<p>۲ تا ۶ ماهگی</p>
<p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p> <p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p> <p>• به ازای هر یک گرم مایع غذا یا مایعات دیگری به او دهید.</p>		<p>دو سالگی و بالاتر</p>

به هر مادر کودک بیمار یک "کارت مادر" داده شود تا از این طریق به او کمک شود که مایعات و غذای مناسب برای کودک و زمانی را که باید مجدداً نزد کارمند بهداشتی برگردد را به خاطر بیاورد. کارت مادر محتوی لغات و تصاویری است که نکات عمده توصیه را شرح داده و به تصویر می کشد. این کارت نشان دهنده توصیه هایی در مورد غذا، مایعات و علائمی دال بر برگشت فوری نزد کارمند بهداشتی است. همچنین توصیه هایی برای دادن مایعات مناسب در زمان ابتلا به اسهال و زمان مراجعه مجدد برای نوبت بعدی واکسیناسیون دارد.

اهمیت استفاده از کارت مادر:

- کارت مادر به شما نکات مهم مشاوره ای را در مورد غذا، مایعات، زمان برگشت و زمان انجام واکسیناسیون یادآوری می نماید.
- ممکن است مادر کارت را به سایر اعضای خانواده و یا همسایه ها نشان دهد و بنابراین افراد بیشتری از جامعه پیام ها را فرا می گیرند.
- مادر از اینکه طی مراجعه به مرکز، چیزی دریافت کرده، خوشحال می شود.

هنگامی که همراه مادر، کارت را مرور می کنیم:

- ۱- کارت را طوری نگه دارید که مادر بتواند به راحتی تصاویر را ببیند و یا اجاره دهید خودش آن را نگه دارد.
- ۲- هر تصویر را توضیح دهید و همچنان که صحبت می کنید به تصاویر اشاره کنید. این کار به مادر کمک می کند که با دیدن تصاویر مطالب را به خاطر بیاورد.
- ۳- اطلاعاتی را که مورد نیاز مادر است ثبت کرده یا با کشیدن دایره مشخص کنید. مثلاً دور توصیه تغذیه ای بر متناسب با سن کودک را دایره بکشید. علائم برگشت فوری را با کشیدن دایره مشخص کنید. چنانچه ودک اسهال دارد مایعات را که مناسب است مادر بدهد علامت بزنیید در صورت نیاز تاریخ واکسیناسیون بعدی را ثبت کنید.
- ۴- چنانچه با نگاه به مادر متوجه شدید که او مضطرب و یا گیج به نظر می رسد، در این صورت او را تشویق کنید سوال کند.
- ۵- از مادر بخواهید که با زبان خودش بگوید در منزل چه خواهد کرد. او را تشویق کنید که برای به خاطر آوردن مطالب از کارت استفاده کند.
- ۶- کارت را به او بدهید که به منزل ببرد. توصیه کنید که آن را به سایر اعضای خانواده نیز نشان دهد. چنانچه از این کارت ها به تعداد کافی در اختیار ندارید که به هر مادر بدهید، تعدادی از آنها را در مرکز داشته باشید تا به مادران نشان دهید.

به مادر توصیه کنید در دوران بیماری مایعات را برای کودک خود افزایش بدهد

کودک در دوران بیماری، به دلیل تب، تنفس تند یا اسهال، مایعات از دست می دهد. چنانچه کودک به منظور پیشگیری از کم آبی مایع بیشتری بنوشد بهتر شده، قوی خواهد ماند.

مایع اضافی خصوصاً برای کودک مبتلا به اسهال حائز اهمیت است. این کودکان بایستی بر حسب برنامه های درمانی الف یا ب همچنان که در چارت درمان مربوط به آنها توضیح داده شده، مایعات دریافت کنند.

مادرانی که فرزندشان را با شیر خود تغذیه می کنند باید مکرراً آنها را شیر دهند.

توصیه های مربوط به مایعات بطور خلاصه در پایین چارت آمده است و این توصیه ها را برای هر مادری که فرزندش را به خانه می برد داشته باشید، مگر اینکه تاکنون دستورات زیادی دریافت کرده باشد که ممکن است با توصیه های بیشتر گیج شود و نتواند همه مطالب را در خاطر نگه دارد و یا اینکه برنامه درمانی الف را برایش توضیح داده باشید.

به مادر توصیه کنید در دوران بیماری مایعات را برای کودک خود افزایش بدهد.

- برای کودک مبتلا به بیماری:
 - تکرر بیشتر تغذیه با شیر مادر و به مدت طولانی تر در هر وعده شیردهی
 - افزایش مایعات مانند: سوپ، دوغ یا آب سالم
- برای کودک مبتلا به اسهال:
 - دادن مایعات زیاد از مرگ کودک جلوگیری می کند. مایعات را طبق برنامه درمانی الف یا ب به کودک بدهید.

به مادر توصیه کنید چه موقع نزد کارمند بهداشتی مراجعه نماید.

لازم است به هر مادر که کودکش را به منزل می برد در خصوص " زمان مراجعه مجدد به کارمند بهداشتی " توصیه هایی انجام شود. او لازم است در موارد زیر برگردد:

- برای پیگیری در روزهای معینی (برای مثال، وقتی نیاز است که بهبودی در اثر یک آنتی بیوتیک کنترل شود)
 - فوری چنانچه علائمی ظاهر شود که دال بر بدتر شدن بیماری است یا
 - برای نوبت بعدی واکسیناسیون (مراجعه بعدی کودک سالم)
- این موضوع حائز اهمیت است که علائمی را که در صورت ظهور مادر باید فوراً کودک خود را برگرداند، به او آموزش دهید. شما در چارت تشخیص نوع درمان این علائم را آموخته اید و در این بخش از مجموعه، این مورد تکرار شده اند. بروز این علائم نشان دهنده نیاز به مراقبت بیشتر برای بیماری جدی می باشد.

پیگیری

در مجموعه تشخیص نوع درمان، شما آموختید که مشکلات خاصی نیازمند پیگیری در زمان های معینی می باشد. برای مثال پنومونی و عفونت حاد گوش نیازمند پیگیری است تا اطمینان حاصل شود که آنتی بوتیک تجویز شده موثر بوده است. اسهال پایدار نیازمند پیگیری است تا اطمینان حاصل شود که تغییرات تغذیه ای موثر واقع شده است. در مورد بعضی مشکلات دیگر مانند تب یا خروج چرک از گوش فقط در صورتی که مشکل پایدار بوده و طول بکشد، پیگیری لازم است.

در پایان مراجعه کودک بیمار، به مادر بگویید چه زمانی برای پیگیری برگردد. گاهی اوقات کودک ممکن است نیازمند پیگیری برای چندین مشکل باشد. در چنین مواردی به مادر بگویید در زودترین زمان تعیین شده برگردد. چنانچه یک مشکل مانند تب طول بکشد ممکن است نیاز باشد به مادر بگویید زودتر از زمان مقرر برای پیگیری مراجعه نماید.

چارت مشاوره دارای خلاصه ای از زمان های پیگیری برای مشکلات مختلف می باشد.

به مادر توصیه کنید طبق لیست زیر برای پیگیری کودک بیمار مراجعه نماید.

اگر کودک مبتلا به:	برای پیگیری برگردد:
عفونت حاد گوش پنومونی تب	۲ روز
اسهال / اسهال پایدار مشکلات غذا و نحوه تغذیه سایر بیماریها، اگر بهبود نیافت	۵ روز
اختلالات رشد / رشد نامعلوم	۳۰ روز (بالای یکسال) ۱۵ روز (زیر یکسال)

دقت کنید که زمان های مختلفی برای پیگیری مربوط به تغذیه وجود دارد:

- چنانچه کودک مشکل تغذیه ای دارد و شما در مورد انجام تغییراتی در تغذیه کودک پیشنهادهای داده اید بعد از ۵ روز پیگیری کنید که آیا مادر تغییرات را انجام داده است. در صورت نیاز، بیشتر مشاوره کنید.
- اگر کودک اختلال رشد دارد (بالای ۳- انحراف معیار نزولی و افقی با شیب کند) و زیر یک سال می باشد از مادر بخواهید تا ۱۵ روز پس از اولین مراجعه برای توزین کودک خود مراجعه کند و اگر کودک بالای یک سال است ۳۰ روز پس از اولین مراجعه بیاید. در آن هنگام کودک را وزن کنید و تصمیم بگیرید که آیا تغییرات غذا و نحوه تغذیه کودک، به بهبود او کمک کرده است.

به مادر توصیه کنید چه موقع فورا مراجعه کند

به خاطر داشته باشید که این قسمت از " چه موقعی مراجعه کند" بسیار حائز اهمیت می باشد.

به مادر تاکید کنید اگر کودک هر کدام از نشانه های زیر را پیدا کرد باید فورا مراجعه کند تا کودک به نزدیک ترین مرکز درمانی فورا انتقال داده شود.	
هر کودک بیمار اگر:	<ul style="list-style-type: none">• قادر به نوشیدن نبودن• مریض تر شدن• تب کردن
اگر کودک پنومونی ندارد: و دچار سرفه یا سرماخوردگی است باید برگردد اگر:	<ul style="list-style-type: none">• تنفس تند• تنفس مشکل
کودک اسهالی باید برگردد اگر:	<ul style="list-style-type: none">• خون در مدفوع• کم بنوشد

هنگام آموزش نشانه های مراجعه فوری، از کارت مادر استفاده کنید. برای فهم بهتر مادر از اصطلاحات محلی استفاده کنید. علائمی که مادر باید به خاطر داشته باشد را به او نشان بدهید. اطمینان حاصل کنید که مادر توصیه های شما را فهمیده است.

ملاقات بعدی کودک سالم

مراجعه بعدی کودک برای مراقبت و دریافت واکسن های لازم را به مادر یادآوری کنید، مگر اینکه او تاکنون موارد زیادی را به خاطر سپرده و به هر ترتیب به زودی مراجعه خواهد کرد. به عنوان مثال چنانچه مادر بایستی جدول برای دادن آنتی بیوتیک، دستورات مراقبت در منزل برای هر مشکل دیگری و پیگیری ۲ روز بعد را به خاطر بسپارد نیاز نیست مراجعه یک ماه بعد را برای مراقبت کودک سالم به او یادآوری کنید هر چند که زمان مناسب برای واکسیناسیون بعدی بر روی کارت مادر درج شده است.



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------


- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.


امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودکان گاهی صداهای غان و غون (صداهایی مثل غرغره کردن یا قل قل کردن از ته گلویش) در می آورد؟
				۲. آیا کودکان صداهایی مانند «اووو»، «آه»، «قه» و «گه» در می آورد؟
				۳. وقتی با کودکان حرف می زنید، آیا او در پاسخ صداهایی ایجاد می کند؟
				۴. آیا وقتی با کودکان حرف می زنید، لبخند می زند؟
				۵. آیا کودکان لبخند ملایمی می زند؟
				۶. بعد از اینکه مدتی در دیدرس کودکان نبوده اید، آیا او با دیدن شما لبخند می زند یا هیجان زده می شود؟
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. وقتی کودکان به پشت خوابیده است، آیا بازوها و پاهایش را تکان می دهد و پیچ و تاب و وول می خورد؟
				۲. وقتی کودکان روی شکم خوابیده، آیا سرش را به یک طرف می چرخاند؟
				۳. وقتی کودکان روی شکم خوابیده، آیا سرش را بیش از چند ثانیه بالا نگه می دارد؟
				۴. وقتی کودکان به پشت خوابیده، آیا با پاهایش لگد پرانی می کند؟
				۵. وقتی کودکان به پشت خوابیده، آیا سرش را از یک طرف به طرف دیگر حرکت می دهد؟
				۶. وقتی کودکان روی شکم خوابیده، آیا بعد از این که سرش را بالا می گیرد، به جای این که سرش سقوط کند یا ناگهان پایین بیفتد، می تواند سر را دوباره به آرامی روی زمین بگذارد؟
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. وقتی کودکان بیدار است، آیا معمولاً دستش به صورت مشت شده و بسته است؟ (حتی اگر کودکان قبلاً این کار را انجام می داده ولی دیگر این کار را نمی کند، پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۲. آیا اگر کف دست کودکان را لمس کنید، او انگشتان را در دستش می گیرد؟ 
				۳. وقتی یک اسباب بازی را در دست کودکان قرار می دهید، آیا برای مدت کوتاهی آن را در دستش نگه می دارد؟ 
				۴. آیا کودکان صورت خود را با دستانش لمس می کند؟
				۵. آیا وقتی کودکان بیدار است دست هایش را باز یا نیمه باز نگه می دارد؟ (برخلاف دوره نوزادی که دست هایش به حالت مشت بود). 
				۶. آیا کودکان به لباس های خود چنگ می زند یا آن را می خراشد؟
				نمره حرکات ظریف

توجه: اگر به سوال ۵ این بخش پاسخ بله داده شده است، پاسخ سوال ۱ را «بله» در نظر بگیرید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. آیا کودکتان به اشیائی که در فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی از او قرار دارند، نگاه می کند؟
				۲. وقتی شما به اطراف حرکت می کنید، آیا کودکتان با چشمانش شما را دنبال میکند؟
				۳. وقتی یک اسباب بازی را به آرامی جلوی صورت کودکتان (در فاصله حدود ۲۵ سانتی)، از این طرف به آن طرف حرکت می دهید آیا کودکتان آن را با چشمانش، و گاهی با چرخاندن سرش دنبال می کند؟
				۴. وقتی اسباب بازی کوچکی را به آرامی جلوی صورت کودکتان (در فاصله حدود ۲۵ سانتی) بالا و پایین می برید، آیا کودک اسباب بازی را با چشمانش دنبال می کند؟
				۵. وقتی کودک خود را در وضعیت نشسته نگه می دارید، آیا او به یک اسباب بازی (تقریباً به اندازه یک جفجغه یا یک فنجان) که شما روی میز یا زمین گذاشته اید، نگاه می کند؟
				۶. وقتی کودکتان به پشت خوابیده و شما یک اسباب بازی را بالای سرش تاب می دهید، آیا او دستانش را به سمت اسباب بازی تکان می دهد؟
				
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. آیا کودکتان گاهی حتی وقتی شیر نمی خورد، دهانش را طوری حرکت می دهد انگار که دارد چیزی را می مکد؟
				۲. آیا وقتی کودکتان گرسنه است، جایش را خیس کرده، خسته است یا این که دلش می خواهد بغلش کنید، گریه می کند؟
				۳. آیا کودکتان به شما لبخند می زند؟
				۴. وقتی به کودکتان لبخند می زنید، آیا او هم در پاسخ لبخند می زند؟
				۵. آیا کودکتان دستهایش را تماشا می کند؟
				
				۶. وقتی کودکتان سینه مادر یا شیشه شیر را می بیند، آیا به نظر می رسد که می داند که به زودی قرار است به او شیر بدهند؟
				نمره شخصی - اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا تست سنجش شنوایی نوزادان برای کودک شما انجام شده است؟ اگر نه، توضیح دهید.

بله خیر

.....

۲. آیا فرزند شما هر دو دست و هر دو پایش را به خوبی حرکت می دهد؟ اگر نه، توضیح دهید.

بله خیر

۳. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، یا مشکلات بینایی وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید.

بله خیر

.....

۴. آیا فرزند شما تا کنون هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید.

بله خیر

.....

۵. آیا درباره رفتارهای فرزندتان (مثلاً خوردن یا خوابیدن او) نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید.

بله خیر

.....

۶. آیا چیز دیگری درباره ی فرزندتان شما را نگران و دلواپس کرده است؟ اگر بله، توضیح دهید.

بله خیر

.....



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:


نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------



- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

ارتباطات	بله	گاهی	هنوز نه	امتیاز
۱. آیا کودکان لبخند ملایمی می‌زند؟				
۲. بعد از اینکه مدتی در دیدرس کودکان نبوده‌اید، آیا او با دیدن شما لبخند می‌زند یا هیجان زده می‌شود؟				
۳. آیا زمانی که صدای فردی غیر از شما را می‌شنود گریه اش را قطع می‌کند؟				
۴. آیا کودکان جیغ‌های تیزی می‌کشد؟				
۵. آیا کودکان می‌خندد؟				
۶. آیا زمانی که به اسباب بازی‌ها یا مردم نگاه می‌کند از خودش صدا در می‌آورد؟				
نمره کل ارتباطات				

حرکات درشت	بله	گاهی	هنوز نه	امتیاز
۱. وقتی کودکان به پشت خوابیده، آیا سرش را از یک طرف به طرف دیگر حرکت می‌دهد؟				
۲. وقتی کودکان روی شکمش خوابیده، آیا بعد از این که سرش را بالا می‌گیرد، به جای این که سرش سقوط کند یا ناگهان پایین بیفتد، می‌تواند سر را دوباره به آرامی روی زمین بگذارد؟				
۳. زمانی که کودکان روی شکمش خوابیده، آیا سرش را به مدت حداقل ۱۵ ثانیه بالا نگه می‌دارد طوری که فاصله چانه اش با کف زمین حدود نیمه و جب (۸-۷ سانتیمتر) باشد؟				
۴. زمانی که روی شکمش خوابیده است، آیا سرش را مستقیم بالا می‌آورد و به اطراف نگاه می‌کند؟ (حین انجام این کار، می‌تواند روی آرنجش تکیه دهد.)				
۵. زمانی که کودکان را در وضعیت نشسته نگه می‌دارید، آیا سرش را صاف و ثابت نگه می‌دارد؟				
۶. در حالی که کودکان به پشت خوابیده، آیا دستانش را روی سینه به هم می‌رساند و انگشتانش را لمس می‌کند؟				
نمره حرکات درشت				

حرکات ظریف	بله	گاهی	هنوز نه	امتیاز
۱. آیا وقتی کودکان بیدار است دست‌هایش را باز یا نیمه باز نگه می‌دارد؟ (برخلاف دوره نوزادی که دست‌هایش به حالت مشت بود).				
۲. زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودکان می‌گذارید، آیا آن را حداقل برای چند ثانیه تکان می‌دهد؟				
۳. آیا کودکان به لباس‌های خود چنگ می‌زند یا آن را می‌خراشد؟				
۴. زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودکان می‌گذارید، آیا در حالی که حدود یک دقیقه آن را نگه داشته است، به آن نگاه می‌کند، آن را تکان می‌دهد یا سعی می‌کند آن را بچود؟				
۵. در حالیکه کودکان را در وضعیت نشسته نگه داشته‌اید یا او را روی شکمش قرار داده‌اید، آیا سطح جلوی خود را با انگشتانش می‌گیرد یا به آن چنگ می‌زند؟				
۶. زمانی که کودکان را در وضعیت نشسته نگاه داشته‌اید، آیا برای گرفتن اسباب بازی که روی میز نزدیک خودش قرار دارد، دستش را به طرف آن دراز می‌کند، هرچند که ممکن است نتواند با دستش آن را لمس کند؟				
نمره حرکات ظریف				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. وقتی یک اسباب بازی را به آرامی جلوی صورت کودکتان (در فاصله حدود ۲۵ سانتی)، از این طرف به آن طرف حرکت می دهید آیا کودکتان آن را با چشمانش، و گاهی با چرخاندن سرش دنبال می کند؟
				۲. وقتی اسباب بازی کوچکی را به آرامی جلوی صورت کودکتان (در فاصله حدود ۲۵ سانتی) بالا و پایین می برید، آیا کودک اسباب بازی را با چشمانش دنبال می کند؟
				۳. وقتی کودک خود را در وضعیت نشسته نگه می دارید، آیا او به یک اسباب بازی (تقریباً به اندازه یک جغجغه یا یک فنجان) که شما روبروی او روی میز یا زمین گذاشته اید، نگاه می کند؟
				۴. زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودکتان می گذارید، آیا به آن نگاه می کند؟
				۵. زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودکتان قرار می دهید، آیا آن را در دهانش می گذارد؟
				۶. وقتی کودکتان به پشت خوابیده و شما یک اسباب بازی را بالای سرش تاب می دهید، آیا او دستانش را به سمت اسباب بازی تکان می دهد؟
				
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. آیا کودکتان دست هایش را تماشا می کند؟
				
				۲. زمانی که کودک دست هایش را به هم می رساند، آیا با انگشتانش بازی می کند؟
				۳. وقتی کودکتان سینه مادر یا شیشه شیر را می بیند، آیا به نظر می رسد که می داند که به زودی قرار است به او شیر بدهند؟
				۴. زمانی که کودکتان از سینه مادر شیر می خورد آیا با دست آزاد خود پستان مادر را می گیرد و یا هنگام شیر خوردن از شیشه با هر دو دستش همزمان در نگه داشتن شیشه شیر کمک می کند؟
				۵. آیا کودکتان پیش از اینکه به او لبخند بزند یا با او صحبت کنید، با دیدن شما در نزدیکی خود، لبخند می زند؟
				۶. زمانی که کودکتان روبه روی یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا به خودش لبخند می زند یا برای خودش صداهایی در می آورد؟
				
				نمره شخصی اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فرزند شما از هر دو دست و هر دو پایش به خوبی استفاده می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. وقتی به فرزندتان کمک می کنید که بایستد، آیا بیشتر اوقات کف پاهایش کاملاً روی زمین است؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا نگران این هستید که فرزندتان خیلی ساکت است یا صداهایی را که بچه های دیگر در می آورند، در نمی آورد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر










تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:


نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------




- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

ارتباطات	بله	گاهی	هنوز نه	امتیاز
۱. آیا کودکان جیغ های تیزی می کشد؟				
۲. زمانی که کودکان برای خودش صدا در می آورد، آیا از حلق خود صداهایی مثل خرخر و غرغر (قققق، خخخخ!!) در می آورد؟				
۳. زمانی که خارج از دیدرس کودکان هستید و او را صدا می کنید، آیا به سمت صدای شما نگاه می کند؟				
۴. زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودکان برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمده است؟				
۵. آیا کودکان صداهایی مانند «دا»، «گا»، «کا» و «با» از خودش در می آورد؟				
۶. اگر صداهایی را که کودکان از خودش در می آورد تقلید کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟				
نمره کل ارتباطات				

حرکات درشت	بله	گاهی	هنوز نه	امتیاز
۱. درحالی که کودکان به پشت خوابیده است، آیا پاهایش را تا حدی که بتواند آنها را ببیند، بالا می آورد؟				
۲. زمانی که کودکان روی شکم خوابیده است، آیا بازو هایش را از آرنج صاف کرده و سینه اش را کاملاً از زمین یا تخت بالا می کشد؟				
۳. آیا کودکان از پشت به شکم غلت می زند و هر دو دستش را از زیر بدنش بیرون می آورد؟				
۴. زمانی که کودکان را روی زمین می نشانید، آیا در حالت نشسته روی دست هایش تکیه می کند؟ (اگر بدون تکیه به دستانش هم می تواند صاف بنشیند پاسخ «بله» را علامت بزنید.)				
۵. اگر هر دو دست کودکان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟				
۶. آیا کودکان با قرار گرفتن روی دست ها و زانو هایش، به وضعیت چهار دست و پا در می آید؟				
نمره حرکات درشت				

حرکات ظریف	بله	گاهی	هنوز نه	امتیاز
۱. آیا کودکان یک اسباب بازی را که به سوی او دراز کرده اید می گیرد، و آن را به مدت یک دقیقه نگاه می کند، تکان می دهد یا می جود؟				
۲. آیا کودکان همزمان هر دو دستش را به سمت یک اسباب بازی دراز می کند یا آن را می گیرد؟				
۳. آیا کودکان به سمت یک خرده نان یا نخود و لوبیا دست دراز می کند و آن را با انگشتانش یا دستش لمس می کند؟ (اگر می تواند چیز کوچکی به اندازه یک نخود را بردارد، به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)				
۴. آیا کودکان یک اسباب بازی کوچک را برمی دارد، آن را کف دستش نگاه می دارد و انگشتانش را دور آن جمع می کند؟				
۵. آیا کودکان تلاش می کند که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی اگر موفق به این کار نشود؟ (اگر می تواند آن را بردارد هم به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)				
۶. آیا کودکان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟				
نمره حرکات ظریف				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. زمانی که یک اسباب بازی مقابل کودکتان است، آیا هر دو دستش را به سمت آن دراز می‌کند؟
				۲. زمانی که کودکتان به پشت خوابیده، آیا برای پیدا کردن اسباب بازی ای که از دستش افتاده، سرش را می‌چرخاند؟ (اگر اسباب بازی را برمی‌دارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)
				۳. زمانی که کودکتان به پشت خوابیده و اسباب بازی از دستش افتاده، آیا در صورتی که بتواند آن را ببیند برای برداشتنش تلاش می‌کند؟
				۴. آیا کودکتان اسباب بازی را برمی‌دارد و آن را در دهانش می‌گذارد؟ 
				۵. آیا کودکتان مرتباً اسباب بازی را از یک دست به دست دیگری می‌دهد؟ 
				۶. آیا کودکتان با کوبیدن اسباب بازی روی زمین یا میز، بازی می‌کند؟ 
نمره حل مسئله				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. زمانی که کودکتان روبه روی یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا به خودش لبخند می‌زند یا برای خودش صداهایی در می‌آورد؟ (آ و ر آ)
				۲. آیا کودک در برابر افراد غریبه رفتاری متفاوت از رفتاری که با شما و سایر افراد آشنا دارد، نشان می‌دهد؟ (واکنش به غریبه‌ها می‌تواند شامل خیره شدن، اخم کردن، عقب کشیدن یا گریه کردن باشد.)
				۳. وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با گرفتن پاهایش بازی می‌کند؟ 
				۴. زمانی که کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می‌کند؟ 
				۵. وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می‌گذارد؟ 
				۶. آیا کودکتان تلاش می‌کند تا یک اسباب بازی که دور از دسترس اوست، را بگیرد؟ (او ممکن است برای گرفتن آن غلت بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود.)
نمره شخصی. اجتماعی				

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه‌های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

- آیا فرزند شما از هر دو دست و هر دو پایش به خوبی استفاده می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر
- وقتی به فرزندتان کمک می‌کنید که بایستد، آیا بیشتر اوقات کف پاهایش کاملاً روی زمین است؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر
- آیا نگران این هستید که فرزندتان خیلی ساکت است یا صداهایی را که بچه‌های دیگر در می‌آورند، در نمی‌آورد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر
- آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر
- آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر
- آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر
- آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر
- آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:




نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. زمانی که خارج از دیدرس کودکان هستید و او را صدا می‌کنید، آیا به سمت صدای شما نگاه می‌کند؟
				۲. زمانی که صدای بلندی می‌آید، آیا کودکان برمی‌گردند تا ببینند آن صدا از کجا آمده است؟
				۳. اگر صداهایی را که کودکان از خودش در می‌آورد تقلید کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می‌کند؟
				۴. آیا کودکان صداهایی مانند «دا»، «گا»، «کا» و «با» از خودش در می‌آورد؟
				۵. آیا کودکان به لحن صدای شما پاسخ می‌دهد و وقتی به او می‌گویید «نه، نه»، دست کم برای مدت کوتاهی دست از فعالیتش می‌کشد؟
				۶. آیا کودکان دو صدای مشابه مانند «با. با»، «دا. دا» یا «گا. گا» از خودش در می‌آورد؟ (لازم نیست این صداها معنی خاصی داشته باشند.)
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. زمانی که کودکان را روی زمین می‌نشانید، آیا در حالت نشسته روی دستهایش تکیه می‌کند؟ (اگر بدون تکیه به دستانش هم می‌تواند صاف بنشیند پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۲. آیا کودکان از پشت به شکم غلت می‌زند و هر دو دستش را از زیر بدنش بیرون می‌آورد؟
				۳. آیا کودکان با قرار گرفتن روی دست‌ها و زانوهایش، به وضعیت چهار دست و پا درمی‌آید؟
				۴. اگر هر دو دست کودکان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می‌کند؟
				۵. وقتی کودکان روی زمین می‌نشینند، آیا می‌تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان تکیه‌گاه کمک بگیرد، صاف بنشیند؟
				۶. اگر کودکان را کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، میز یا یک پشتی بایستانید، آیا بدون اینکه سینه‌اش را به عنوان تکیه‌گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می‌دارد؟
				توجه: اگر به سوال ۵ «حرکات کلی» پاسخ «بله» یا «گاهی» داده شده، به سوال ۱ پاسخ «بله» بدهید.
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکان به سمت یک خرده نان یا نخود و لوبیا دست دراز می‌کند و آن را با انگشتانش یا دستش لمس می‌کند؟ (اگر می‌تواند چیز کوچکی به اندازه یک نخود بردارد، به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)
				۲. آیا کودکان یک اسباب‌بازی کوچک را برمی‌دارد، آن را کف دستش نگه می‌دارد و انگشتانش را دور آن جمع می‌کند؟
				۳. آیا کودکان تلاش می‌کند که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی اگر موفق به این کار نشود؟ (اگر می‌تواند آن را بردارد هم به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)
				۴. آیا کودکان می‌تواند یک اسباب‌بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟
				۵. آیا کودکان می‌تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ (اگر می‌تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)
				۶. آیا کودکان یک اسباب‌بازی کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش برمی‌دارد؟ (باید فضای خالی میان کف دست و اسباب‌بازی دیده شود.)
				توجه: اگر به سوال ۶ «حرکات ظریف» پاسخ «بله» یا «گاهی» داده شد، به سوال شماره ۲ پاسخ «بله» بدهید.
				نمره حرکات ظریف

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. آیا کودکتان اسباب بازی را برمی دارد و آن را در دهانش می گذارد؟ 
				۲. زمانی که کودکتان به پشت خوابیده و اسباب بازی از دستش افتاده، آیا در صورتی که بتواند آن را ببیند برای برداشتنش تلاش می کند؟
				۳. آیا کودکتان با کوبیدن اسباب بازی روی زمین یا میز، بازی می کند؟ 
				۴. آیا کودکتان مرتباً اسباب بازی را از یک دست به دست دیگری می دهد؟ 
				۵. آیا کودکتان می تواند دو اسباب بازی کوچک را بردارد، به طوری که هر کدام در یک دستش باشند و برای حدود ۱ دقیقه آن ها را نگه دارد؟ 
				۶. وقتی که کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری که روی میز قرار دارد، می کوبد؟ 
نمره حل مسئله				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با گرفتن پاهایش بازی می کند؟ 
				۲. زمانی که کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می کند؟ 
				۳. آیا کودکتان تلاش می کند تا یک اسباب بازی که دور از دسترس اوست، را بگیرد؟ (او ممکن است برای گرفتن آن غلت بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود). 
				۴. وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟
				۵. آیا کودکتان از استکان یا فنجان که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟
				۶. آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟
نمره شخصی. اجتماعی				

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فرزند شما از هر دو دست و هر دو پایش به خوبی استفاده می کند؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر

۲. وقتی به فرزندتان کمک می کنید که بایستد، آیا بیشتر اوقات کف پاهایش کاملاً روی زمین است؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر

۳. آیا نگران این هستید که فرزندتان خیلی ساکت است یا صداهایی را که بچه های دیگر در می آورند، در نمی آورد؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر

۴. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر

۵. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر




۶. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر


۷. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید.
بله خیر

۸. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید.
بله خیر



نام و نام خانوادگی کودک:				کد ملی:	تاریخ تولد:
ارتباطات					
امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله		
				۱. آیا کودکان صداهایی مانند «دا»، «گا»، «کا» و «با» از خودش در می آورد؟	
				۲. اگر صداهایی را که کودکان از خودش در می آورد تقلید کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟	
				۳. آیا کودکان دو صدای مشابه مانند «با. با»، «دا. دا» یا «گا. گا» از خودش در می آورد؟ (لازم نیست این صداها معنی خاصی داشته باشند.)	
				۴. اگر از کودکان بخواهید تا یک بازی کودکانه (مانند دست دستی، بای بای، سرسری و دالی کردن) را انجام دهد، آیا حداقل یکی از این بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نشان دهید، انجام می دهد؟	
				۵. آیا بدون اینکه شما از ایما و اشاره استفاده کنید، کودکان می تواند یک دستور ساده مانند «بیا اینجا»، «اونو به من بده» یا «اونو سر جایش بگذار» را انجام دهد؟	
				۶. آیا کودکان سه کلمه مانند «ماما»، «بابا» و «دادا» را می گوید؟ (منظور از کلمه، صدا یا صداهایی است که کودک همواره بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به کار می برد.)	
نمره کل ارتباطات					
حرکات درشت					
امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله		
				۱. اگر هر دو دست کودکان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟	
				۲. وقتی کودکان روی زمین می نشیند، آیا می تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان تکیه گاه کمک بگیرد، صاف بنشیند؟	
				۳. اگر کودکان را کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا یک پشتی بایستاند، آیا بدون اینکه سینه اش را به عنوان تکیه گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟	
				۴. در حالیکه کودکان دستش را به وسیله ای مانند چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد و دوباره به حالت ایستاده در آید؟	
				۵. در حالیکه کودکان دستش را به وسیله ای مانند چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا با حفظ تعادل (بدون اینکه بیافتد) خودش را پایین می آورد؟	
				۶. آیا کودکان در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته است، کنار آن راه می رود؟	
نمره حرکات درشت					
حرکات ظریف					
امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله		
				۱. آیا کودکان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟	
				۲. آیا کودکان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ (اگر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)	
				۳. آیا کودکان یک اسباب بازی کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ (باید فضای خالی میان کف دست و اسباب بازی دیده شود.)	
				۴. آیا کودکان بعد از یک یا دو بار تلاش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر می دارد؟ (این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.)	
				۵. آیا کودکان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد.	
				۶. آیا کودکان اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بباندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟	
توجه: اگر به سوال ۵ «حرکات ظریف» پاسخ «بله» یا «گاهی» داده شد، به سوال شماره ۲ پاسخ «بله» بدهید.					
نمره حرکات ظریف					

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				 <p>۱. آیا کودکان مرتباً اسباب بازی را از یک دست به دست دیگری می‌دهد؟</p>
				 <p>۲. آیا کودکان می‌تواند دو اسباب بازی کوچک را بردارد، به طوری که هر کدام در یک دستش باشند و برای حدود ۱ دقیقه آن‌ها را نگه دارد؟</p>
				 <p>۳. وقتی که کودکان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری که روی میز قرار دارد، می‌کوبد؟</p>
				۴. در حالیکه کودکان در هر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد، آیا آن دو اسباب بازی را به همدیگر می‌کوبد (مانند دست دستی کردن)؟
				۵. آیا کودکان به یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافی (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر کودک) است، اشاره می‌کند یا سعی می‌کند آن را بگیرد؟
				۶. اگر کودکان ببیند که شما یک اسباب بازی کوچک را زیر یک تکه کاغذ یا پارچه پنهان می‌کنید، آیا آن را پیدا می‌کند؟ (اطمینان حاصل کنید که اسباب بازی کاملاً مخفی شده است.)
نمره حل مسئله				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				 <p>۱. وقتی کودکان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می‌گذارد؟</p>
				۲. آیا کودکان از استکان یا فنجان که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می‌نوشد؟
				۳. آیا کودکان خودش می‌تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟
				۴. زمانی که دست خود را دراز می‌کنید و از کودکان می‌خواهید اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا کودک آن را به سوی شما دراز می‌کند، حتی اگر اسباب بازی را رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در دست شما رها می‌کند، هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۵. وقتی به کودکان لباس می‌پوشانید، زمانی که دستش در حلقه آستین قرار می‌گیرد، آیا دستش را درون آستین فرو می‌برد؟
				۶. زمانی که دست خود را دراز می‌کنید و از کودکان می‌خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست شما رها می‌کند؟
نمره شخصی اجتماعی				

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فرزند شما از هر دو دست و هر دو پایش به خوبی استفاده می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. وقتی به فرزندتان کمک می‌کنید که بایستند، آیا بیشتر اوقات کف پاهایش کاملاً روی زمین است؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا نگران این هستید که فرزندتان خیلی ساکت است یا صداهایی را که بچه های دیگر در می‌آورند، در نمی‌آورد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر







تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:



نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودکان صداهایی مانند «دا»، «گا»، «کا» و «با» از خودش در می آورد؟
				۲. اگر صداهایی را که کودکان از خودش در می آورد تقلید کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟
				۳. آیا کودکان دو صدای مشابه مانند «با. با»، «دا. دا» یا «گا. گا» از خودش در می آورد؟ (لازم نیست این صداها معنی خاصی داشته باشند.)
				۴. اگر از کودکان بخواهید تا یک بازی کودکانه (مانند دست دستی، بای بای، سرسری و دالی کردن) را انجام دهد، آیا حداقل یکی از این بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نشان دهید، انجام می دهد؟
				۵. آیا بدون اینکه شما از ایما و اشاره استفاده کنید، کودکان می تواند یک دستور ساده مانند «بیا اینجا»، «اونو به من بده» یا «اونو سر جایش بگذار» را انجام دهد؟
				۶. آیا کودکان سه کلمه مانند «ماما»، «بابا» و «دادا» را می گوید؟ (منظور از کلمه، صدا یا صداهایی است که کودک همواره بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به کار می برد.)
				نمره کل ارتباطات




امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. اگر هر دو دست کودکان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟ 
				۲. وقتی کودکان روی زمین می نشیند، آیا می تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان تکیه گاه کمک بگیرد، صاف بنشیند؟ 
				۳. اگر کودکان را کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا یک پستی بایستاند، آیا بدون اینکه سینه اش را به عنوان تکیه گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟ 
				۴. در حالیکه کودکان دستش را به وسیله ای مانند چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پستی گرفته و ایستاده است، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد و دوباره به حالت ایستاده در آید؟ 
				۵. در حالیکه کودکان دستش را به وسیله ای مانند چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پستی گرفته و ایستاده است، آیا با حفظ تعادل (بدون اینکه بیافتد) خودش را پایین می آورد؟
				۶. آیا کودکان در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پستی گرفته است، کنار آن راه می رود؟
				نمره حرکات درشت


امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟ 
				۲. آیا کودکان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ (اگر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.) 

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				 <p>۳. آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش برمی دارد؟ (باید فضای خالی میان کف دست و اسباب بازی دیده شود.)</p>
				 <p>۴. آیا کودکتان بعد از یک یا دو بار تلاش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود برمی دارد؟ (این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.)</p>
				 <p>۵. آیا کودکتان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش برمی دارد؟ ممکن است ضمن انجام این کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد.</p>
				۶. آیا کودکتان اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بباندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن برمی دارد؟

توجه: اگر به سوال ۵ «حرکات ظریف» پاسخ «بله» یا «گاهی» داده شد، به سوال شماره ۲ پاسخ «بله» بدهید.

				نمره حرکات ظریف
--	--	--	--	-----------------

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				 <p>۱. آیا کودکتان مرتباً اسباب بازی را از یک دست به دست دیگری می دهد؟</p>
				 <p>۲. آیا کودکتان می تواند دو اسباب بازی کوچک را بردارد، به طوری که هر کدام در یک دستش باشند و برای حدود ۱ دقیقه آن ها را نگه دارد؟</p>
				 <p>۳. وقتی که کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری که روی میز قرار دارد، می کوبد؟</p>
				۴. در حالیکه کودکتان در هر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد، آیا آن دو اسباب بازی را به همدیگر می کوبد (مانند دست دستی کردن)؟
				۵. آیا کودکتان به یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفاف (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر کودک) است، اشاره می کند یا سعی می کند آن را بگیرد؟
				۶. اگر کودکتان ببیند که شما یک اسباب بازی کوچک را زیر یک تکه کاغذ یا پارچه پنهان می کنید، آیا آن را پیدا می کند؟ (اطمینان حاصل کنید که اسباب بازی کاملاً مخفی شده است.)
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				 <p>۱. وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟</p>
				۲. آیا کودکتان از استکان یا فنجان که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟
				۳. آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟
				۴. زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند، حتی اگر اسباب بازی را رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۵. وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، زمانی که دستش در حلقه آستین قرار می گیرد، آیا دستش را درون آستین فرو می برد؟
				۶. زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست شما رها می کند؟
				نمره شخصی اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فرزند شما از هر دو دست و هر دو پایش به خوبی استفاده می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. وقتی به فرزندتان کمک می کنید که بایستد، آیا بیشتر اوقات کف پاهایش کاملاً روی زمین است؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا نگران این هستید که فرزندتان خیلی ساکت است یا صداهایی را که بچه های دیگر در می آورند، در نمی آورد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر





تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:



نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودکان دو صدای مشابه مانند «با، با»، «دا، دا» یا «گا، گا» از خودش در می آورد؟ (لازم نیست این صداها معنی خاصی داشته باشند.)
				۲. اگر از کودکان بخواهید تا یک بازی کودکانه (مانند دست دستی، بای بای، سرسری و دالی کردن) را انجام دهد، آیا حداقل یکی از این بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نشان دهید، انجام می دهد؟
				۳. آیا بدون اینکه شما از ایما و اشاره استفاده کنید، کودکان می توانند یک دستور ساده مانند «بیا اینجا»، «اونو به من بده» یا «اونو سر جایش بگذار» را انجام دهد؟
				۴. آیا کودکان سه کلمه مانند «ماما»، «بابا» و «دادا» را می گوید؟ (منظور از کلمه، صدا یا صداهایی است که کودک همواره بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به کار می برد.)
				۵. وقتی می پرسید «توپ (کلاه، کفش، غیره) کجاست؟»، آیا کودکان به آن نگاه می کند؟ (اطمینان حاصل کنید که شیء مورد نظر در اطراف وجود دارد. اگر یک شیء را می شناسد جواب «بله» را علامت بزنید.)
				۶. وقتی کودکان چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟
نمره کل ارتباطات				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. در حالیکه کودکان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد و دوباره به حالت ایستاده در آید؟ 
				۲. در حالیکه کودکان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا با حفظ تعادل (بدون اینکه بیافتد) خودش را پایین می آورد؟
				۳. آیا کودکان در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته است، کنار آن راه می رود؟
				۴. اگر هر دو دست کودکان را صرفاً برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن، چندین قدم بر می دارد؟ (اگر کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.) 
				۵. اگر یک دست کودکان را صرفاً برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا چندین قدم به جلو برمی دارد؟ (اگر کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.) 
				۶. آیا کودکان می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟
نمره حرکات درشت				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکان بعد از یک یا دو بار تلاش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر می دارد؟ (این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.) 
				۲. آیا کودکان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد. 
				۳. آیا کودکان اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بباندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				 <p>۴. آیا کودکتان بدون اینکه دستش را روی میز تکیه دهد، یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش، بر می دارد؟</p>
				 <p>۵. آیا کودکتان یک توپ کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می اندازد، گزینه «هنوز نه» را انتخاب کنید.)</p>
				۶. آیا کودکتان در ورق زدن صفحات یک کتاب کمک می کند؟ (می توانید یک ورق را بالا بگیرید که او بتواند آن را بگیرد.)
توجه: اگر به سوال ۴ «حرکات ظریف» پاسخ «بله» یا «گاهی» داده شد، به سوال شماره ۲ پاسخ «بله» بدهید.				
				نمره حرکات ظریف

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. در حالیکه کودکتان در هر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد، آیا آن دو اسباب بازی را به همدیگر می کوبد (مانند دست دستی کردن)؟
				۲. آیا کودکتان به یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافی (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر کودک) است، اشاره می کند یا سعی می کند آن را بگیرد؟
				۳. اگر کودکتان ببیند که شما یک اسباب بازی کوچک را زیر یک تکه کاغذ یا پارچه پنهان می کنید، آیا آن را پیدا می کند؟ (اطمینان حاصل کنید که اسباب بازی کاملاً مخفی شده است.)
				۴. اگر اسباب بازی کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید، آیا کودکتان نیز از کار شما تقلید می کند و یک اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می گذارد، هر چند که ممکن است اسباب بازی را از دستش رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در کاسه یا جعبه رها می کند نیز پاسخ «بله» را انتخاب کنید.)
				 <p>۵. آیا کودکتان دو اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می اندازد؟ (شما می توانید نحوه انجام این کار را نشان دهید.)</p>
				۶. وقتی با یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) روی کاغذ خط خطی کنید، آیا فرزندتان این کار را تقلید می کند و او هم خط خطی می کند؟ (اگر خودش به خودی خود خط خطی می کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
توجه: اگر به سوال ۵ «حل مسئله» پاسخ «بله» یا «گاهی» داده شد، به سوال شماره ۴ هم پاسخ «بله» بدهید.				
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند، حتی اگر اسباب بازی را رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۲. وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، زمانی که دستش در حلقه آستین قرار می گیرد، آیا دستش را درون آستین فرو می برد؟
				۳. زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست شما رها می کند؟
				۴. وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، آیا پایش را برای پوشیدن شلوار، جوراب یا کفشش بلند می کند؟
				۵. آیا کودکتان تویی را که برایش انداخته اید به طرف شما قل می دهد یا پرتاب می کند که شما بتوانید آن را به او برگردانید؟
				۶. آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟
				نمره شخصی اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه‌های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فرزند شما از هر دو دست و هر دو پایش به خوبی استفاده می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فرزندتان صداسازی می‌کند (از خودش صداهایی در می‌آورد) یا به نظر می‌رسد که کلماتی می‌سازد؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. وقتی به فرزندتان کمک می‌کنید که بایستد، آیا بیشتر اوقات کف پاهایش کاملاً روی زمین است؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا نگران این هستید که فرزندتان خیلی ساکت است یا صداهایی را که بچه‌های دیگر در می‌آورند، در نمی‌آورد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم‌شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:



نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودک تبدیل کنید.
- شاید نیاز باشد بیش از یک بار فعالیت های زیر را با کودک تمرین کنید.
- اگر اطمینان دارید که کودک می تواند فعالیت را انجام دهد، اما از آن سر باز می زند، پاسخ «بله» را انتخاب کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودک سه کلمه مانند «ماما»، «بابا» و «دادا» را می گوید؟ (منظور از کلمه، صدا یا صداهایی است که کودک همواره بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به کار می برد.)
				۲. وقتی کودک چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟
				۳. آیا کودک سرش را به معنی "بله" یا "خیر" تکان می دهد؟
				۴. آیا کودک به تصاویر کتاب اشاره می کند، دستش را روی آنها می کشد، یا سعی می کند آنها را بردارد؟
				۵. آیا کودک علاوه بر «ماما» و «بابا» چهار کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟
				۶. وقتی از کودک بخواهید، آیا به اتاق دیگری می رود که اسباب بازی یا شیئی آشنا را پیدا کند؟ (شما ممکن است بپرسید «توپت کجاست؟» یا بگویید «بلوزت را برام بیار» یا «برو پتویت را بیار».)
نمره کل ارتباطات				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. اگر هر دو دست کودک را صرفاً برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن، چندین قدم برمی دارد؟ (اگر کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ "بله" را علامت بزنید).
				۲. اگر یک دست کودک را صرفاً برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا چندین قدم به جلو برمی دارد؟ (اگر کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ «بله» را علامت بزنید).
				۳. آیا کودک می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟
				۴. آیا کودک از وسایل یا اثاث بزرگی مثل صندلی، چهار پایه، تخت، مبل یا پستی بالا می رود؟
				۵. آیا کودک برای برداشتن چیزی از روی زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمک و حمایتی دوباره می ایستد؟
				۶. آیا کودک برای حرکت کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟
نمره حرکات درشت				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودک بدون اینکه دستش را روی میز تکیه دهد، یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش، برمی دارد؟
				۲. آیا کودک یک توپ کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می اندازد، گزینه «هنوز نه» را انتخاب کنید.)
				۳. آیا کودک در ورق زدن صفحات یک کتاب کمک می کند؟ (می توانید یک ورق را بالا بگیرید که او بتواند آن را بگیرد.)
				۴. آیا کودک یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود ۲/۵ سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید.)
				۵. آیا کودک در تلاش برای نقاشی کشیدن، با نوک مداد شمعی (یا خودکار یا مداد) روی کاغذ علامت می گذارد؟
				۶. آیا کودک خودش به تنهایی سه مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟
نمره حرکات ظریف				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. اگر اسباب بازی کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید، آیا کودکان نیز از کار شما تقلید می‌کند و یک اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می‌گذارد، هر چند که ممکن است اسباب بازی را از دستش رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در کاسه یا جعبه رها می‌کند نیز پاسخ «بله» را انتخاب کنید.)
				۲. آیا کودکان دو اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می‌اندازد؟ 
				۳. وقتی با یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) روی کاغذ خط خطی کنید، آیا فرزندتان این کار را تقلید می‌کند و او هم خط خطی می‌کند؟ (اگر خودش به خودی خود خط خطی می‌کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۴. آیا کودکان می‌تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را داخل یک بطری کوچک و شفاف (مانند یک بطری پلاستیکی یا شیشه شیر بچه) بیاندازد؟
				۵. آیا کودکان چندین اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می‌اندازد؟ (شما می‌توانید نحوه انجام این کار را نشان دهید.)
				۶. بعد از اینکه نحوه کار را به کودکان نشان دادید، آیا او تلاش می‌کند یک اسباب بازی کوچک را که  کمی دور از دسترس است، با یک قاشق، چوب یا وسیله مشابه دیگر، به دست آورد؟

توجه: اگر برای سوال ۲ در حل مشکل پاسخ «بله» یا «گاهی» را انتخاب کردید، برای سوال ۱ هم گزینه ی «بله» را انتخاب کنید.

	نمره حل مسئله
--	---------------

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. وقتی به کودکان لباس می‌پوشانید، آیا پایش را برای پوشیدن شلوار، جوراب یا کفش بلند می‌کند؟
				۲. آیا کودکان توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما قل می‌دهد یا پرتاب می‌کند که شما بتوانید آن را به او برگردانید؟
				۳. آیا کودکان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه‌ای، با آن بازی می‌کند؟
				۴. آیا کودکان خودش با قاشق غذا می‌خورد، حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟
				۵. آیا کودکان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب، کلاه، کفش یا دستکش، در در آوردن لباسش کمک می‌کند؟
				۶. آیا کودکان با کشیدن دست یا لباسشان تلاش می‌کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟
	نمره شخصی اجتماعی			

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

- آیا فرزند شما از هر دو دست و هر دو پایش به خوبی استفاده می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر
- آیا فرزندتان صداسازی می‌کند (از خودش صداهایی در می‌آورد) یا به نظر می‌رسد که کلماتی می‌سازد؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر
- وقتی به فرزندتان کمک می‌کنید که بایستد، آیا بیشتر اوقات کف پاهایش کاملاً روی زمین است؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر
- آیا نگران این هستید که فرزندتان خیلی ساکت است یا صداهایی را که بچه‌های دیگر در می‌آورند، در نمی‌آورد؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر
- آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر
- آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر
- آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر
- آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید.
بله خیر
- آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید.
بله خیر





تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.
- شاید نیاز باشد بیش از یک بار فعالیت های زیر را با کودکان تمرین کنید.
- اگر اطمینان دارید که کودکان می توانند فعالیت را انجام دهد، اما از آن سرباز می زند، پاسخ «بله» را انتخاب کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودکان به تصاویر کتاب اشاره می کنند، دستش را روی آنها می کشد، یا سعی می کند آنها را بردارد؟
				۲. آیا کودکان علاوه بر «ماما» و «بابا» چهار کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟
				۳. وقتی کودکان چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟
				۴. وقتی از کودکان بخواهید، آیا به اتاق دیگری می رود که اسباب بازی یا شیئی آشنا را پیدا کند؟ (شما ممکن است بپرسید «توپت کجاست؟» یا بگویید «بلوزت را برام بیا» یا «برو توپت را بیا».)
				۵. آیا کودکان یک جمله دو کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی که شما یک عبارت دو کلمه ای، مثل «آب بده»، «نی نی بیا»، «بابا رفت»، «مامان بخور»، «بریم بازی»، «برو خونه»، یا «این چیه؟» را می گوید، آیا کودک هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند؟ (حتی اگر کلمات کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ «بله» را علامت بزنید).
				۶. آیا کودکان علاوه بر «ماما» و «بابا» هشت کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکان می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟
				۲. آیا کودکان از وسایل یا اثاث بزرگی مثل صندلی، چهار پایه، تخت، میز یا پشتی بالا می رود؟
				۳. آیا کودکان برای برداشتن چیزی از روی زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمک و حمایتی دوباره می ایستد؟
				۴. آیا کودکان برای حرکت کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟
				۵. آیا کودکان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟
				۶. آیا کودکان از چیزهایی مانند صندلی بالا می رود تا به چیزی که می خواهد برسد (مثلا برای این که یک اسباب بازی را از روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما «کمک» کند)؟
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکان در ورق زدن صفحات یک کتاب کمک می کند؟ (می توانید یک ورق را بالا بگیرید که او بتواند آن را بگیرد.)
				۲. آیا کودکان یک توپ کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می اندازد، گزینه «هنوز نه» را انتخاب کنید.) 
				۳. آیا کودکان یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود ۲/۵ سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).
				۴. آیا کودکان خودش به تنهایی سه مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟
				۵. آیا کودکان در تلاش برای نقاشی کشیدن، با نوک مداد شمعی (یا خودکار مداد) روی کاغذ علامت می گذارد؟ 
				۶. آیا کودکان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).
				نمره حرکات ظریف

حل مسئله			
امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله
			۱. وقتی با یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) روی کاغذ خط خطی کنید، آیا فرزندتان این کار را تقلید می‌کند و او هم خط خطی می‌کند؟ (اگر خودش به خودی خود خط خطی می‌کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
			۲. آیا کودکتان می‌تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را داخل یک بطری کوچک و شفاف (مانند یک بطری پلاستیکی یا شیشه شیر بچه) بیاندازد؟
			۳. آیا کودکتان چندین اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می‌اندازد؟ (شما می‌توانید نحوه انجام این کار را نشان دهید.)
			۴. بعد از اینکه نحوه کار را به کودکتان نشان دادید، آیا او تلاش می‌کند یک اسباب بازی کوچک  را که کمی دور از دسترس است، با یک قاشق، چوب یا وسیله مشابه دیگر، به دست آورد؟
			۵. بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می‌کند؟
			۶. وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می‌افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می‌کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (می‌توانید نحوه انجام این کار را نشان دهید.)
توجه: اگر برای سوال ۵ در حل مشکل پاسخ «بله» یا «گاهی» را انتخاب کردید، برای سوال ۱ هم «بله» را انتخاب کنید.			
نمره حل مسئله			
شخصی - اجتماعی			
امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله
			۱. آیا کودکتان خودش با قاشق غذا می‌خورد، حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟
			۲. آیا کودکتان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب، کلاه، کفش یا دستکش، در در آوردن لباسش کمک می‌کند؟
			۳. آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه‌ای، با آن بازی می‌کند؟
			۴. وقتی کودکتان در آینه به خودش نگاه می‌کند، آیا یک اسباب بازی را به تصویر خودش تعارف می‌کند؟
			۵. کودکتان با کشیدن دست یا لباس‌تاش تلاش می‌کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟
			۶. وقتی کودکتان به کمک نیاز دارد، مثلاً برای کوک کردن یک اسباب بازی یا باز کردن درب یک قوطی، آیا به سراغ شما می‌آید؟
نمره شخصی اجتماعی			

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می‌کنید فرزندتان خوب می‌شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می‌کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می‌گوید را می‌فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا فکر می‌کنید فرزندتان مانند دیگر بچه‌های همسنش راه می‌رود، می‌دود و از چیزها بالا می‌رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا درباره‌ی بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:



نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------



- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودک تبدیل کنید.
- شاید نیاز باشد بیش از یک بار فعالیت های زیر را با کودک تمرین کنید.
- اگر اطمینان دارید که کودک می تواند فعالیت را انجام دهد، اما از آن سر باز می زند، پاسخ «بله» را انتخاب کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. کودکتان چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟
				۲. وقتی از کودکتان بخواهید، آیا به اتاق دیگری می رود که اسباب بازی یا شیئی آشنا را پیدا کند؟ (شما ممکن است بپرسید «توپت کجاست؟» یا بگویید «بلوزت را برام بیار» یا «برو پتویت را بیار».)
				۳. کودکتان علاوه بر «ماما» و «بابا» هشت کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟
				۴. آیا کودکتان یک جمله دو کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی که شما یک عبارت دو کلمه ای، مثل «آب بده»، «نی نی بیا»، «بابا رفت»، «مامان بخور»، «بریم بازی»، «برو خونه»، یا «این چیه؟» را می گوید، آیا کودک هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند؟ (حتی اگر کلمات کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ «بله» را علامت بزنید).
				۵. آیا بدون اینکه شما به فرزندتان نشان دهید، وقتی می گوید «پیشی را نشون بده» یا می پرسد «هاپو کو؟»، کودکتان با انگشتش به تصویر درست اشاره می کند؟ (اگر یک تصویر را هم درست تشخیص می دهد کافی است.)
				۶. آیا کودکتان دو یا سه کلمه که مفاهیم مختلفی را می رسانند، با هم می گوید؟ مثل «هاپو ببین»، «مامان اومد خونه»، یا «پیشی رفت»؟ (ترکیب هایی از کلمات مثل «بای بای»، «خیلی خوب»، «تموم شد» و «این چیه؟» که تنها یک مفهوم را می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب کنید). لطفاً یک نمونه از کلمات ترکیبی که کودکتان بکار می برد، را بیان کنید:
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. کودکتان برای برداشتن چیزی از روی زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمک و حمایتی دوباره می ایستد؟
				۲. آیا کودکتان برای حرکت کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟
				۳. آیا کودکتان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟
				۴. کودکتان از چیزهایی مانند صندلی بالا می رود تا به چیزی که می خواهد برسد (مثلاً برای این که یک اسباب بازی را از روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما «کمک» کند)؟
				۵. اگر یک دست کودکتان را بگیرید، آیا از پله ها پایین می رود؟ علاوه بر گرفتن دست مادر او می تواند دستش را به دیوار یا نرده ها هم بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).
				۶. وقتی به کودکتان نشان می دهید که چطور یک توپ بزرگ را شوت کند، آیا تلاش می کند که با حرکت دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ (اگر فرزندتان می تواند به خوبی توپ را شوت کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید).
				نمره حرکات درشت



امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				 <p>۱. آیا کودکتان یک توپ کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می‌کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می‌اندازد، گزینه «هنوز نه» را انتخاب کنید.)</p>
				<p>۲. آیا کودکتان یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار می‌دهد؟ (می‌توانید از قرقه، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود ۲/۵ سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید.)</p>
				 <p>۳. آیا کودکتان در تلاش برای نقاشی کشیدن، با نوک مداد شمعی (یا خودکار یا مداد) روی کاغذ علامت می‌گذارد؟</p>
				<p>۴. آیا کودکتان خودش به تنهایی سه لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می‌دهد؟</p>
				<p>۵. آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می‌زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند.)</p>
				<p>۶. آیا کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می‌برد، طوری که معمولاً غذا از آن نریزد؟</p>
				نمره حرکات ظریف

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				<p>۱. آیا کودکتان چندین اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می‌اندازد؟ (شما می‌توانید نحوه انجام این کار را نشان دهید.)</p>
				 <p>۲. بعد از اینکه نحوه کار را به کودکتان نشان دادید، آیا او تلاش می‌کند یک اسباب بازی کوچک را که کمی دور از دسترس است، با یک قاشق، چوب یا وسیله مشابه دیگر، به دست آورد؟</p>
				<p>۳. وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می‌افتد، آیا کودکتان بطری را سرشته می‌کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (می‌توانید نحوه انجام این کار را نشان دهید.)</p>
				<p>۴. بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می‌کند؟</p>
				<p>۵. بعد از این که می‌بیند شما با مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) خطی از بالا به پایین کاغذ رسم می‌کنید، آیا با کشیدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، کار شما را تقلید می‌کند؟ (اگر فرزندتان خط خطی می‌کند پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید.)</p>  <p>Count as "yes" Count as "not yet"</p>
				<p>۶. یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می‌افتد، آیا کودکتان بطری را سرشته می‌کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (نحوه انجام این کار را نشان ندهید.)</p>
				توجه: اگر برای سوال ۶ در حل مشکل پاسخ «بله» یا «گاهی» را انتخاب کردید، برای سوال ۳ هم «بله» را انتخاب کنید.
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				<p>۱. کودکتان در آینه به خودش نگاه می‌کند، آیا یک اسباب بازی را به تصویر خودش تعارف می‌کند؟</p>
				<p>۲. آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه‌ای، با آن بازی می‌کند؟</p>
				<p>۳. آیا کودکتان با کشیدن دست یا لباس‌تلاش می‌کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟</p>
				<p>۴. وقتی کودکتان به کمک نیاز دارد، مثلاً برای کوک کردن یک اسباب بازی یا باز کردن درب یک قوطی، آیا به سراغ شما می‌آید؟</p>
				<p>۵. آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می‌نوشد و بعد آن را طوری پایین می‌گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟</p>
				<p>۶. آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می‌دهید، در می‌آورد، مانند پاک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟</p>
				نمره شخصی اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می کنید فرزندتان خوب می شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها بالا می رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر




تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:



نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودکتان انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکتان تبدیل کنید.
- شاید نیاز باشد بیش از یک بار فعالیت های زیر را با کودکتان تمرین کنید.
- اگر اطمینان دارید که کودکتان می تواند فعالیت را انجام دهد، اما از آن سر باز می زند، پاسخ «بله» را انتخاب کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودکتان یک جمله دو کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی که شما یک عبارت دو کلمه ای، مثل «آب بده»، «نی نی بیا»، «بابا رفت»، «مامان بخور»، «بریم بازی»، «برو خونه»، یا «این چیه؟» را می گوید، آیا کودک هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند؟ (حتی اگر کلمات کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ «بله» را علامت بزنید)
				۲. آیا کودکتان علاوه بر «ماما» و «بابا» هشت کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟
				۳. آیا بدون اینکه شما به فرزندتان نشان دهید، وقتی می گوید «پیشی را نشون بده» یا می پرسید «هاپو کو؟»، کودکتان با انگشتش به تصویر درست اشاره می کند؟ (اگر یک تصویر را هم درست تشخیص می دهد کافی است.)
				۴. اگر به تصویر یک توپ (گره، فنجان، کلاه و غیره) اشاره کنید و از کودکتان بپرسید «این چیه؟»، آیا او حداقل نام یک تصویر را درست می گوید؟
				۵. آیا کودکتان بدون این که شما با ایما و اشاره کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی کنید، می تواند حداقل سه مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟ الف) «اسباب بازی رو روی میز بذار» ب) «در رو ببند» ج) «یه توپ برام بیا» د) «ماشینت رو پیدا کن» ه) «دستمو بگیر» و) «کتابت رو بردار»
				۶. آیا کودکتان دو یا سه کلمه که مفاهیم مختلفی را می رسانند، با هم می گوید؟ مثل «هاپو ببین»، «مامان اومد خونه»، یا «پیشی رفت»؟ (ترکیب هایی از کلمات مثل «بای بای»، «خیلی خوب»، «تموم شد» و «این چیه؟» که تنها یک مفهوم را می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب کنید). لطفاً یک نمونه از کلمات ترکیبی که کودکتان بکار می برد، را بیان کنید:
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکتان از چیزهایی مانند صدلی بالا می رود تا به چیزی که می خواهد برسد (مثلاً برای این که یک اسباب بازی را از روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما «کمک» کند)؟
				۲. آیا کودکتان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟
				۳. اگر یک دست کودکتان را بگیرید، آیا از پله ها پایین می رود؟ علاوه بر گرفتن دست مادر او می تواند دستش را به دیوار یا نرده ها هم بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).
				۴. وقتی به کودکتان نشان می دهید که چطور یک توپ بزرگ را شوت کند، آیا تلاش می کند که با حرکت دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ (اگر فرزندتان می تواند به خوبی توپ را شوت کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید).
				۵. آیا کودکتان نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دوبدانش را متوقف سازد؟
				۶. آیا کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این کار نرده یا دیوار را بگیرد.
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکتان در تلاش برای نقاشی کشیدن، با نوک مداد شمعی (یا خودکار یا مداد) روی کاغذ علامت می‌گذارد؟ 
				۲. آیا کودکتان خودش به تنهایی سه لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می‌دهد؟ (می‌توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود ۲/۵ سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).
				۳. آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می‌زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).
				۴. آیا کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می‌برد، طوری که معمولاً غذا از آن نریزد؟
				۵. آیا کودکتان خودش به تنهایی شش لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می‌دهد؟
				۶. کودکتان وقتی تلاش می‌کند دستگیره‌ی تویی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی میج دستش استفاده می‌کند؟
نمره حرکات ظریف				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می‌کند؟
				۲. کودکتان بعد از این که می‌بیند شما با مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) خطی از بالا به پایین کاغذ رسم می‌کنید، آیا با کشیدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، کار شما را تقلید می‌کند؟ (اگر فرزندتان خط خطی می‌کند پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید). 
				۳. اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می‌کند؟ الف. دهانتان را باز کنید و ببینید ب. پلک بزنید ج. لاله گوش خود را بکشید د. گونه خود را نوازش کنید.
				۴. اگر یک بطری، قاشق یا مداد را وارونه به کودکتان بدهید، آیا آن را به حالت صحیح برمی‌گرداند تا بتواند از آن به درستی استفاده کند؟
				۵. در حالی که کودکتان نگاه می‌کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر می‌چیند؟ (می‌توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید). 
				۶. اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی‌رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می‌کند تا روی آن بایستد که دستش برسد (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه).
نمره حل مسئله				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. آیا کودکتان خودش با قاشق غذا می‌خورد، حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟
				۲. آیا کودکتان با کشیدن دست یا لباس‌تان تلاش می‌کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟
				۳. آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می‌نوشد و بعد آن را طوری پایین می‌گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟
				۴. آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می‌دهید، در می‌آورد، مانند پاک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟
				۵. وقتی کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می‌کند، آیا وانمود می‌کند که آن را در آغوش تاب می‌دهد، به او غذا می‌دهد، پوشکش را عوض می‌کند، او را می‌خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می‌دهد؟
				۶. آیا کودکتان می‌تواند با چنگال غذا بخورد؟
نمره شخصی اجتماعی				

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می کنید فرزندتان خوب می شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها بالا می رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا درباره ی بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر




تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:


نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودکتان انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکتان تبدیل کنید.
- شاید نیاز باشد بیش از یک بار فعالیت های زیر را با کودکتان تمرین کنید.
- اگر اطمینان دارید که کودکتان می تواند فعالیت را انجام دهد، اما از آن سر باز می زند، پاسخ «بله» را انتخاب کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. اگر به یک توپ (یا گربه، ماشین، کلاه و غیره) یا تصویر آنها اشاره کنید و از کودکتان بپرسید «این چیه؟»، آیا او حداقل نام یک تصویر را درست می گوید؟
				۲. آیا کودکتان بدون این که شما با ایما و اشاره کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی کنید، می تواند حداقل سه مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟ الف) «اسباب بازی رو روی میز بذار» ب) «در رو ببند» ج) «یه توپ برام بیار» د) «ماشینت رو پیدا کن» ه) «دستمو بگیر» و) «کتابت رو بردار»
				وقتی از کودکتان می خواهید که با انگشتش به بینی اش، چشمهایش، موهایش، پاهایش، گوشهایش و غیره اشاره کند، آیا حداقل به هفت قسمت از اعضای بدن درست اشاره می کند؟ (او می تواند به اعضای بدن خودش، شما یا یک عروسک اشاره کند. اگر به سه تا شش جزء از بدن درست اشاره می کند، گزینه ی «گاهی» را انتخاب کنید.)
				۴. آیا کودکتان علاوه بر «مامان» و «بابا» پانزده کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟
				۵. آیا کودکتان حداقل دو مورد از کلماتی مثل "مال من"، "من"، "تو(شما)" را بطور صحیح بکار می برد؟
				۶. آیا کودکتان دو یا سه کلمه که مفاهیم مختلفی را می رسانند، با هم می گوید؟ مثل "هاپو ببین"، "مامان اومد خونه"، یا "پیشی رفت"؟ (ترکیب هایی از کلمات مثل "بای بای"، "خیلی خوب"، "توم شد" و "این چیه؟" که تنها یک مفهوم را می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب کنید). لطفاً یک نمونه از کلمات ترکیبی که کودکتان بکار می برد، را بیان کنید:
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. وقتی به کودکتان نشان می دهید که چگونه یک توپ بزرگ را شوت کند، آیا تلاش می کند که با حرکت دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ (اگر فرزندتان می تواند به خوبی توپ را شوت کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۲. آیا کودکتان نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دويدنش را متوقف سازد؟
				۳. اگر یک دست کودکتان را بگیرید، آیا از پله ها پایین می رود؟ علاوه بر گرفتن دست مادر او می تواند دستش را به دیوار یا نرده ها هم بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).
				۴. آیا کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این کار نرده یا دیوار را بگیرد.
				۵. آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟
				۶. آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟
				توجه: اگر به پرسش ۶ در حرکات اصلی جواب «بله» یا «گاهی» داده اید، به سوال ۱ هم جواب «بله» بدهید.
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکتان فاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری که معمولاً غذا از آن نریزد؟
				۲. آیا کودکتان خودش به تنهایی شش لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود ۲/۵ سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).
				۳. کودکتان وقتی تلاش می کند دستگیره ی تویی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟
				۴. آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).
				۵. آیا کودکتان کلید چراغها را روشن و خاموش می کند؟
				۶. آیا کودکتان می تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند؟
				
				نمره حرکات ظریف

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می کند؟
				۲. در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهارشیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).
				۳. آیا کودکتان وانمود می کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟ برای مثال، آیا کودکتان یک فنجان را روی گوشش می گیرد و وانمود می کند که گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می گذارد و وانمود می کند که یک کلاه است؟ یا از یک اسباب بازی کوچک برای هم زدن غذا استفاده می کند؟
				۴. کودکتان بعد از این که می بیند شما با مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) خطی از بالا به پایین کاغذ رسم می کنید، آیا با کشیدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، کار شما را تقلید می کند؟ (اگر فرزندتان خط خطی می کند پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید).
				
				۵. وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (نحوه انجام این کار را نشان ندهید). (می توانید از یک بطری یا شیشه شیر کودک استفاده کنید).
				۶. اگر یک بطری، فاشق یا مداد را وارونه به کودکتان بدهید، آیا آن را به حالت صحیح برمی گرداند تا بتواند از آن به درستی استفاده کند؟
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می دهید، در می آورد، مانند پاک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟
				۲. اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟ الف. دهانتان را باز کنید و ببندید. ب. پلک بزنید. ج. لاله گوش خود را بکشید. د. گونه خود را نوازش کنید.
				۳. آیا کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟
				۴. آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوشد و بعد آن را طوری پایین می گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟
				۵. وقتی کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند، آیا وانمود می کند که آن را در آغوش تاب می دهد، به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟
				۶. آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟
				نمره شخصی، اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می کنید فرزندتان خوب می شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها بالا می رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------


- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودکتان انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکتان تبدیل کنید.
- شاید نیاز باشد بیش از یک بار فعالیت های زیر را با کودکتان تمرین کنید.
- اگر اطمینان دارید که کودکتان می تواند فعالیت را انجام دهد، اما از آن سر باز می زند، پاسخ «بله» را انتخاب کنید.



امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا بدون اینکه شما به فرزندتان نشان دهید، وقتی می گوئید «پیشی را نشون بده» یا می پرسید «هاپو کو؟»، کودکتان با انگشتش به تصویر درست اشاره می کند؟ (اگر یک تصویر را هم درست تشخیص می دهد کافی است.)
				۲. آیا کودکتان یک جمله دو کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی که شما یک عبارت دو کلمه ای، مثل «آب بده»، «نی نی بیا»، «بابا رفت»، «مامان بخور»، «بریم بازی»، «برو خونه»، یا «این چیه؟» را می گوئید، آیا کودک هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند؟ (حتی اگر کلمات کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ «بله» را علامت بزنید)
				۳. آیا کودکتان بدون این که شما با ایما و اشاره کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی کنید، می تواند حداقل سه مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟ الف) «اسباب بازی رو روی میز بذار» ب) «در رو ببند» ج) «به توپ برام بیار» د) «ماشینت رو پیدا کن» ه) «دستمو بگیر» و) «کتابت رو بردار»
				۴. اگر به یک توپ (یا گربه، ماشین، کلاه و...) یا تصویر آنها اشاره کنید و از کودکتان بپرسید «این چیه؟»، آیا او حداقل نام یک تصویر را درست می گوید؟
				۵. آیا کودکتان دو یا سه کلمه که مفاهیم مختلفی را می رسانند، با هم می گوید؟ مثل «هاپو ببین»، «مامان اومد خونه»، یا «پیشی رفت»؟ (ترکیب هایی از کلمات مثل «بای بای»، «خیلی خوب»، «تموم شد» و «این چیه؟» که تنها یک مفهوم را می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب کنید). لطفاً یک نمونه از کلمات ترکیبی که کودکتان بکار می برد، را بیان کنید:
				۶. آیا کودکتان حداقل دو مورد از کلماتی مثل «مال من»، «من»، «تو (شما)» را بطور صحیح بکار می برد؟
نمره کل ارتباطات				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. اگر یک دست کودکتان را بگیرید، آیا از پله ها پایین می رود؟ علاوه بر گرفتن دست مادر او می تواند دستش را به دیوار یا نرده ها هم بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).
				۲. وقتی به کودکتان نشان می دهید که چگونه یک توپ بزرگ را شوت کند، آیا تلاش می کند که با حرکت دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ (اگر فرزندتان می تواند به خوبی توپ را شوت کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۳. آیا کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این کار نرده یا دیوار را بگیرد.
				۴. آیا کودکتان نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دودنش را متوقف سازد؟
				۵. آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟
				۶. آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟

توجه: اگر به پرسش ۶ در حرکات اصلی جواب «بله» یا «گاهی» داده اید، به سوال ۲ هم جواب «بله» بدهید.

نمره حرکات درشت			
-----------------	--	--	--

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکتان فاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری که معمولاً غذا از آن نریزد؟
				۲. آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).
				۳. آیا کودکتان وقتی تلاش می کند دستگیره ی تویی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی میج دستش استفاده می کند؟
				۴. آیا کودکتان کلید چراغ ها را روشن و خاموش می کند؟
				۵. آیا کودکتان خودش به تنهایی هفت لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود ۲/۵ سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).
				۶. آیا کودکتان می تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند؟ 
				نمره حرکات ظریف

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. کودکتان بعد از این که می بیند شما با مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) خطی از بالا به پایین کاغذ رسم می کنید، آیا با کشیدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، کار شما را تقلید می کند؟ (اگر فرزندان خط خطی می کند پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید). 
				۲. وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (نحوه انجام این کار را نشان ندهید). (می توانید از یک بطری یا شیشه شیر کودک استفاده کنید).
				۳. آیا کودکتان وانمود می کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟ برای مثال، آیا کودکتان یک فنجان را روی گوشش می گیرد و وانمود می کند که گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می گذارد و وانمود می کند که یک کلاه است؟ یا از یک اسباب بازی کوچک برای هم زدن غذا استفاده می کند؟
				۴. کودکتان چیزها را سر جای خودشان قرار می دهد؟ برای مثال آیا می داند که اسباب بازی هایش باید در سبد یا قفسه ی اسباب بازی ها قرار گیرد و پتویش باید روی تخت و ظرف ها باید در آشپزخانه باشند؟
				۵. اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می کند تا روی آن بایستد که دستش برسد (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه).
				۶. در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید). 
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوشد و بعد آن را طوری پایین می گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟
				۲. آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می دهید، در می آورد، مانند پاک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟
				۳. آیا کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟
				۴. وقتی کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند، آیا وانمود می کند که آن را در آغوش تاب می دهد، به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟
				۵. آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟
				۶. آیا کودکتان برای نامیدن خود بیشتر اوقات از کلمه «من» به جای اسم خودش، استفاده می کند؟ برای مثال بیشتر می گوید «من این کار را کردم» تا اینکه بگوید «مریم این کار را کرد»؟
				نمره شخصی اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می کنید فرزندتان خوب می شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها بالا می رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر






تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:


نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودکتان انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکتان تبدیل کنید.
- شاید نیاز باشد بیش از یک بار فعالیت های زیر را با کودکتان تمرین کنید.
- اگر اطمینان دارید که کودکتان می تواند فعالیت را انجام دهد، اما از آن سر باز می زند، پاسخ «بله» را انتخاب کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودکتان بدون این که شما با ایما و اشاره کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی کنید، می تواند حداقل سه مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟ الف) «اسباب بازی رو روی میز بذار» ب) «در رو ببند» ج) «یه توپ برام بیار» د) «ماشینت رو پیدا کن» ه) «دستمو بگیر» و) «کتابت رو بردار»
				۲. اگر به یک توپ (یا گربه، ماشین، کلاه و غیره) یا تصویر آنها اشاره کنید و از کودکتان بپرسید «این چیه؟»، آیا او حداقل نام یک تصویر را درست می گوید؟
				۳. وقتی از کودکتان می خواهید که با انگشتش به بینی اش، چشمهایش، موهایش، پاهایش، گوشهایش و غیره اشاره کند، آیا حداقل به هفت قسمت از اعضای بدن درست اشاره می کند؟ (او می تواند به اعضای بدن خودش، شما یا یک عروسک اشاره کند. اگر به سه تا شش جزء از بدن درست اشاره می کند، گزینه ی «گاهی» را انتخاب کنید.)
				۴. آیا کودکتان حداقل دو مورد از کلماتی مثل «مال من»، «من»، «تو (شما)» را بطور صحیح بکار می برد؟
				۵. آیا کودکتان با سه یا چهار کلمه جمله می سازد؟ لطفاً مثال بزنید:
				۶. بدون اینکه از هر گونه اشاره با انگشت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی کودکتان استفاده کنید، به او بگویید «کتاب را روی میز بگذار» و «کفش را زیر صندلی بگذار». آیا کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می دهد؟
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این کار نرده یا دیوار را بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).
				۲. آیا کودکتان نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دویدنش را متوقف سازد؟
				۳. آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟
				۴. آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟
				۵. آیا کودکتان می تواند جفت پا (به طوری که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود)، حداقل حدود ۱۵ سانتی متر به جلو بپرد؟
				۶. آیا کودکتان با گذاشتن یک پا روی هر پله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعدی)، از پله ها بالا می رود؟ ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد.
				توجه: اگر به پرسش ۶ در حرکات اصلی جواب «بله» یا «گاهی» داده اید، به سوال ۱ هم جواب «بله» بدهید.
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکتان وقتی تلاش می‌کند دستگیره‌ی تویی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می‌کند؟
				۲. آیا کودکتان کلید چراغها را روشن و خاموش می‌کند؟
				۳. بعد از این که شما جلوی چشم کودکتان با مداد شمعی یا مداد یا خودکار خطی از بالا به پایین صفحه رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا کودکتان با کشیدن تنها یک خط در جهت عمودی (از بالا به پایین صفحه کاغذ)، کار شما را تقلید می‌کند؟ Count as "yes"  Count as "not yet" 
				۴. آیا کودکتان خودش به تنهایی هفت لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می‌دهد؟ (می‌توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود ۲/۵ سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).
				۵. آیا کودکتان می‌تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه‌ی تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند؟ 
				۶. کنار کودکتان بنشینید. بعد از این که شما جلوی چشم کودکتان خطی در جهت افقی (از سمت راست به چپ صفحه یا چپ به راست) رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندتان با کشیدن تنها یک خط در جهت افقی (راست به چپ یا چپ به راست)، کار شما را تقلید می‌کند؟ Count as "yes"  Count as "not yet" 
				نمره حرکات ظریف

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. آیا کودکتان وانمود می‌کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟ برای مثال، آیا کودکتان یک فنجان را روی گوشش می‌گیرد و وانمود می‌کند که گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می‌گذارد و وانمود می‌کند که یک کلاه است؟ یا از یک اسباب بازی کوچک برای هم زدن غذا استفاده می‌کند؟
				۲. آیا کودکتان چیزها را سر جای خودشان قرار می‌دهد؟ برای مثال آیا می‌داند که اسباب بازی هایش باید در سبد یا قفسه‌ی اسباب بازی ها قرار گیرد و پتویش باید روی تخت و ظرف ها باید در آشپزخانه باشند؟
				۳. زمانی که به آینه نگاه می‌کند، بپرسید «... کجاست؟» (نام کودکتان را بگویید). آیا کودکتان به تصویرش در آینه اشاره می‌کند؟
				۴. اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی‌رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می‌کند تا روی آن بایستد که دستش برسد (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه).
				۵. در حالی که کودکتان نگاه می‌کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می‌چیند؟ (می‌توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).
				۶. زمانی که به تصویر اشاره می‌کنید و از کودکتان می‌پرسید «این چیه؟» (آیا کودک کلمه ای را می‌گوید که به معنی یک شخص، باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل «نی نی»، «پسر»، «آقا»، «دختر»، «بابا»، «گزینه «بله» را انتخاب کنید.) لطفاً پاسخ کودکتان را در اینجا بنویسید: 
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می‌کند؟ الف. دهانتان را باز کنید و ببندید ب. پلک بزنید ج. لاله گوش خود را بکشید د. گونه خود را نوازش کنید.
				۲. آیا کودکتان می‌تواند با چنگال غذا بخورد؟
				۳. کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می‌کند، آیا وانمود می‌کند که آن را در آغوش تاب می‌دهد، به او غذا می‌دهد، پوشکش را عوض می‌کند، او را می‌خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می‌دهد؟
				۴. آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می‌دهد، آن را دور اشیاء حرکت می‌دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می‌آید؟

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۵. آیا کودکان برای نامیدن خود بیشتر اوقات از کلمه «من» به جای اسم خودش، استفاده می‌کند؟ برای مثال بیشتر می‌گوید «من این کار را کردم» تا اینکه بگوید «مریم این کار را کرد»؟
				۶. آیا کودکان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می‌پوشد؟
				نمره شخصی. اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می‌کنید فرزندتان خوب می‌شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می‌کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می‌گوید را می‌فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا فکر می‌کنید فرزندتان مانند دیگر بچه‌های همسنش راه می‌رود، می‌دود و از چیزها بالا می‌رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر















تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:




نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. اگر به یک توپ (یا گربه، ماشین، کلاه و غیره) یا تصویر آنها اشاره کنید و از کودکان بپرسید «این چیست؟»، آیا او حداقل نام یک تصویر را درست می‌گوید؟
				۲. کودکان بدون این که شما با ایما و اشاره کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی کنید، می‌تواند حداقل سه مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟ الف) «اسباب بازی رو روی میز بذار» ب) «در رو ببند» ج) «یه توپ برام بیار» د) «ماشینت رو پیدا کن» ه) «دستمو بگیر» و) «کتابت رو بردار»
				۳. وقتی از کودکان می‌خواهید که با انگشتش به بینی اش، چشمهایش، موهایش، پاهایش، گوش هایش و غیره اشاره کند، آیا حداقل به هفت قسمت از اعضای بدن درست اشاره می‌کند؟ (او می‌تواند به اعضای بدن خودش، شما یا یک عروسک اشاره کند. اگر به سه تا شش جزء از بدن درست اشاره می‌کند، گزینه «گاهی» را انتخاب کنید.)
				۴. آیا کودکان با سه یا چهار کلمه جمله می‌سازد؟ لطفاً مثال بزنید:
				۵. اینکه از هر گونه اشاره با انگشت یا حرکت بدنشان برای راهنمایی کودکان استفاده کنید، به او بگویید «کتاب را روی میز بگذار» و «کفش را زیر صندلی بگذار». آیا کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می‌دهد؟
				۶. زمانی که کودک به یک کتاب تصویردار نگاه می‌کند، آیا به شما توضیح می‌دهد که در هر تصویر چه کاری انجام می‌شود یا چه چیزی اتفاق می‌افتد؟ (برای مثال «هاپ هاپ می‌کنه»، «می دوه»، «می خوره»، «گریه می‌کنه») شما می‌توانید بپرسید، این سگ (یا پسر) داره چکار می‌کنه؟
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکان نسبتاً خوب می‌دود و می‌تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دویدنش را متوقف سازد؟ 
				۲. آیا کودکان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می‌رود؟ او ممکن است برای این کار نرده یا دیوار را بگیرد. (این صحنه را می‌توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید). 
				۳. آیا کودکان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟ 
				۴. آیا کودکان طوری می‌پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می‌پرد)؟ 
				۵. کودکان با گذاشتن یک پا روی هر پله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعدی)، از پله ها بالا می‌رود؟ ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد. 
				۶. آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود ۱ ثانیه روی یک پایش می‌ایستد؟ 
				توجه: اگر به پرسش ۵ در حرکات اصلی جواب «بله» یا «گاهی» داده اید، به سوال ۲ هم جواب «بله» بدهید.
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکان وقتی تلاش می‌کند دستگیره‌ی تویی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می‌کند؟
				۲. بعد از این که شما جلوی چشم کودکان با مداد شمی یا مداد یا خودکار خطی از بالا به پایین صفحه رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا کودکان با کشیدن تنها یک خط در جهت عمودی (از بالا به پایین صفحه کاغذ)، کار شما را تقلید می‌کند؟ Count as "yes"  Count as "not yet" 
				۳. آیا کودکان می‌تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند؟ 
				۴. کنار کودکان بنشینید. بعد از این که شما جلوی چشم کودکان خطی در جهت افقی (از سمت راست به چپ صفحه یا چپ به راست) رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندتان با کشیدن تنها یک خط در جهت افقی (راست به چپ یا چپ به راست)، کار شما را تقلید می‌کند؟ Count as "yes"  Count as "not yet" 
				۵. بعد از این که جلوی چشمان کودکان یک دایره رسم کردید، از او بخواهید که مانند شما دایره ای بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا کودکان با کشیدن یک دایره، کار شما را تقلید می‌کند؟ Count as "yes"  Count as "not yet" 
				۶. آیا کودکان صفحات یک کتاب را یکی یکی ورق می‌زند؟
نمره حرکات ظریف				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. زمانی که به آینه نگاه می‌کند، بپرسید «..... کجاست؟» (نام کودکان را بگویید). آیا کودکان به تصویرش در آینه اشاره می‌کند؟ 
				۲. اگر کودکان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی‌رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می‌کند تا روی آن بایستد که دستش برسد (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه).
				۳. در حالی که کودکان نگاه می‌کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می‌چیند؟ (می‌توانید از قورقه های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید). 
				۴. زمانی که به تصویر اشاره می‌کنید و از کودکان می‌پرسید «این چیه؟» آیا کودک کلمه ای را می‌گوید که به معنی یک شخص، باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل «نی نی»، «پسر»، «آقا»، «دختر»، «بابا»، «گزینه «بله» را انتخاب کنید.) لطفاً پاسخ کودکان را در اینجا بنویسید: 
				۵. زمانی که می‌گویید «بگو هفت، سه»، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می‌کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلاً بگویید، «بگو هشت، دو». اگر کودکان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.
				۶. پس از اینکه کودکان یک نقاشی کشید، حتی اگر یک خط خطی ساده باشد، آیا به شما می‌گوید که چه چیزی کشیده است؟ (می‌توانید برای ترغیب کودک، بگویید «برام بگو چی کشیدی» یا بپرسید «این چیه؟»)
نمره حل مسئله				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا کودکان حداقل یکی از آنها را تقلید می‌کند؟ الف. دهانتان را باز کنید و ببندید ب. پلک بزنید ج. لاله گوش خود را بکشید د. گونه خود را نوازش کنید.
				۲. کودکان از قاشق برای غذا خوردن استفاده می‌کند و تنها کمی از غذا را می‌ریزد؟
				۳. آیا کودکان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می‌دهد، آن را دور اشیاء حرکت می‌دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می‌آید؟

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۴. آیا کودکان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می پوشد؟
				۵. پس از اینکه پاهای کودکان را داخل پاچه های شلواری که تنگ نیست می کنید، آیا خودش شلوارش را کاملاً تا کمرش بالا می کشد؟
				۶. وقتی کودکان در آینه نگاه می کند و شما می پرسید «توی آینه کیه؟»، آیا در پاسخ می گوید «من» یا اسم خودش را بیان می کند؟
				نمره شخصی اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می کنید فرزندتان خوب می شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا دیگران بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها بالا می رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۱۰. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

















تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:




نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. وقتی از کودکان می‌خواهید که با انگشتش به بینی اش، چشم‌هایش، موهایش، پاهایش، گوش‌هایش و غیره اشاره کند، آیا حداقل به هفت قسمت از اعضای بدن درست اشاره می‌کند؟ (او می‌تواند به اعضای بدن خودش، شما یا یک عروسک اشاره کند. اگر به سه تا شش جزء از بدن درست اشاره می‌کند، گزینه ی «گاهی» را انتخاب کنید.)
				۲. آیا کودکان با سه یا چهار کلمه جمله می‌سازد؟ لطفاً مثال بزنید:
				۳. بدون اینکه از هرگونه اشاره با انگشت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی کودکان استفاده کنید، به او بگویید " کتاب را روی میز بگذار" و " کفش را زیر صندلی بگذار". آیا کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می‌دهد؟
				۴. زمانی که کودک به یک کتاب تصویردار نگاه می‌کند، آیا به شما توضیح می‌دهد که در هر تصویر چه کاری انجام می‌شود یا چه چیزی اتفاق می‌افتد؟ (برای مثال «هاپ هاپ می‌کنه»، «می دوه»، «می خوره»، «گریه می‌کنه») شما می‌توانید بپرسید، این سگ (یا پسر) داره چکار می‌کنه؟
				۵. به کودکان نشان دهید که یک لباس چگونه بالا و پایین می‌رود، و بگویید، «بین این بالا و پایین میره». زیپ را تا نیمه بکشید، و از کودک بخواهید تا آن را پایین بکشد. دوباره زیپ را تا نیمه بیاورید و از کودک بخواهید تا آن را بالا بکشد. چند بار این کار را انجام دهید و هر بار قبل از اینکه از فرزندتان بخواهید زیپ را بالا یا پایین بکشد، زیپ را برگردانید وسط. آیا به طور ثابت، هر بار که می‌گویید «بالا»، کودک زیپ را بالا می‌کشد و هر بار که می‌گویید «پایین»، کودک زیپ را پایین می‌کشد؟
				۶. زمانی که از کودکان می‌پرسید «اسمت چیه؟» آیا او نام خود یا اسمی که با آن صدایش می‌کنید، را می‌گوید؟
نمره کل ارتباطات				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکان نسبتاً خوب می‌دود و می‌تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دویدنش را متوقف سازد؟ 
				۲. آیا کودکان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟ 
				۳. آیا کودکان طوری می‌پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می‌پرد)؟ 
				۴. آیا کودکان با گذاشتن یک پا روی هر پله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعدی)، از پله‌ها بالا می‌رود؟ ممکن است که کودک دستش را به دیوار بگیرد (این صحنه را می‌توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید). 
				۵. آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود ۱ ثانیه روی یک پایش می‌ایستد؟ 
				۶. آیا کودکان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می‌برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می‌کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می‌کند، پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید). 
نمره حرکات درشت				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				<p>۱. بعد از این که شما جلوی چشم کودکان با مداد شمعی یا مداد یا خودکار خطی از بالا به پایین صفحه رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا کودکان با کشیدن تنها یک خط در جهت عمودی (از بالا به پایین صفحه کاغذ)، کار شما را تقلید می‌کند؟</p> <p>Count as "yes" </p> <p>Count as "not yet" </p>
				<p>۲. آیا کودکان می‌تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند؟</p> 
				<p>۳. کنار کودکان بنشینید. بعد از این که شما جلوی چشم کودکان خطی در جهت افقی (از سمت راست به چپ صفحه یا چپ به راست) رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندان با کشیدن تنها یک خط در جهت افقی (راست به چپ یا چپ به راست)، کار شما را تقلید می‌کند؟</p> <p>Count as "yes" </p> <p>Count as "not yet" </p>
				<p>۴. بعد از این که جلوی چشمان کودکان یک دایره رسم کردید، از او بخواهید که مانند شما دایره ای بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا کودکان با کشیدن یک دایره، کار شما را تقلید می‌کند؟</p> <p>Count as "yes" </p> <p>Count as "not yet" </p>
				<p>۵. آیا کودکان صفحات یک کتاب را یکی یکی ورق می‌زند؟</p>
				<p>۶. آیا کودکان سعی می‌کند که با قیچی ایمن و مخصوص کودکان، کاغذی را ببرد؟ لازم نیست که حتماً کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی که کاغذ را با یک دست نگه داشته است، قیچی را با دست دیگرش باز و بسته کند. (شما می‌توانید به کودکان نشان دهید که چگونه قیچی استفاده کند. زمانی که کودک از قیچی استفاده می‌کند کاملاً مراقب باشید تا خطری برایش پیش نیاید.)</p> 
				نمره حرکات ظریف

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				<p>۱. زمانی که به آینه نگاه می‌کنند، بپرسید «..... کجاست؟» (نام کودکان را بگویید). آیا کودکان به تصویرش در آینه اشاره می‌کند؟</p> 
				<p>۲. در حالی که کودکان نگاه می‌کنند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می‌چیند؟ (می‌توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).</p> 
				<p>۳. اگر کودکان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی‌رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می‌کند تا روی آن بایستد که دستش برسد (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه).</p>
				<p>۴. زمانی که به تصویر اشاره می‌کنید و از کودکان می‌پرسید «این چیه؟» آیا کودک کلمه ای را می‌گوید که به معنی یک شخص، باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل «نی نی»، «پسر»، «آقا»، «دختر»، «بابا»، «گزینه «بله» را انتخاب کنید). لطفاً پاسخ کودکان را در اینجا بنویسید:</p> 
				<p>۵. زمانی که می‌گویید «بگو هفت، سه»، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می‌کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلاً بگویید، «بگو هشت، دو». اگر کودکان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.</p>
				<p>۶. پس از اینکه کودکان یک نقاشی کشید، حتی اگر یک خط خطی ساده باشد، آیا به شما می‌گوید که چه چیزی کشیده است؟ (می‌توانید برای ترغیب کودک، بگویید «برام بگو چی کشیدی» یا بپرسید «این چیه؟»)</p>
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				<p>۱. آیا کودکان از قاشق برای غذا خوردن استفاده می‌کند و تنها کمی از غذا را می‌ریزد؟</p>
				<p>۲. آیا کودکان یک کامیون کوچک، کالسکه یا اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می‌دهد، آن را دور اشیاء حرکت می‌دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می‌آید؟</p>
				<p>۳. آیا کودکان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می‌پوشد؟</p>

شخصی - اجتماعی			
امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله
			۴. پس از اینکه پاهای کودکتان را داخل پاچه های شلواری که تنگ نیست می کنید، آیا خودش شلوارش را کاملاً تا کمرش بالا می کشد؟
			۵. وقتی کودکتان در آینه نگاه می کند و شما می پرسید "توی آینه کیه؟"، آیا در پاسخ می گوید "من" یا اسم خودش را بیان می کند؟
			۶. دقیقاً با استفاده از همین کلمات، از کودکتان بپرسید «تو پسری یا دختری؟» آیا کودکتان پاسخ صحیح می دهد؟
نمره شخصی، اجتماعی			

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می کنید فرزندتان خوب می شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا دیگران بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها بالا می رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۱۰. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

















تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:




نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. وقتی از کودکان می‌خواهید که با انگشتش به بینی اش، چشم‌هایش، موهایش، پاهایش، گوش‌هایش و غیره اشاره کند، آیا حداقل به هفت قسمت از اعضای بدن درست اشاره می‌کند؟ (او می‌تواند به اعضای بدن خودش، شما یا یک عروسک اشاره کند. اگر به سه تا شش جزء از بدن درست اشاره می‌کند، گزینه ی «گاهی» را انتخاب کنید.)
				۲. آیا کودکان با سه یا چهار کلمه جمله می‌سازد؟ لطفاً مثال بزنید:
				۳. بدون اینکه از هرگونه اشاره با انگشت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی کودکان استفاده کنید، به او بگویید " کتاب را روی میز بگذار" و " کفش را زیر صندلی بگذار". آیا کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می‌دهد؟
				۴. زمانی که کودک به یک کتاب تصویردار نگاه می‌کند، آیا به شما توضیح می‌دهد که در هر تصویر چه کاری انجام می‌شود یا چه چیزی اتفاق می‌افتد؟ (برای مثال «هپ هاپ می‌کنه»، «می دوه»، «می خوره»، «گریه می‌کنه») شما می‌توانید بپرسید، این سگ (یا پسر) داره چکار می‌کنه؟
				۵. به کودکان نشان دهید که یک لباس چگونه بالا و پایین می‌رود، و بگویید، «بین این بالا و پایین میره». زیپ را تا نیمه بکشید، و از کودک بخواهید تا آن را پایین بکشد. دوباره زیپ را تا نیمه بیاورید و از کودک بخواهید تا آن را بالا بکشد. چند بار این کار را انجام دهید و هر بار قبل از اینکه از فرزندتان بخواهید زیپ را بالا یا پایین بکشد، زیپ را برگردانید وسط. آیا به طور ثابت، هر بار که می‌گویید «بالا»، کودک زیپ را بالا می‌کشد و هر بار که می‌گویید «پایین»، کودک زیپ را پایین می‌کشد؟
				۶. زمانی که از کودکان می‌پرسید «اسمت چیه؟» آیا او نام خود یا اسمی که با آن صدایش می‌کنید، را می‌گوید؟
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟ 
				۲. آیا کودکان طوری می‌پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می‌پرد)؟ 
				۳. آیا کودکان با گذاشتن یک پا روی هر پله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعدی)، از پله ها بالا می‌رود؟ ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد (این صحنه را می‌توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید). 
				۴. آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود ۱ ثانیه روی یک پایش می‌ایستد؟ 
				۵. آیا کودکان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می‌برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می‌کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می‌کند، پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید). 
				۶. آیا کودکان می‌تواند جفت پا (به طوری که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود)، حداقل حدود ۱۵ سانتی متر به جلو ببرد؟ 
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				<p>۱. بعد از این که شما جلوی چشم کودکان با مداد شمعی یا مداد یا خودکار خطی از بالا به پایین صفحه رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا کودکان با کشیدن تنها یک خط در جهت عمودی (از بالا به پایین صفحه کاغذ)، کار شما را تقلید می‌کند؟</p> <p>Count as "yes" </p> <p>Count as "not yet" </p>
				<p>۲. آیا کودکان می‌تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند.</p> <p></p>
				<p>۳. بعد از این که جلوی چشمان کودکان یک دایره رسم کردید، از او بخواهید که مانند شما دایره ای بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا کودکان با کشیدن یک دایره، کار شما را تقلید می‌کند؟</p> <p>Count as "yes" </p> <p>Count as "not yet" </p>
				<p>۴. کنار کودکان بنشینید. بعد از این که شما جلوی چشم کودکان خطی در جهت افقی (از سمت راست به چپ صفحه یا چپ به راست) رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندان با کشیدن تنها یک خط در جهت افقی (راست به چپ یا چپ به راست)، کار شما را تقلید می‌کند؟</p> <p>Count as "yes" </p> <p>Count as "not yet" </p>
				<p>۵. آیا کودکان سعی می‌کند که با قیچی ایمن و مخصوص کودکان، کاغذی را ببرد؟ لازم نیست که حتماً کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی که کاغذ را با یک دست نگه داشته است، قیچی را با دست دیگرش باز و بسته کند. (شما می‌توانید به کودکان نشان دهید که چگونه از قیچی استفاده کند. زمانی که کودک از قیچی استفاده می‌کند کاملاً مراقب باشید تا خطری برایش پیش نیاید.)</p> <p></p>
				<p>۶. هنگام نقاشی کشیدن، آیا کودکان مداد، مدادشمعی یا خودکار را مثل یک فرد بزرگسال بین انگشت شست و سایر انگشتانش می‌گیرد.</p>
			نمره حرکات ظریف	

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				<p>۱. در حالی که کودکان نگاه می‌کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می‌چیند؟ (می‌توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).</p> <p></p>
				<p>۲. اگر کودکان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی‌رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می‌کند تا روی آن بایستد که دستش برسد (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه).</p>
				<p>۳. زمانی که به تصویر اشاره می‌کنید و از کودکان می‌پرسید "این چیه؟" آیا کودک کلمه ای را می‌گوید که به معنی یک شخص، باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل "نی نی"، "پسر"، "آقا"، "دختر"، "بابا"، "گزینه «بله» را انتخاب کنید.) لطفاً پاسخ کودکان را در اینجا بنویسید:</p> <p></p>
				<p>۴. زمانی که می‌گویید "بگو هفت، سه"، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می‌کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلاً بگویید، "بگو هشت، دو". اگر کودکان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ "بله" را برای این سوال علامت بزنید.</p>
				<p>۵. به کودکان نشان دهید که چگونه با چند مکعب، جعبه یا قوطی، یک پل شبیه به تصویر بسازد. آیا کودکان با ساختن چیزی شبیه به آن، از کار شما تقلید می‌کند؟</p> <p></p>
				<p>۶. زمانی که می‌گویید «بگو پنج، هشت، سه»، آیا کودک همین سه عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می‌کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلاً بگویید: «بگو شش، هفت، دو». اگر کودکان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.</p>
			نمره حل مسئله	

شخصی - اجتماعی			
امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله
			۱. آیا کودکان از قاشق برای غذا خوردن استفاده می‌کند و تنها کمی از غذا را می‌ریزد؟
			۲. آیا کودکان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ‌دار دیگری را هل می‌دهد، آن را دور اشیاء حرکت می‌دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می‌آید؟
			۳. وقتی کودکان در آینه نگاه می‌کند و شما می‌پرسید "توی آینه کیه؟"، آیا در پاسخ می‌گوید "من" یا اسم خودش را بیان می‌کند؟
			۴. آیا کودکان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می‌پوشد؟
			۵. دقیقاً با استفاده از همین کلمات، از کودکان بپرسید «تو پسر یا دختر؟» آیا کودکان پاسخ صحیح می‌دهد؟
			آیا زمانی که یک کودک یا فرد بزرگسال دیگری در نوبت است، کودکان نوبت را رعایت کرده و منتظر نوبتش می‌ماند؟
			نمره شخصی اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می‌کنید فرزندان خوب می‌شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می‌کنید فرزندان مانند دیگر کودکان همسند صحبت می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندان می‌گویند را می‌فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا دیگران بیشتر چیزهایی که فرزندان می‌گویند را می‌فهمند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا فکر می‌کنید فرزندان مانند دیگر بچه‌های همسند راه می‌رود، می‌دود و از چیزها بالا می‌رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره بینایی فرزندان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا فرزندان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا درباره رفتارهای فرزندان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۱۰. آیا چیز دیگری درباره فرزندان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر










تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:




نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. بدون اینکه از هر گونه اشاره با انگشت یا حرکت بدنانتان برای راهنمایی کودکان استفاده کنید، به او بگویید " کتاب را روی میز بگذار" و " کفش را زیر صندلی بگذار". آیا کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می دهد؟
				۲. وقتی که کودک به یک کتاب تصویردار نگاه می کند، آیا به شما توضیح می دهد که در هر تصویر چه کاری انجام می شود یا چه چیزی اتفاق می افتد؟ (برای مثال "هاپ هاپ می کنه"، "می دوه"، "می خوره"، "گریه می کنه") شما می توانید بپرسید، این سگ (یا پسر) داره چکار می کنه؟
				۳. به کودکان نشان دهید که زیپ روی یک لباس چگونه بالا و پایین می رود، و بگویید، "بین این بالا و پایین میره". زیپ را تا نیمه بکشید، و از کودک بخواهید تا آن را پایین بکشد. دوباره زیپ را تا نیمه بیاورید و از کودک بخواهید تا آن را بالا بکشد. چند بار این کار را انجام دهید و هر بار قبل از اینکه از فرزندتان بخواهید زیپ را بالا یا پایین بکشد، زیپ را برگردانید وسط. آیا به طور ثابت، هر بار که می گویید "بالا"، کودک زیپ را بالا می کشد و هر بار که می گویید "پایین"، کودک زیپ را پایین می کشد؟
				۴. زمانی که از کودکان می پرسید "اسمت چیه؟" آیا او نام خود یا اسمی که با آن صدایش می کنید، را می گوید؟
				۵. بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا آنچه را که گفته اید، تکرار کنید، آیا کودکان از سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می کند؟ پیش از آن که فرزندتان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: "دست بز (کف بز)،" "به طرف در برو" و "بنشین". یا این سه دستور: "خودکار رو بده به من"، "کتاب رو باز کن" و "بلند شو".
				۶. آیا کودکان برای ساختن جملات کامل، از تمام کلمات لازم در یک جمله استفاده می کنند؟ به عنوان مثال در بیان جمله «من دارم میرم پارک»، «بابا داره میره سر کار»، یا «اونجا تاب داره که باهاش بازی کنم؟»، یا «شما هم میان؟»، یا «توپ رو بده به من»، آیا همه کلمات (مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، شما، هم، توپ رو، میان) را به طور کامل و صحیح بیان می کند؟
نمره کل ارتباطات				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکان با گذاشتن یک پا روی هر پله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعدی)، از پله ها بالا می رود؟ ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).
				۲. آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود ۱ ثانیه روی یک پایش می ایستد؟
				۳. آیا کودکان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید.)
				۴. آیا کودکان می تواند جفت پا (به طوری که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود)، حداقل حدود ۱۵ سانتی متر به جلو بپرد؟
				۵. اگر برای کودکان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از فرزندتان بیایستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید.)
				۶. آیا کودکان بدون اینکه کسی به او کمک کند، از پله های یک سرسره بالا می رود و سپس به پایین سر می خورد؟
نمره حرکات درشت				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				<p>۱. بعد از این که جلوی چشمان کودکتان یک دایره رسم کردید، از او بخواهید که مانند شما دایره ای بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا کودکتان با کشیدن یک دایره، کار شما را تقلید می‌کند؟</p> <p>Count as "yes"  Count as "not yet" </p>
				<p>۲. کنار کودکتان بنشینید. بعد از این که شما جلوی چشم کودکتان خطی در جهت افقی (از سمت راست به چپ صفحه یا چپ به راست) رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندتان با کشیدن تنها یک خط در جهت افقی (راست به چپ یا چپ به راست)، کار شما را تقلید می‌کند؟</p> <p>Count as "yes"  Count as "not yet" </p>
				<p>۳. آیا کودکتان سعی می‌کند که با قیچی ایمن و مخصوص کودکان، کاغذی را ببرد؟ لازم نیست که حتماً کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی که کاغذ را با یک دست نگه داشته است، قیچی را با دست دیگری باز و بسته کند. (شما می‌توانید به کودکتان نشان دهید که چطور از قیچی استفاده کند. زمانی که کودک از قیچی استفاده می‌کند کاملاً مراقب باشید تا خطری برایش پیش نیاید.)</p> 
				<p>۴. هنگام نقاشی کشیدن، آیا کودکتان مداد، مدادشمعی یا خودکار را مثل یک فرد بزرگسال بین انگشت شست و سایر انگشتانش می‌گیرد؟</p> 
				<p>۵. آیا کودکتان قطعات یک اسباب بازی جورچین (پازل) پنج تا هفت تکه‌ای را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می‌دهد؟ (اگر اسباب بازی جورچین (پازل) در دسترس ندارید، یک صفحه از یک مجله که تمام آن را یک تصویر بزرگ پر کرده است، بردارید و آن را به شش قسمت ببرید. آیا کودک شما این تکه‌ها را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می‌دهد؟)</p>
				<p>۶. آیا کودکتان با نگاه کردن به تصویر مقابل، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکل بگذارد و از روی آن کپی کند، شکلی مشابه آن را با استفاده از مداد، مدادشمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق کاغذ بزرگ می‌کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می‌کند، باید از نظر شکل، مشابه تصویر مقابل باشد، ولی اندازه آن می‌تواند متفاوت باشد.)</p> 
			نمره حرکات ظریف	

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				<p>۱. زمانی که به تصویر اشاره می‌کنید و از کودکتان می‌پرسید «این چیست؟» آیا کودک کلمه ای را می‌گوید که به معنی یک شخص، باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل «نی نی»، «پسر»، «آقا»، «دختر»، «بابا»، «گزینه «بله» را انتخاب کنید.) لطفاً پاسخ کودکتان را در اینجا بنویسید:</p> 
				<p>۲. زمانی که می‌گویید «بگو هفت، سه»، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می‌کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلاً بگویید، «بگو هشت، دو». اگر کودکتان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.</p>
				<p>۳. به کودکتان نشان دهید که چگونه با چند مکعب، جعبه یا قوطی، یک پل شبیه به تصویر بسازد. آیا کودکتان با ساختن چیزی شبیه به آن، از کار شما تقلید می‌کند؟</p> 
				<p>۴. زمانی که می‌گویید «بگو پنج، هشت، سه»، آیا کودک همین سه عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می‌کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلاً بگویید: «بگو شش، هفت، دو». اگر کودکتان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.</p>
				<p>۵. وقتی از کودکتان می‌پرسید «کوچکترین دایره کدام است؟» آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می‌کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بپرسید.)</p> 
				<p>۶. آیا کودکتان لباس‌های خاص یا لباس‌های دیگران را می‌پوشد و «نقش بازی می‌کند» و وانمود می‌کند کسی یا چیزی دیگری است؟ برای مثال، کودک ممکن است لباس‌های مختلفی بپوشد و وانمود کند که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.</p>
			نمره حل مسئله	

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. وقتی کودکان در آینه نگاه می‌کند و شما می‌پرسید «توی آینه کیه؟»، آیا در پاسخ می‌گوید «من» یا اسم خودش را بیان می‌کند؟
				۲. آیا کودکان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می‌پوشد؟
				۳. دقیقاً با استفاده از همین کلمات، از کودکان بپرسید «تو پسری یا دختری؟» آیا کودکان پاسخ صحیح می‌دهد؟
				۴. آیا زمانی که یک کودک یا فرد بزرگسال دیگری در نوبت است، کودکان نوبت را رعایت کرده و منتظر نوبتش می‌ماند؟
				۵. آیا کودکان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می‌کشد و غذا را از یک ظرف به طرف دیگر منتقل می‌کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست برمی‌دارد و در کاسه خود می‌ریزد؟
				۶. آیا کودکان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می‌شوید و با حوله خشک می‌کند؟
				نمره شخصی اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می‌کنید فرزندتان خوب می‌شنود؟ اگر نه، توضیح دهید.
 بله خیر

۲. آیا فکر می‌کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید.
 بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می‌گوید را می‌فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید.
 بله خیر

۴. آیا دیگران بیشتر چیزهایی که فرزندتان می‌گوید را می‌فهمند؟ اگر نه، توضیح دهید.
 بله خیر

۵. آیا فکر می‌کنید فرزندتان مانند دیگر بچه‌های همسنش راه می‌رود، می‌دود و از چیزها بالا می‌رود؟ اگر نه، توضیح دهید.
 بله خیر

۶. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید.
 بله خیر

۸. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید.
 بله خیر

۹. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید.
 بله خیر

۱۰. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید.
 بله خیر



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:


نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودکان حداقل سه چیز از یک مجموعه آشنا و متداول را نام می‌برد؟ برای مثال اگر به فرزندان بگویید «اسم چند چیز را بگو که می‌توانیم آن‌ها را بخوریم» آیا فرزندان چیزهایی مانند «نون، تخم مرغ، میوه و شیر» را نام می‌برد؟ یا اگر بگویید «اسم چند حیوان را به من بگو» آیا فرزندان با کلماتی مثل «گاو، سگ و اسب» پاسخ می‌دهد؟
				۲. آیا کودکان به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهد؟ (اگر کودکان تنها به یک سوال جواب می‌دهد گزینه «گاهی» را انتخاب کنید.) «وقتی گرسنه ای چکار می‌کنی؟» (جواب‌های قابل قبول شامل این موارد است: «میگم غذا می‌خوام»، «غذا می‌خورم»، «نون، بیسکویت، و... می‌خورم»). لطفاً پاسخ کودک را بنویسید: «وقتی خسته هستی چه می‌کنی؟» (جواب‌های قابل قبول عبارتند از «میرم بغل مامانم»، «چرت می‌زنم»، «استراحت می‌کنم»، «میخوابم»، «به رختخواب میرم»، «دراز می‌کشم» و «میشینم».) لطفاً پاسخ کودک را بنویسید:
				۳. آیا کودکان درباره یک شیء آشنا، حداقل دو چیز را بیان می‌کند؟ برای مثال اگر به او بگویید «به من بگو توپت چه جوهره؟» آیا کودکان چیزی مثل «گرده، بزرگه، شوتش می‌کنم، پرتش می‌کنم» را می‌گوید؟
				۴. آیا کودکان مواردی مثل «ها» نشانه جمع، «م، یم» نشانه گذشته، «می» نشانه استمرار را در کلمات بکار می‌برد؟ برای مثال، آیا کودک شما چیزهایی مثل، «من گربه‌ها را می‌بینم»، «من دارم بازی می‌کنم»، یا «توپ را شوت کردم» را می‌گوید؟
				۵. بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا آنچه را که گفته‌اید، تکرار کنید، آیا کودکان از سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می‌کند؟ پیش از آن که فرزندان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می‌توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: «دست بزن» (کف بزن)، «به طرف در برو» و «بنشین». یا این سه دستور: «خودکار رو بده به من»، «کتاب رو باز کن» و «بلند شو».
				۶. آیا کودکان برای ساختن جملات کامل، از تمام کلمات لازم در یک جمله استفاده می‌کند؟ به عنوان مثال در بیان جمله «من دارم میرم پارک»، «بابا داره میره سرکار»، یا «اونجا تاب داره که باهاش بازی کنم؟»، یا «شما هم میان؟»، یا «توپ رو بده به من»، آیا همه کلمات (مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، شما، هم، توپ رو، میان) را به طور کامل و صحیح بیان می‌کند؟
نمره کل ارتباطات				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. اگر برای کودکان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می‌گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از فرزندان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید.)
				۲. آیا کودکان بدون اینکه کسی به او کمک کند، از پله‌های یک سرسره بالا می‌رود و سپس به پایین سر می‌خورد؟
				۳. آیا کودکان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می‌برد تا یک توپ را به جلو، به سمت فردی که روبروی او در فاصله دو متری ایستاده است پرتاب کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می‌کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرتاب می‌کند، پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید.)
				۴. آیا کودکان می‌تواند حداقل یکبار و بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد یا بیافتد، با پای راست یا پای چپ خود به حالت لی لی بالا و پایین بپرد؟
				۵. آیا کودکان می‌تواند در حالت ایستاده، با هر دو پایش به صورت جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟
				۶. آیا کودکان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون این که تعادلش را از دست بدهد و پایش را زمین بگذارد، حداقل برای ۵ ثانیه روی یک پایش می‌ایستد؟ (می‌توانید پیش از پاسخ دادن، به کودکان دو یا سه بار فرصت دهید.)
نمره حرکات درشت				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکتان قطعات یک اسباب بازی جورچین (پازل) پنج تا هفت تکه ای را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می دهد؟ (اگر اسباب بازی جورچین (پازل) در دسترس ندارید، یک صفحه از یک مجله که تمام آن را یک تصویر بزرگ پر کرده است، بردارید و آن را به شش قسمت ببرید. آیا کودک شما این تکه ها را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می دهد؟)
				۲. آیا وقتی یک قیچی ایمن و مخصوص کودکان را به دست کودکتان می دهید، کودکتان با باز و بسته کردن قیچی، یک کاغذ را در یک خط تقریباً صاف به دو نیم می برد. (برای حفظ ایمنی، زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملاً مراقب باشید و او را بیابید.) 
				۳. آیا کودکتان با نگاه کردن به تصاویر زیر، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکلها بگذارد و از روی آنها کپی کند، حداقل سه شکل مشابه آنها را با استفاده از مداد، مداد شمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق کاغذ بزرگ می کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصاویر زیر باشد، ولی اندازه آن می تواند متفاوت باشد.) 
				۴. آیا کودکتان یک یا چند دکمه را باز می کند؟ (برای انجام این کار، او می تواند دکمه لباس خودش یا عروسکش را باز کند.)
				۵. آیا کودکتان تصویر یک آدم را طوری نقاشی می کند که حداقل سه مورد از اینها را داشته باشد: سر، چشم، بینی، دهان، گردن، مو، تنه، بازو، دست، ران یا پا (پایین تر از مچ پا)؟
				۶. آیا کودکتان هنگام رنگ کردن تصویری در یک کتاب رنگ آمیزی، یا هنگام رنگ کردن یک دایره به اندازه ته استکان که شما برایش کشیده اید، اکثراً داخل خطوط رنگ می زند (از خط بیرون نمی زند)؟ (برای این منظور کودکتان نباید در اکثر بخش های نقاشی، بیش از حدود نیم تا یک سانتی متر از خط بیرون بزند.)
نمره حرکات ظریف				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. زمانی که می گوید «بگو پنج، هشت، سه»، آیا کودک همین سه عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگری جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلاً بگویید: «بگو شش، هفت، دو». اگر کودکتان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.
				۲. وقتی از کودکتان می پرسید «کوچکترین دایره کدام است؟» آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بیبرسید.) 
				۳. بدون اینکه با اشاره کردن کمکش کنید، آیا کودکتان می تواند از سه دستور مختلف پیروی کند که در آن ها از کلمات «زیر»، «بین» و «وسط» استفاده شده باشد؟ برای مثال از کودکتان بخواهید که کفش را «زیر میبل» قرار دهد. بعد از او بخواهید که توپ را «بین صندلی ها» قرار دهد و کتاب را «وسط میز» بگذارد.
				۴. زمانی که اشیایی را به کودکتان نشان دهید و بیبرسید «این چه رنگیه؟»، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سیاه، سفید یا صورتی را نام می برد؟ (تنها در صورتی که کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۵. آیا کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوشد و «نقش بازی می کند» و وانمود می کند کسی یا چیزی دیگری است؟ برای مثال، کودک ممکن است لباس های مختلفی بپوشد و وانمود کند که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.
				۶. اگر پنج شی را جلوی کودکتان قرار دهید، آیا او می تواند آنها را با گفتن «یک، دو، سه، چهار، پنج» آنها به ترتیب بشمارد؟ (هنگام پرسیدن این سوال از کودک، نباید با اشاره کردن، انجام حرکت یا نام بردن، به او کمک کنید.)
نمره حل مسئله				

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. آیا کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست برمی دارد و در کاسه خود می ریزد؟
				۲. آیا کودکتان حداقل ۴ مورد از موارد زیر را میگوید؟ (الف) نام خودش (ب) نام خانوادگی اش (ج) نام یکی از اعضای خانواده اش (د) سن خودش (ه) دختری یا پسر بودنش (و) شهری که در آن زندگی می کند لطفاً دور مواردی را که کودک می داند، دایره بکشید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۳. آیا کودکان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شویید و با حوله خشک می کند؟
				۴. آیا کودکان اسم دو یا چند نفر از همبازی هایش را به شما می گوید؟ این اسمی نباید شامل اسم برادرها و خواهرهایش باشد. (زمانی که این سوال را از کودک می پرسید، نباید با پیشنهاد دادن اسمی همبازی ها یا دوستانش، به او کمک کنید.)
				۵. آیا کودکان می تواند بدون کمک، خمیردندان را روی مسواک بگذارد و تمام دندان هایش را مسواک بزند؟ (البته شاید هنوز لازم باشد که بر مسواک زدن کودک نظارت کنید و دوباره دندانهایش را مسواک بزنید.)
				۶. آیا کودکان خودش بدون کمک، لباس هایش را می پوشد یا در می آورد (به استثنای دکمه های فشاری یا قابلمه ای، دکمه های معمولی، و زیپ ها)؟
				نمره شخصی، اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می کنید فرزندان خوب می شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می کنید فرزندان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندان می گوید را می فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا دیگران بیشتر چیزهایی که فرزندان می گوید را می فهمند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا فکر می کنید فرزندان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها بالا می رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره بینایی فرزندان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا فرزندان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا درباره رفتارهای فرزندان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۱۰. آیا چیز دیگری درباره فرزندان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:



نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. آیا کودکان درباره یک شیء آشنا، حداقل دو چیز را بیان می‌کند؟ برای مثال اگر به او بگویید "به من بگو توپیت چه جوهره؟" آیا کودکان چیزی مثل "گرده، بزرگه، شوتش می‌کنم، پرتش می‌کنم" را می‌گوید؟
				۲. آیا کودکان برای ساختن جملات کامل، از تمام کلمات لازم در یک جمله استفاده می‌کند؟ به عنوان مثال در بیان جمله «من دارم میرم پارک»، «بابا داره میره سر کار»، یا «اونجا تاب داره که باهاش بازی کنیم؟»، یا «شما هم میان؟»، یا «توپ رو بده به من»، آیا همه کلمات (مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، شما، هم، توپ رو، میان) را به طور کامل و صحیح بیان می‌کند؟
				۳. آیا کودکان مواردی مثل «ها» نشانه جمع، «م، یم» نشانه گذشته، «می» نشانه استمرار را در کلمات بکار می‌برد؟ برای مثال، یا کودک شما چیزهایی مثل، «من گربه‌ها را می‌بینم»، «من دارم بازی می‌کنم»، یا «توپ را شوت کردم» را می‌گوید؟
				۴. بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا دستورات را تکرار کنید، آیا کودکان از هر سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می‌کند؟ پیش از آن که فرزندتان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می‌توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: «دست بزن (کف بزن)، به طرف در برو، و بنشین». یا این سه دستور: «خودکار رو بده به من، کتاب رو باز کن، و بلند شو».
				۵. کودکان جملات چهار یا پنج کلمه‌ای را بکار می‌برد؟ برای مثال، آیا می‌گوید، "من ماشین قرمز رو می‌خوام؟" لطفاً یک نمونه بنویسید:
				۶. وقتی کودکان درباره‌ی چیزی صحبت می‌کند که قبلاً اتفاق افتاده است، آیا از افعال زمان گذشته (ماضی) استفاده می‌کند، مانند: «خورد»، «رفت» یا «پريد»؟ از فرزندتان سوالاتی بپرسید مانند «چطوری رفتیم مغازه؟» («راه رفتیم.») «تو خونه دوستت چه کار کردی؟» («بازی کردیم.») لطفاً یک مثال بنویسید:
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکان می‌تواند حداقل یکبار و بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد یا بیافتد، با پای راست یا پای چپ خود به حالت لی لی بالا و پایین بپرد؟
				۲. آیا کودکان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می‌برد تا یک توپ را به جلو، به سمت فردی که روبروی او در فاصله دو متری ایستاده است پرتاب کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می‌کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرتاب می‌کند، پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید.)
				۳. آیا کودکان می‌تواند در حالت ایستاده، با هر دو پایش به صورت جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟
				۴. برای کودکان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می‌گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از کودکان بایستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید.)
				۵. آیا کودکان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون این که تعادلش را از دست بدهد و پایش را زمین بگذارد، حداقل برای ۵ ثانیه روی یک پایش می‌ایستد؟ (می‌توانید پیش از پاسخ دادن، به کودکان دو یا سه بار فرصت دهید.)
				۶. آیا کودکان می‌تواند مسافتی حدود ۴/۵ متر (تقریباً به اندازه طول یک اتومبیل بزرگ) را روی پنجه پاهایش (نوک پا) راه می‌رود؟ (می‌توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید.)
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. آیا کودکان با نگاه کردن به تصاویر زیر، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکلها بگذارد و از روی آنها کپی کند، حداقل سه شکل مشابه آنها را با استفاده از مداد، مداد شمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق کاغذ بزرگ می کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصاویر زیر باشد، ولی اندازه آن می تواند متفاوت باشد.) 
				۲. آیا کودکان یک یا چند دکمه را باز می کند؟ (برای انجام این کار، او می تواند دکمه لباس خودش یا عروسکش را باز کند.)
				۳. آیا کودکان هنگام رنگ کردن تصویری در یک کتاب رنگ آمیزی، یا هنگام رنگ کردن یک دایره به اندازه ته استکان که شما برایش کشیده اید، اکثراً داخل خطوط رنگ می زند (از خط بیرون نمی زند)؟ (برای این منظور کودکان نباید در اکثر بخشهای نقاشی، بیش از حدود نیم تا یک سانتی متر از خط بیرون بزند.)
				۴. از کودکان بخواهید که با مداد خطی روی خط زیر بکشند. آیا فرزندان بدون اینکه بیش از دو بار از روی خط خارج شود، روی خط زیر، خطی می کشد؟ (اگر فرزندان سه بار از روی خط خارج شد، پاسخ «گاهی» را انتخاب کنید.)
				۵. از کودکان بخواهید تا تصویر یک آدم را روی یک ورق کاغذ سفید بکشند. می توانید به کودک بگویید «عکس یک دختر یا پسر را بکش.» اگر او آدمی را با سر، تنه، دست ها و پاهایش کشید، پاسخ «بله» را علامت بزنید. اگر او آدمی را فقط با سه عضو از اعضای بدن (سر، تنه، دستها، یا پاها) کشید، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید. اگر کودکان آدمی را فقط با دو عضو از اعضای بدن یا کمتر (سر، تنه، دستها، یا پاها) کشید، پاسخ «هنوز نه» را علامت بزنید. کاغذی که کودک روی آن نقاشی را کشیده است، حتماً به این پرسشنامه ضمیمه نمایید.
				۶. روی یک تکه کاغذ، خطی از یک طرف کاغذ به طرف دیگر رسم کنید. آیا وقتی یک قیچی ایمن و مخصوص کودکان را به دست کودکان می دهید، کودکان با باز و بسته کردن قیچی، یک کاغذ را در یک خط تقریباً صاف به دو نیم می برد. (برای حفظ ایمنی، زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملاً مراقب باشید و او را بپایید.) 
				نمره حرکات ظریف

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. زمانی که اشیایی را به کودکان نشان دهید و بپرسید "این چه رنگیه؟"، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سیاه، سفید یا صورتی را نام می برد؟ (تنها در صورتی که کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاسخ "بله" را علامت بزنید.)
				۲. آیا کودکان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوشد و «نقش بازی می کند» و وانمود می کند کسی یا چیزی دیگری است؟ برای مثال، کودک ممکن است لباس های مختلفی بپوشد و وانمود کند که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.
				۳. اگر پنج شی را جلوی کودکان قرار دهید، آیا او می تواند آنها را با گفتن، "یک، دو، سه، چهار، پنج" آنها به ترتیب بشمارد؟ (هنگام پرسیدن این سوال از کودک، نباید با اشاره کردن، انجام حرکت یا نام بردن، به او کمک کنید.)
				۴. وقتی از کودکان می پرسید "کوچکترین دایره کدام است؟" آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به  کوچکترین دایره، پرسید.)
				۵. آیا کودکان از ۱ تا ۱۵ را بدون اشتباه می شمارد؟ اگر اینطور است، پاسخ «بله» را علامت بزنید. اگر تا ۱۲ را بدون اشتباه می شمارد، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید.
				۶. آیا کودکان نام اعداد را می داند؟ (اگر سه عدد زیر را می شناسد و نام می برد پاسخ «بله» را علامت بزنید. اگر دو عدد از اعداد زیر را شناخت و اسم آنها را گفت، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید.) 
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. آیا کودکان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟
				۲. آیا کودکان اسم دو یا چند نفر از همبازی هایش را به شما می گوید؟ این اسامی نباید شامل اسم برادرها و خواهرهایش باشد. زمانی که این سوال را از کودک می پرسید، نباید با پیشنهاد دادن اسامی همبازی ها یا دوستانش، به او کمک کنید.)

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۳. آیا کودکان می توانند بدون کمک، خمیر دندان را روی مسواک بگذارند و تمام دندان هایش را مسواک بزنند؟ (البته شاید هنوز لازم باشد که بر مسواک زدن کودک نظارت کنید و دوباره دندانهایش را مسواک بزنید.)
				۴. آیا کودکان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست برمی دارد و در کاسه خود می ریزد؟
				۵. آیا کودکان حداقل ۴ مورد از موارد زیر را میگوید؟ الف) نام خودش ب) نام خانوادگی اش ج) نام یکی از اعضای خانواده اش د) سن خودش ه) دختر یا پسر بودنش و) شهری که در آن زندگی می کند لطفاً دور مواردی را که کودک می داند، دایره بکشید.
				۶. آیا کودکان خودش بدون کمک، لباس هایش را می پوشد یا در می آورد؛ از جمله بستن دکمه های با اندازه متوسط و بستن زیپ های جلوی لباس؟
				نمره شخصی. اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می کنید فرزندتان خوب می شنود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۲. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می کند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۴. آیا دیگران بیشتر چیزهایی که فرزندتان می گوید را می فهمند؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۵. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها بالا می رود؟ اگر نه، توضیح دهید. بله خیر

۶. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۸. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۹. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

۱۰. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ اگر بله توضیح دهید. بله خیر

تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- ترجیحاً قبل از پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با کودک انجام دهید.
- تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و کودکان تبدیل کنید.

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	ارتباطات
				۱. بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا دستورات را تکرار کنید، آیا کودکان از هر سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می‌کند؟ پیش از آن که فرزندان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می‌توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: "دست بزن (کف بزن)، به طرف در برو، و بنشین". یا این سه دستور: "خودکار رو بده به من، کتاب رو باز کن، و بلند شو".
				۲. آیا کودکان جملات چهار یا پنج کلمه‌ای را بکار می‌برد؟ برای مثال، آیا می‌گوید، "من ماشین قرمز رو می‌خوام"؟ لطفاً یک نمونه بنویسید:
				۳. وقتی کودکان درباره‌ی چیزی صحبت می‌کند که قبلاً اتفاق افتاده است، آیا از افعال زمان گذشته (ماضی) استفاده می‌کند، مانند: «خورد»، «رفت»، یا «پريد»؟ از فرزندان سوالاتی پرسید مانند «چطوری رفتیم مغازه؟» («راه رفتیم.») «تو خونه دوستت چه کار کردی؟» («بازی کردیم.») لطفاً یک مثال بنویسید:
				۴. آیا کودکان کلمات مقایسه‌ای، مثل سنگین‌تر، قوی‌تر، یا کوتاه‌تر را بکار می‌برد؟ از کودک خود سوالاتی از این دست پرسید: "ماشین بزرگه ولی اتوبوس....." "بزرگتره"؛ "گربه سنگینه، ولی آدم....." "سنگین‌تره"؛ "جوجه کوچیکه، ولی مورچه....." لطفاً یک نمونه بنویسید:
				۵. آیا کودکان به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهد؟ (اگر کودکان تنها به یک سوال جواب می‌دهد گزینه‌ی «گاهی» را انتخاب کنید). «وقتی گرسنه ای چکار می‌کنی؟» (جواب‌های قابل قبول شامل این موارد است: «میگم غذا می‌خوام»، «غذا می‌خورم»، «نون»، «بیسکویت، و... می‌خورم»). لطفاً پاسخ کودک را بنویسید: «وقتی خسته هستی چه می‌کنی؟» (جواب‌های قابل قبول عبارتند از «میرم بغل مامانم»، «چرت می‌زنم»، «استراحت می‌کنم»، «میخوابم»، «به رختخواب میرم»، «دراز می‌کشم» و «میشینم»). لطفاً پاسخ کودک را بنویسید:
				۶. آیا کودکان جملاتی که در پایین می‌بینید را پس از شما، و بدون هیچگونه اشتباهی، تکرار می‌کند؟ (جملات را یکی یکی بخوانید. هر جمله را می‌توانید یک بار دیگر نیز تکرار کنید. اگر کودکان هر دو جمله را بدون اشتباه تکرار کند پاسخ «بله» را علامت بزنید و اگر فقط یک جمله را بدون اشتباه تکرار کند، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید). مریم کفش‌هایش را قایم می‌کند تا مینا پیدا کند. علی کتاب آبی را زیر تختش می‌گذارد.
				نمره کل ارتباطات

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات درشت
				۱. آیا کودکان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می‌برد تا یک توپ را به جلو، به سمت فردی که روبروی او در فاصله دو متری ایستاده است پرتاب کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می‌کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرتاب می‌کند، پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید).
				۲. اگر برای کودکان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می‌گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از کودکان بایستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید).
				۳. آیا کودکان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون این که تعادلش را از دست بدهد و پایش را زمین بگذارد، حداقل برای ۵ ثانیه روی یک پایش می‌ایستد؟ (می‌توانید پیش از پاسخ دادن، به کودکان دو یا سه بار فرصت دهید).
				۴. آیا کودکان می‌تواند مسافتی حدود ۴/۵ متر (تقریباً به اندازه طول یک اتومبیل بزرگ) را روی پنجه پاهایش (نوک پا) راه برود؟ (می‌توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید).
				۵. آیا کودکان مسافتی حدود ۱/۵ متر را با هر یک از دو پایش و بدون اینکه پای دیگری را زمین بگذارد، به طرف جلو لی لی کند؟ (می‌توانید به کودک اجازه دهید تا این کار را با هر کدام از پاهایش دوبار امتحان کند. اگر فقط با یکی از پاهایش می‌تواند لی لی کند، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید).
				۶. آیا کودکان با جابه جا کردن متناوب پاهایش، لی لی کنان به جلو می‌رود؟ (می‌توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید).
				نمره حرکات درشت

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حرکات ظریف
				۱. از کودکتان بخواهید که با مداد خطی روی خط زیر بکشد. آیا فرزندتان بدون اینکه بیش از دو بار از روی خط خارج شود، روی خط زیر، خطی می‌کشد؟ (اگر فرزندتان سه بار از روی خط خارج شد، پاسخ «گاهی» را انتخاب کنید.)
				۲. از کودکتان بخواهید تا تصویر یک آدم را روی یک ورق کاغذ سفید بکشد. می‌توانید به کودک بگویید «عکس یک دختر یا پسر را بکش». اگر او آدمی را با سر، تنه، دست‌ها و پاهاش کشید، پاسخ «بله» را علامت بزنید. اگر او آدمی را فقط با سه عضو از اعضای بدن (سر، تنه، دستها، یا پاها) کشید، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید. اگر کودکتان آدمی را فقط با دو عضو از اعضای بدن یا کمتر (سر، تنه، دستها، یا پاها) کشید، پاسخ «هنوز نه» را علامت بزنید. کاغذی که کودک روی آن نقاشی را کشیده است، حتماً به این پرسشنامه ضمیمه نمایید.
				۳. روی یک تکه کاغذ، خطی از یک طرف کاغذ به طرف دیگر رسم کنید. آیا وقتی یک قیچی ایمن و مخصوص کودکان را به دست کودکتان می‌دهید، کودکتان با باز و بسته کردن قیچی، یک کاغذ را در یک خط تقریباً صاف به دو نیم می‌برد. (برای حفظ ایمنی، زمانی که کودک از قیچی استفاده می‌کند کاملاً مراقب باشید و او را بپایید.)
				۴. آیا کودکتان با نگاه کردن به تصاویر زیر، بدون اینکه کاغذ خود را روی شکل‌ها بگذارد و از روی آنها کپی کند، مشابه آن شکل‌ها را در فضای زیر می‌کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می‌کند، باید از نظر شکل مشابه تصاویر زیر باشد، ولی اندازه آن می‌تواند متفاوت باشد. اگر مشابه هر سه شکل را رسم کرد پاسخ «بله» را انتخاب کنید؛ اگر مشابه دو شکل را رسم کرد پاسخ «گاهی» را انتخاب کنید.) <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">فضای نوشتن کودک</div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> + □ △ </div> </div>
				۵. آیا کودک با نگاه کردن به هر یک از حروف زیر، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکل‌ها بگذارد و از روی آنها کپی کند، حروفی مشابه آنها را می‌نویسد؟ سایر حروف به جز حرفی که کودک باید مشابه آن را بنویسد، بیوشانید. (اگر او چهارتا از حروف را می‌نویسد، و حروف برای شما قابل خواندن هستند، پاسخ «بله» را علامت بزنید. اگر کودک می‌تواند دو یا سه حرف را بنویسد، و این حروف برای شما قابل خواندن هستند، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید.) <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">فضای نوشتن کودک</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">آ ک ب ن د ر</div> </div>
				۶. اسم کودکتان را بنویسید. آیا کودکتان می‌تواند چیزی مشابه آن را بنویسد؟ آنچه که کودک می‌نویسد ممکن است بزرگ، برعکس، یا وارونه باشد. (اگر او از تمام حروف، حدود نصف آنها را نوشت، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید.) <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">فضای نوشتن کودک</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">فضای نوشتن بزرگسالان</div> </div>
			نمره حرکات ظریف	

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۱. وقتی از کودکتان می‌پرسید «کوچکترین دایره کدام است؟» آیا او کوچکترین دایره را نشان می‌دهد؟ (این سوال را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بپرسید.) <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; border-radius: 50%; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%;"></div> </div>
				۲. زمانی که اشیایی را به کودکتان نشان دهید و بپرسید «این چه رنگیه؟»، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سیاه، سفید یا صورتی را نام می‌برد؟ (تنها در صورتی که کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکاربرد، پاسخ «بله» را علامت بزنید.)
				۳. آیا کودکتان از ۱ تا ۱۵ را بدون اشتباه می‌شمارد؟ اگر اینطور است، پاسخ «بله» را علامت بزنید. اگر تا ۱۲ را بدون اشتباه می‌شمارد، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید.
				۴. آیا کودکتان می‌تواند جملات زیر را با بکار بردن کلمه‌ای که معنی آن مخالف (متضاد) کلمه‌ای است که زیر آن خط کشیده شده است، تمام کند؟ برای مثال: سنگ سخت است، اما بالش نرم است. لطفاً پاسخ‌های کودک را در زیر بنویسید: گاو بزرگه، اما موش چیه؟ یخ سوده، اما آتش چیه؟ ما ستاره‌ها را در شب می‌بینیم، و خورشید را کی می‌بینیم؟ وقتی که توپ را می‌اندازم بالا، بعدش کجا می‌آید؟ (اگر سه جمله از چهار جمله را بطور صحیح کامل کرد، پاسخ «بله» را علامت بزنید. اگر دو جمله از چهار جمله را بطور صحیح کامل کرد، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید.)

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	حل مسئله
				۵. آیا کودکان نام اعداد را می‌داند؟ (اگر سه عدد زیر را می‌شناسد و نام می‌برد پاسخ «بله» را علامت بزنید. اگر دو عدد از اعداد زیر را شناخت و اسم آنها را گفت، پاسخ «گاهی» را علامت بزنید.) ۳ ۱ ۲
				۶. آیا کودکان حداقل چهار تا از حروف اسم خود را می‌شناسد و نام می‌برد؟ به حروف نام او اشاره کنید و بپرسید، «این چه حرفیه؟» (بدون رعایت ترتیب به حروف اشاره کنید.)
				نمره حل مسئله

امتیاز	هنوز نه	گاهی	بله	شخصی - اجتماعی
				۱. آیا کودکان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می‌کشد و غذا را از یک ظرف به طرف دیگر منتقل می‌کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست برمی‌دارد و در کاسه خود می‌ریزد؟
				۲. آیا کودکان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می‌شوید و با حوله خشک می‌کند؟
				۳. آیا کودکان حداقل ۴ مورد از موارد زیر را می‌گوید؟ (الف) نام خودش (ب) نام خانوادگی اش (ج) نام یکی از اعضای خانواده اش (د) سن خودش (ه) دختری یا پسر بودنش (و) شهری که در آن زندگی می‌کند لطفاً دور مواردی را که کودک می‌داند، دایره بکشید.
				۴. آیا کودکان خودش بدون کمک، لباس هایش را می‌پوشد یا در می‌آورد؛ از جمله بستن دکمه‌های با اندازه متوسط و بستن زیپ های جلوی لباس؟
				۵. آیا کودکان خودش به تنهایی به توالت (مستراح) می‌رود؟ (یعنی به توالت می‌رود، می‌نشیند، خودش را می‌شوید و آب می‌ریزد یا سیفون را می‌کشد.) حتی اگر این کارها را با یادآوری شما انجام می‌دهد پاسخ «بله» را علامت بزنید.
				۶. آیا کودکان معمولاً نوبت را رعایت می‌کند و در چیزهایی که دارد، با سایر کودکان شریک می‌شود؟ (دو سوال است.)
				نمره شخصی. اجتماعی

کلیات

والدین یا سایر افراد تکمیل کننده پرسشنامه می‌توانند بعد از کشیدن دایره دور پاسخ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان یا توضیحات تکمیلی استفاده کنند.

۱. آیا فکر می‌کنید فرزندتان خوب می‌شنود؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر

۲. آیا فکر می‌کنید فرزندتان مانند دیگر کودکان همسنش صحبت می‌کند؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر

۳. آیا بیشتر چیزهایی که فرزندتان می‌گوید را می‌فهمید؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر

۴. آیا دیگران بیشتر چیزهایی که فرزندتان می‌گوید را می‌فهمند؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر

۵. آیا فکر می‌کنید فرزندتان مانند دیگر بچه‌های همسنش راه می‌رود، می‌دود و از چیزها بالا می‌رود؟ اگر نه، توضیح دهید.
بله خیر

۶. آیا در خانواده والدین سابقه ناشنوایی یا کم شنوایی که از دوران کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ اگر بله، توضیح دهید. بله خیر

۷. آیا درباره بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر

۸. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری (مشکل پزشکی) جدی و مهمی داشته است؟ اگر بله، توضیح دهید.
بله خیر

۹. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ اگر بله توضیح دهید.
بله خیر

۱۰. آیا چیز دیگری درباره فرزندتان شما را نگران و دلواپس می‌کند؟ اگر بله توضیح دهید.
بله خیر

تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱. وقتی کودکان ناآرام و ناراحت است، آیا ظرف نیم ساعت آرام می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲. آیا کودکان دوست دارد که او را بردارند و بغلش کنند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳. آیا وقتی کودکان را بغل می کنید، او کمرش را سفت می کند و مانند کمان قوس می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۴. وقتی با کودکان حرف می زنید، آیا به شما نگاه می کند و به نظر می آید که دارد گوش می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۵. آیا کودکان به نحوی به شما می فهماند که گرسنه، خسته یا ناراحت است؟ برای مثال آیا نق نق یا گریه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۶. وقتی کودکان بیدار است، آیا به نظر می رسد که از تماشا کردن یا گوش دادن به افراد دیگر، لذت می برد. مثلاً آیا سرش را برمی گرداند که به کسی که در حال صحبت است، نگاه کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۷. آیا کودکان می تواند خودش را آرام کند (مثلاً با مکیدن دستش یا مکیدن پستانک؟) 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۸. آیا کودکان برای مدت های طولانی گریه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۹. آیا بدن کودکان آرام و آسوده است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۰. آیا کودکان برای مکیدن سینه یا شیشه شیر، مشکل دارد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۱. آیا شیر دادن به کودکان بیشتر از ۳ دقیقه طول می کشد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۲. شما و کودکان با هم از زمان های شیر دادن لذت می برید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۳. کودکان هنگام خوردن، مشکلاتی مانند عق زدن، استفراغ یا دارد؟ (لطفاً توضیح دهید).
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۴. در طول روز، کودکان هر بار که بیدار می شود، به طور مداوم برای یک ساعت یا بیشتر بیدار می ماند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۵. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۱۰ ساعت می خوابد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۶. آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما در میان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

۱۷. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندان نگرانی دارید؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید. بله خیر

۱۸. آیا چیزی درباره کودکان شما را نگران می کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید. بله خیر

۱۹. از چه چیز فرزندان لذت می برید؟



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱. وقتی کودکان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف نیم ساعت آرام می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲. آیا کودکان به شما و سایر اعضای خانواده لبخند می زند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳. آیا کودکان دوست دارد که او را بردارند و بغلش کنند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۴. آیا وقتی کودکان را بغل می کنید، او کمرش را سفت می کند و مانند کمان قوس می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۵. وقتی با کودکان حرف می زنید، آیا به شما نگاه می کند و به نظر می آید که دارد گوش می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۶. آیا کودکان به نحوی به شما می فهماند که گرسنه یا بیمار است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۷. وقتی کودکان بیدار است، آیا به نظر می رسد که از تماشا کردن یا گوش دادن به افراد دیگر، لذت می برد. مثلا آیا سرش را برمی گرداند که به کسی که در حال صحبت است، نگاه کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۸. آیا کودکان می تواند خودش را آرام کند (مثلا با مکیدن دستش؟) 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۹. کودکان برای مدتهای طولانی گریه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۰. بدن کودکان آرام و آسوده است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۱. کودکان برای مکیدن سینه یا شیشه شیر، مشکل دارد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۲. آیا شیر یا غذا دادن به کودکان بیشتر از ۳ دقیقه طول می کشد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۳. آیا شما و کودکان از زمان های شیر دادن و غذا خوردن با هم لذت می برید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۴. کودکان هنگام خوردن، مشکلاتی مانند عق زدن، استفراغ یا دارد؟ (لطفا توضیح دهید).
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۵. آیا در طول روز، کودکان هر بار که بیدار می شود، به طور مداوم برای یک ساعت یا بیشتر بیدار می ماند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۶. آیا کودکان برای به خواب رفتن در طول روز (چرت روزانه) یا در شب، مشکل دارد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۷. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۱۰ ساعت می خوابد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۸. آیا کودکان دچار یبوست یا اسهال می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۹. آیا کودکان هنگام بازی با شما صداهایی در می آورد و به شما نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۰. آیا کودکان برای جلب توجه شما صداها یا اداهایی در می آورد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۱. وقتی شما به کودکان لبخند می زنید، آیا او در پاسخ به شما لبخند می زند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۲. وقتی شما با کودکان حرف می زنید یا برایش صدا در می آورید، آیا او هم در پاسخ صدا در می آورد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۳. آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما در میان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفا توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

بله خیر

۲۴. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندان نگرانی دارید؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.

.....

بله خیر

۲۵. آیا چیزی درباره ی کودکان شما را نگران می کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.

.....

۲۶. از چه چیز فرزندان لذت می برید؟

.....



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان تکرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱. آیا کودکان به شما و سایر اعضای خانواده لبخند می زند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲. آیا وقتی غریبه ای نزدیک می شود، کودکان دنبال شما می گردد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳. آیا کودکان دوست دارد که در کنار اعضای خانواده و دوستان بازی کند یا در کنار آنها باشد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۴. آیا کودکان دوست دارد که او را بردارند و بغلش کنند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۵. وقتی کودکان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف نیم ساعت آرام می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۶. آیا وقتی کودکان را بغل می کنید، او کمرش را سفت می کند و مانند کمان قوس می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۷. آیا کودکان دوست دارد بازی هایی مانند «دالی کردن» بازی کند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۸. آیا بدن کودکان آرام و آسوده است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۹. آیا کودکان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۰. آیا کودکان می تواند خودش را آرام کند (مثلا با مکیدن دستش یا مکیدن پستانک)؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۱. آیا کودکان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۲. آیا شیر یا غذا دادن به کودکان بیشتر از ۳ دقیقه طول می کشد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۳. آیا شما و کودکان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۴. آیا کودکان هنگام خوردن، مشکلاتی مانند عقی زدن، استفراغ یا دارد؟ (لطفا توضیح دهید).
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۵. آیا کودکان برای به خواب رفتن در طول روز (چرت روزانه) یا در شب، مشکل دارد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۶. آیا کودکان صداهای غان و غون از خود در می آورد؟ مثلا، آیا صداهایی را کنار هم قرار می دهد، مانند «با-با-با» یا «نا-نا-نا»؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۷. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۱۰ ساعت می خوابد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۸. آیا کودکان دچار یبوست یا اسهال می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۹. آیا کودکان به نحوی به شما می فهماند که گرسنه یا خسته است یا اذیت شده است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۰. شما با کودکان حرف می زنید، آیا او سرش را برمی گرداند، نگاه می کند یا لبخند می زند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۱. آیا کودکان سعی می کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلا با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۲. آیا کودکان سعی می کند چیزهایی را به شما نشان دهد؟ مثلا، آیا یک اسباب بازی را به سمت شما می گیرد و به شما نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۳. وقتی نام کودکان را صدا می کنید، واکنش نشان می دهد؟ به عنوان مثال آیا سرش را برمی گرداند و به شما نگاه می کند؟

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۲۴. آیا وقتی شما به چیزی اشاره می‌کنید، کودکان به همان جهتی که شما نشان می‌دهید، نگاه می‌کند؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۲۵. آیا کودکان برای این که به شما بفهماند که چیزی را می‌خواهد، صداها یا اداهایی در می‌آورد؟ (مثلاً دستش را به سوی آن دراز می‌کند)؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۲۶. وقتی شما صداهایی را که کودکان در می‌آورد تقلید می‌کنید، آیا او در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می‌کند؟
	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	۲۷. آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما درمیان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

بله خیر

۲۸. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟

بله خیر

۲۹. آیا چیزی درباره کودکان شما را نگران می‌کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.

۳۰. از چه چیز فرزندتان لذت می‌برد؟

تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱. آیا وقتی با کودکان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲. وقتی او را ترک می کنید، آیا کودکان برای بیش از یک ساعت ناراحت است و گریه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳. آیا وقتی با کودکان بازی می کنید، لبخند می زند یا می خندد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۴. آیا وقتی غریبه ای نزدیک می شود، کودکان دنبال شما می گردد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۵. آیا بدن کودکان آرام و آسوده است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۶. آیا کودکان دوست دارد که او را در آغوش بگیرند و نوازش کنند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۷. وقتی کودکان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف ۱۵ دقیقه آرام می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۸. آیا وقتی کودکان را بغل می کنید، او کمرش را سفت می کند و مانند کمان قوس می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۹. آیا کودکان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۰. آیا کودکان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد.
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۱. آیا کودکان کارهایی را بارها و بارها تکرار می کند و وقتی سعی می کنید متوقفش کنید، ناراحت می شود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن بالا و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ...؟ (لطفا توضیح دهید)
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۲. آیا کودکان برای غذا خوردن مشکلاتی دارد؟ مثلاً آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند؟ استفراغ می کند، چیزهایی که خوراکی نیستند را می خورد، یا ... (لطفا توضیح دهید)
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۳. آیا کودکان برای به خواب رفتن در طول روز (چرت زدن)، یا در شب، مشکل دارد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۴. آیا شما و کودکان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۵. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۱۰ ساعت می خوابد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۶. آیا وقتی شما به چیزی اشاره می کنید، کودکان به همان جهتی که شما نشان می دهید، نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۷. آیا کودکان دچار یبوست یا اسهال می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۸. آیا کودکان با کلماتش یا اداهایش احساسش را به شما می فهماند؟ مثلاً آیا کودکان به شما می فهماند که گرسنه یا خسته است یا اذیت شده است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۹. آیا کودکان از دستورات ساده پیروی می کند؟ برای مثال وقتی از او بخواهید، می نشیند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۰. آیا کودکان دوست دارد که در کنار اعضای خانواده و دوستان بازی کند یا در کنار آنها باشد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۱. وقتی کودکان می خواهد مکان های جدیدی، مثلاً یک پارک یا منزل یک دوست را کشف کند، آیا ابتدا از این که شما نزدیکش هستید اطمینان حاصل می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۲. آیا کودکان از شنیدن داستان یا خواندن آواز خوشش می آید؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۳. آیا کودکان عمداً به خودش آسیب می زند؟

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزیند	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۴. کودکان دوست دارد دور و بر بچه‌های دیگر باشد؟ برای مثال آیا به بچه‌های دیگر نزدیک می‌شود یا به آن‌ها نگاه می‌کند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۵. آیا کودکان سعی می‌کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلاً با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۶. آیا کودکان سعی می‌کند با اشاره کردن به چیزها و سپس برگشتن و نگاه کردن به شما، آنها را به شما نشان دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۷. آیا کودکان برای این که به شما بفهماند که چیزی را می‌خواهد، صداها یا اداهایی در می‌آورد یا از کلمات استفاده می‌کند؟ (مثلاً دستش را به سوی آن دراز می‌کند)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۸. آیا کودکان به صورت وانمود کردن، با اشیاء بازی می‌کند؟ مثلاً، آیا وانمود می‌کند که با تلفن صحبت می‌کند، به عروسکی غذا می‌دهد، یا یک هواپیمای اسباب بازی را پرواز می‌دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۹. آیا کودکان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می‌شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳۰. آیا وقتی نام کودکان را صدا می‌کنید، واکنش نشان می‌دهد؟ به عنوان مثال آیا سرش را برمی‌گرداند و به شما نگاه می‌کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۱. آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما درمیان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما "گاهی" یا "اغلب یا همیشه" است، لطفاً توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

۳۲. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندان نگرانی دارید؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.

خیر بله

۳۳. آیا چیزی درباره کودکان شما را نگران می‌کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.

خیر بله

۳۴. از چه چیز فرزندان لذت می‌برید؟



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱. آیا وقتی با کودکان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲. آیا به نظر می رسد که کودکان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳. آیا وقتی با کودکان بازی می کنید، لبخند می زند یا می خندد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۴. آیا بدن کودکان آرام و آسوده است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۵. وقتی او را ترک می کنید، آیا کودکان برای بیش از یک ساعت ناراحت است و گریه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۶. آیا کودکان با بزرگسالان آشنا سلام و احوالپرسی می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۷. آیا کودکان دوست دارد که او را در آغوش بگیرند و نوازش کنند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۸. وقتی کودکان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف ۱۵ دقیقه آرام می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۹. آیا وقتی کودکان را بغل می کنید، او کمرش را سفت می کند و مانند کمان قوس می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۰. آیا کودکان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۱. آیا کودکان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۲. آیا شما و کودکان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۳. آیا کودکان برای غذا خوردن مشکلاتی دارد؟ مثلاً آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند، استفراغ می کند، چیزهایی که خوراکی نیستند را می خورد، یا ...؟ (لطفاً توضیح دهید).
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۴. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۱۰ ساعت می خوابد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۵. آیا وقتی شما به چیزی اشاره می کنید، کودکان به همان جهتی که شما نشان می دهید، نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۶. آیا کودکان برای به خواب رفتن در طول روز (چرت روزانه) یا در شب، مشکل دارد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۷. آیا کودکان دچار یبوست یا اسهال می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۸. آیا کودکان از دستورات ساده پیروی می کند؟ برای مثال وقتی از او بخواهید، می نشیند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۹. آیا کودکان با کلماتش یا اداهایش احساسش را به شما می فهماند؟ مثلاً آیا کودکان به شما می فهماند که گرسنه یا خسته است یا اذیت شده است؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۰. وقتی کودکان می خواهد مکان های جدیدی، مثلاً یک پارک یا منزل یک دوست را کشف کند، آیا ابتدا از این که شما نزدیکش هستید اطمینان حاصل می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۱. آیا کودکان کارهایی را بارها و بارها تکرار می کند و وقتی سعی می کنید متوقفش کنید، ناراحت می شود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن بالا و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ...؟ (لطفاً توضیح دهید).
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۲. آیا کودکان از شنیدن داستان یا خواندن آواز خوشش می آید؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۳. آیا کودکان عمداً به خودش آسیب می زند؟

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزیند	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۴. آیا کودکان دوست دارد دور و بر بچه‌های دیگر باشد؟ برای مثال آیا به بچه‌های دیگر نزدیک می‌شود یا به آن‌ها نگاه می‌کند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۵. آیا کودکان سعی می‌کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلاً با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۶. آیا کودکان سعی می‌کند با اشاره کردن به چیزها و سپس برگشتن و نگاه کردن به شما، آنها را به شما نشان دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۷. آیا کودکان به صورت وانمود کردن، با اشیاء بازی می‌کند؟ مثلاً، آیا وانمود می‌کند که با تلفن صحبت می‌کند، به عروسکی غذا می‌دهد، یا یک هواپیمای اسباب بازی را پرواز می‌دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۸. آیا کودکان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می‌شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۹. آیا وقتی نام کودکان را صدا می‌کنید، واکنش نشان می‌دهد؟ به عنوان مثال آیا سرش را برمی‌گرداند و به شما نگاه می‌کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۰. آیا کودکان بیش از حد نگران یا وحشت زده است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۱. آیا تاکنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما درمیان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

۳۲. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندان نگرانی دارید؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.

بله خیر

۳۳. آیا چیزی درباره کودکان شما را نگران می‌کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.

بله خیر

۳۴. از چه چیز فرزندان لذت می‌برید؟



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزیند	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱. آیا وقتی با کودکان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۲. آیا کودکان دوست دارد که او را در آغوش بگیرند و نوازش کنند؟
	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	۳. آیا کودکان بیش از حد انتظارتان به شما می چسبند؟ 
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۴. آیا کودکان با بزرگسالان آشنا سلام و احوالپرسی می کند؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۵. آیا کودکان شاد و خوشحال به نظر می رسد؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۶. آیا کودکان از شنیدن داستان یا خواندن آواز خوشش می آید؟
	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	۷. آیا به نظر می رسد که کودکان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبه نمی کند؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۸. آیا کودکان بعد از انجام فعالیت های هیجان انگیز، خودش خودبخود آرام می گیرد؟ 
	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	۹. آیا کودکان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟
	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	۱۰. آیا کودکان کارهایی را بارها و بارها تکرار می کند و وقتی سعی می کنید متوقفش کنید، ناراحت می شود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن بالا و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ...؟ (لطفا توضیح دهید.)
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱۱. آیا کودکان فعالیت هایی را که از آنها لذت می برد حداقل تا ۳ دقیقه ادامه می دهد؟ (منظور فعالیت هایی به غیر از تماشای نمایش یا فیلم یا بازی با وسایل الکترونیک است؟)
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱۲. آیا کودکان کاری را که از او می خواهید، انجام می دهد؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱۳. آیا کودکان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد؟ 
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱۴. وقتی کودکان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف ۱۵ دقیقه آرام می شود؟
	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	۱۵. آیا کودکان برای غذا خوردن مشکلاتی دارد؟ مثلاً آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند، استفراغ می کند، چیزهایی که خوراکی نیستند را می خورد، یا ...؟ (لطفا توضیح دهید.)
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱۶. آیا شما و کودکان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱۷. آیا وقتی شما به چیزی اشاره می کنید، کودکان به همان جهتی که شما نشان می دهید، نگاه می کند؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱۸. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۸ ساعت می خوابد؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۱۹. آیا کودکان با کلماتش یا اداهایش احساسش را به شما می فهماند؟ مثلاً آیا کودکان به شما می فهماند که گرسنه یا خسته است یا اذیت شده است؟
	v <input type="checkbox"/>	x <input type="checkbox"/>	v <input type="checkbox"/>	z <input type="checkbox"/>	۲۰. آیا کودکان از دستورات همیشگی و روزمره پیروی می کند؟ برای مثال آیا وقتی از او می خواهید، سر سفره یا میز می آید یا در جمع آوری اسباب بازی هایش کمک می کند؟

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۱. وقتی کودکان می خواهند مکان های جدیدی، مثلاً یک پارک یا منزل یک دوست را کشف کند، آیا ابتدا از این که شما نزدیکش هستید اطمینان حاصل می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۲. آیا کودکان بدون مشکل زیادی از سربیک فعالیت سراغ فعالیت بعدی می رود (مثلاً از بازی کردن دست کشیده و به خوردن غذا مشغول می شود)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۳. آیا کودکان از چیزهای خطرناک مانند آتش و ماشین های در حال حرکت، دوری می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۴. کودکان عمداً به چیزهایی آسیب می زند یا آنها را از بین می برد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۵. آیا کودکان عمداً به خودش آسیب می زند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۶. آیا کودکان کنار بچه های دیگر بازی می کند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۷. آیا کودکان سعی می کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلاً با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۸. آیا کودکان سعی می کند با اشاره کردن به چیزها و سپس برگشتن و نگاه کردن به شما، آنها را به شما نشان دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۹. آیا کودکان برای درخواست چیزهایی که می خواهد، حداقل از دو کلمه استفاده می کند؟ مثلاً آیا می گوید "توپ می خوام" یا "بازم سیب".
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳۰. آیا کودکان به صورت وانمود کردن، با اشیاء بازی می کند؟ مثلاً، آیا وانمود می کند که با تلفن صحبت می کند، به عروسکی غذا می دهد، یا یک هواپیمای اسباب بازی را پرواز می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۱. آیا کودکان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۲. آیا کودکان بیش از حد نگران یا وحشت زده است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۳. آیا تاکنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما درمیان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

۳۴. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندان نگرانی دارید؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید. بله خیر

۳۵. آیا چیزی درباره کودکان شما را نگران می کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید. بله خیر

۳۶. از چه چیز فرزندان لذت می برید؟

تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان تکرانید، علامت بزنیید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱. آیا وقتی با کودکان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲. آیا کودکان دوست دارد که او را در آغوش بگیرند و نوازش کنند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳. آیا کودکان با افراد بزرگسالی که کاملاً می شناسد حرف می زند یا بازی می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۴. آیا کودکان بیش از حد انتظارتان به شما می چسبند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۵. وقتی کودکان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف ۱۵ دقیقه آرام می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۶. آیا به نظر می رسد که کودکان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۷. آیا کودکان بعد از انجام فعالیت های هیجان انگیز، خودش خودبخود آرام می گیرد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۸. آیا کودکان بدون مشکل زیادی از سریک فعالیت سراغ فعالیت بعدی می رود (مثلاً از بازی کردن دست کشیده و به خوردن غذا مشغول می شود)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۹. آیا کودکان شاد و خوشحال به نظر می رسد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۰. آیا کودکان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۱. آیا کودکان کاری را که از او می خواهید، انجام می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۲. آیا کودکان پر تحرک تر و پر جنب و جوش تر از کودکان هم سن و سال خود به نظر می رسد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۳. آیا کودکان فعالیت هایی را که از آنها لذت می برد حداقل تا ۵ دقیقه ادامه می دهد؟ (منظور فعالیت هایی به غیر از تماشای نمایش یا فیلم یا بازی با وسایل الکترونیک است)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۴. آیا شما و کودکان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۵. آیا کودکان برای غذا خوردن مشکلاتی دارد؟ مثلاً آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند، استفراغ می کند، چیزهایی که خوراکی نیستند را می خورد، یا ...؟ (لطفاً توضیح دهید).
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۶. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۸ ساعت می خوابد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۷. آیا کودکان برای گفتن خواسته ها و نیازهایش به شما از کلمات استفاده می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۸. آیا کودکان از دستورات همیشگی و روزمره پیروی می کند؟ برای مثال آیا وقتی از او می خواهید، سر سفره یا میز می آید یا در جمع آوری اسباب بازی هایش کمک می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۹. آیا کودکان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۰. وقتی کودکان می خواهد مکان های جدیدی، مثلاً یک پارک یا منزل یک دوست را کشف کند، آیا ابتدا از این که شما نزدیکش هستید اطمینان حاصل می کند؟ 

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزیند	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۱. آیا کودکان کارهایی را بارها و بارها تکرار می کند و وقتی سعی می کنید متوقفش کنید، ناراحت می شود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن بالا و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا؟ (لطفاً توضیح دهید.)
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۲. آیا کودکان عمداً به خودش آسیب می زند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۳. آیا کودکان از چیزهای خطرناک مانند آتش و ماشین های در حال حرکت، دوری می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۴. آیا کودکان عمداً به چیزهایی آسیب می زند یا آنها را از بین می برد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۵. آیا کودکان برای بیان احساسات خودش یا احساسات دیگران از کلمات استفاده می کند؟ مثلاً آیا می گوید "من خوشحالم"، "من اونو دوست ندارم" یا "او ناراحته"؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۶. آیا کودکان می تواند اسم یک دوستش را بگوید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۷. آیا کودکان دیگر دوست دارند با کودک شما بازی کنند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۸. آیا کودکان دوست دارد با کودکان دیگر بازی کند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۹. آیا کودکان سعی می کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلاً با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۰. آیا کودکان علاقه یا اطلاعات زیاد و غیر معمولی نسبت به اصطلاحات و حرفهای جنسی و رفتارهای جنسی از خود نشان می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳۱. آیا کودکان سعی می کند با اشاره کردن به چیزها و سپس برگشتن و نگاه کردن به شما، آنها را به شما نشان دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳۲. آیا کودک شما وانمود می کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟ مثلاً با یک موز ادای گوشی تلفن را در می آورد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۳. آیا کودکان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۴. آیا کودکان بیش از حد نگران یا وحشت زده است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۵. آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما درمیان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

۳۶. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندان نگرانی دارید؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.
 بله خیر

۳۷. آیا چیزی درباره کودکان شما را نگران می کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.
 بله خیر

۳۸. از چه چیز فرزندان لذت می برید؟



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱. آیا وقتی با کودکان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲. آیا کودکان بیش از حد انتظارتان به شما می چسبند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳. آیا کودکان با افراد بزرگسالی که کاملاً می شناسد حرف می زند یا بازی می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۴. وقتی کودکان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف ۱۵ دقیقه آرام می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۵. آیا کودکان دوست دارد که او را در آغوش بگیرند و نوازش کنند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۶. آیا به نظر می رسد که کودکان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۷. آیا کودکان بعد از انجام فعالیت های هیجان انگیز، خودش خود بخود آرام می گیرد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۸. آیا کودکان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۹. آیا کودکان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۰. آیا کودکان می تواند در طول روز خودش را خیس نکند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۱. آیا کودکان برای غذا خوردن مشکلاتی دارد؟ مثلاً آیا دهانش را بیش از حد پراز غذا می کند، استفراغ می کند، چیزهایی که خوراکی نیستند را می خورد، یا ...؟ (لطفاً توضیح دهید).
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۲. آیا شما و کودکان از زمانهای غذا خوردن با هم لذت می برید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۳. آیا کودکان کاری را که از او می خواهید، انجام می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۴. آیا کودکان شاد و خوشحال به نظر می رسد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۵. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۸ ساعت می خوابد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۶. آیا کودکان پر تحرک تر و پر جنب و جوش تر از کودکان هم سن و سال خود به نظر می رسد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۷. آیا کودکان برای گفتن خواسته ها و نیازهایش به شما از کلمات استفاده می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۸. آیا کودکان فعالیت هایی را که از آنها لذت می برد حداقل ۱۰ دقیقه ادامه می دهد؟ (منظور فعالیت هایی که غیر از تماشای نمایش یا فیلم یا بازی با وسایل الکترونیک است)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۹. آیا کودکان برای بیان احساسات خودش یا احساسات دیگران از کلمات استفاده می کند؟ مثلاً آیا می گوید "من خوشحالم"، "من اونو دوست ندارم" یا "او ناراحته"؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۰. آیا کودکان بدون مشکل زیادی از سربیک فعالیت سراغ فعالیت بعدی می رود (مثلاً از بازی کردن دست کشیده و به خوردن غذا مشغول می شود)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۱. آیا کودکان مکان های جدید مانند یک پارک یا خانه یک دوست را جستجو و کشف می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۲. آیا کودکان کارهایی را بارها و بارها تکرار می کند و وقتی سعی می کنید متوقفش کنید، ناراحت می شود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن بالا و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ...؟ (لطفاً توضیح دهید).

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزیند	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۳. آیا کودکان عمداً به خودش آسیب می زند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۴. آیا کودکان در منزل یا در مهدکودک از مقررات پیروی می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۵. آیا کودکان عمداً به چیزهایی آسیب می زند یا آنها را از بین می برد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۶. آیا کودکان از چیزهای خطرناک مانند آتش و ماشین های در حال حرکت، دوری می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۷. آیا کودکان می تواند اسم یک دوستش را بگوید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۸. آیا کودکان نسبت به احساسات سایر افراد اهمیت و توجه نشان می دهد؟ مثلاً آیا وقتی کسی آسیب می بیند یا ناراحت است، او غمگین به نظر می رسد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۹. آیا کودکان دیگر دوست دارند با کودک شما بازی کنند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳۰. آیا کودک شما دوست دارد با کودکان دیگر بازی کند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۱. آیا کودکان سعی می کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلاً با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۲. آیا کودکان علاقه یا اطلاعات زیاد و غیرمعمولی نسبت به اصطلاحات و حرف های جنسی و رفتارهای جنسی از خود نشان می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۳. آیا کودکان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۴. آیا کودکان بیش از حد نگران یا وحشت زده است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳۵. آیا کودکان با شما مکالمه و گفتگوی دوطرفه ساده دارد؟ به عنوان مثال، پدر یا مادر: «داره بارون میاد!» کودک: «بیرون هوا سرده» پدر یا مادر: «بیا کاپشنت رو برداریم» کودک: «من برداشتم»
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۶. آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما در میان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

۳۷. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندان نگرانی دارید؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.
 بله خیر

۳۸. آیا چیزی درباره کودکان شما را نگران می کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.
 بله خیر

۳۹. از چه چیز فرزندان لذت می برید؟



تاریخ تکمیل پرسشنامه: شماره تماس:

نام و نام خانوادگی کودک:	کد ملی:	تاریخ تولد:
--------------------------	---------	-------------

- بر مبنای رفتارهای معمول کودکان به سوالات پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.
- پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از ۲۰-۱۵ ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱. آیا وقتی با کودکان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲. آیا کودکان بیش از حد انتظارتان به شما می چسبند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳. آیا کودکان دوست دارد که او را در آغوش بگیرند و نوازش کنند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۴. آیا کودکان با افراد بزرگسالی که کاملاً می شناسد حرف می زند یا بازی می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۵. وقتی کودکان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف ۱۵ دقیقه آرام می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۶. آیا به نظر می رسد که کودکان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۷. آیا کودکان بعد از انجام فعالیت های هیجان انگیز، خودش خودبخود آرام می گیرد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۸. آیا کودکان شاد و خوشحال به نظر می رسد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۹. آیا کودکان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۰. آیا کودکان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۱. آیا کودکان خودش به تنهایی به دستشویی (توالت) می رود؟ (یادآوری کردن به او و کمک کردن به او در شستشو اشکالی ندارد.)
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۲. آیا کودکان برای غذا خوردن مشکلاتی دارد؟ مثلاً آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند، استفراغ می کند، چیزهایی که خوراکی نیستند را می خورد، یا ...؟ (لطفاً توضیح دهید.)
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۳. آیا کودکان فعالیت هایی را که از آنها لذت می برد حداقل ۱۰ دقیقه ادامه می دهد؟ (منظور فعالیت هایی به غیر از تماشای نمایش یا فیلم یا بازی با وسایل الکترونیک است؟)
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۴. آیا شما و کودکان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۵. آیا کودکان کاری را که از او می خواهید، انجام می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۱۶. آیا کودکان پر تحرک تر و پر جنب و جوش تر از کودکان هم سن و سال خود به نظر می رسد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۷. آیا کودکان در طول ۲۴ ساعت، حداقل ۸ ساعت می خوابد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۸. آیا کودکان برای گفتن خواسته ها و نیازهایش به شما از کلمات استفاده می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۱۹. آیا کودکان برای بیان احساسات خودش یا احساسات دیگران از کلمات استفاده می کند؟ مثلاً آیا می گوید "من خوشحالم"، "من اونو دوست ندارم" یا "او ناراحته"؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۰. آیا کودکان بدون مشکل زیادی از سربیک فعالیت سراغ فعالیت بعدی می رود (مثلاً از بازی کردن دست کشیده و به خوردن غذا مشغول می شود)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۱. آیا کودکان مکان های جدید مانند یک پارک یا خانه یک دوست را جستجو و کشف می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۲. آیا کودکان کارهایی را بارها و بارها تکرار می کند و وقتی سعی می کنید متوقفش کنید، ناراحت می شود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن بالا و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ...؟ (لطفاً توضیح دهید.)

امتیاز	اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید	به ندرت یا هرگز	گاهی	اغلب یا همیشه	سوالات
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۳. آیا کودکان عمداً به خودش آسیب می زند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۴. آیا کودکان در منزل یا در مهدکودک از مقررات پیروی می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۲۵. آیا کودکان عمداً به چیزهایی آسیب می زند یا آنها را از بین می برد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۶. آیا کودکان از چیزهای خطرناک مانند آتش و ماشین های در حال حرکت، دوری می کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۷. آیا کودکان نسبت به احساسات سایر افراد اهمیت و توجه نشان می دهد؟ مثلاً آیا وقتی کسی آسیب می بیند یا ناراحت است، او غمگین به نظر می رسد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۸. آیا کودکان دیگر دوست دارند با کودک شما بازی کنند؟ 
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۲۹. آیا کودک شما دوست دارد با کودکان دیگر بازی کند؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۰. آیا کودکان سعی می کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلاً با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳۱. آیا وقتی کودکان با کودکان دیگر بازی می کند، نوبت را رعایت می کند و وسایلش را با آنها شریک می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۲. آیا کودکان علاقه یا اطلاعات زیاد و غیرمعمولی نسبت به اصطلاحات و حرف های جنسی و رفتارهای جنسی از خود نشان می دهد؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۳. آیا کودکان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۴. آیا کودکان بیش از حد نگران یا وحشت زده است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	۳۵. آیا کودکان با شما مکالمه و گفتگوی دوطرفه ساده دارد؟ به عنوان مثال، پدر یا مادر: «داره بارون میاد!» کودک: «بیرون هوا سرده» پدر یا مادر: «بیا کاپشنت رو برداریم» کودک: «من برداشتم»
	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> z	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> x	۳۶. آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکان با شما درمیان گذاشته است؟ اگر پاسخ شما «گاهی» یا «اغلب یا همیشه» است، لطفاً توضیح دهید:
جمع امتیاز					

کلیات

از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود استفاده کنید.

۳۷. آیا درباره خوردن یا خوابیدن فرزندان نگرانی دارید؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.
 بله خیر

۳۸. آیا چیزی درباره کودکان شما را نگران می کند؟ اگر پاسخ «بله» را انتخاب کردید، لطفاً توضیح دهید.
 بله خیر

۳۹. از چه چیز فرزندان لذت می برید؟

توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی - احساسی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



هنگامی که کودک خود را

به پشت خوابانده‌اید دستمال کاغذی بردارید، بالای سرش تکان دهید تا ببیند. همچنین می‌توانید دستمال‌ها را به پرواز در آورید، قسمت‌هایی از بدن کودک خود را قلقلک دهید. توجه کنید کودکان چگونه عکس‌العمل نشان می‌دهند، اگر نق نق کرد، ادامه ندهید.

اگر کودکان گریه می‌کند، علتش را پیدا کنید. او با گریه‌اش می‌خواهد چیزی را به شما بفهماند و وقتی شما پاسخگوی خواسته او هستید یاد می‌گیرد که به شما اعتماد کند و بداند همیشه در کنارش هستید.

برای کودک خود شعرهایی که از کودکی به یاد دارید بخوانید. هنگامی که او را در آغوش گرفته‌اید و یا در تخت خوابیده با او حرف بزنید و برای او شعر بخوانید و به آرامی دستها و بدن خود را حرکت دهید.

کودک خود را در آغوش بگیرید و صورتتان را به او نزدیک کنید. برای او شکلک در بیاورید. به او بخندید. برایش زبان در بیاورید. چند لحظه صبر کنید تا ببینید آیا او سعی می‌کند کارهای شما را تکرار کند.

پشت سر کودک خود طوری بایستید که او شما را ببیند، به آرامی نام او را صدا بزنید، نگاه کنید چه می‌کند، آیا برای لحظه‌ای بی حرکت می‌ماند؟ سعی می‌کند سرش را به سمت صدای شما برگرداند؟ او را بلند کنید و بگویید من انجام.

با کودک خود درباره چیزهایی که انجام می‌دهد، می‌بیند، می‌شنود و احساس می‌کند صحبت کنید. من در حال عوض کردن پوشک تو هستم. تو خشک و تمیز خواهی شد. من عاشقتم.

اشیا جدید و ایمنی جهت کشف کردن به کودک خود نشان دهید. اشیای ساده‌ای چون فنجان‌های پلاستیکی و قاشق‌های چوبی برای او تازگی دارند.

اشیا جذابی در کنار تخت کودکان قرار دهید تا ببیند، آن‌ها را دور از دسترس او قرار دهید. تماویر ساده‌ای از مجلات بر روی دیوار بچسبانید.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی - احساسی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



برنامه مخصوص کودک خود را
یاد بگیرید و سعی کنید این برنامه را به
یک برنامه منظم و روزانه معمول برای
خوردن، خوابیدن و تعویض پوشک
تبدیل کنید. با کودک خود در مورد این
برنامه‌ها صحبت کنید. این کمک می‌کند
کودکتان احساس امنیت و آرامش کند.

اجازه دهید کودک خود را
غذا بخورد و از قاشق و فنجان
استفاده کند. او از انجام
کارهای لذت می‌برد.

کودک خود را برای دیدن اشیاء جدید
به مکان‌های جدید ببرید. برای قدم
زدن به پارک یا مرکز خرید بروید. وقتی
شما او را در جای امنی نگه می‌دارید، او
از دیدن اشیاء جدید بسیار لذت می‌برد.

وقتی کودکتان گریه می‌کند،
پاسخگوی او باشید. برای آرام کردن او
در گوشش زمزمه کنید. او را در آغوش
بگیرید و به آرامی با او صحبت کنید.
این کار به او کمک می‌کند
تا بداند شما همیشه هستید و
دوستش دارید.

وقتی به او غذا می‌دهید، لباس
می‌پوشانید و یا پوشکش را عوض
می‌کنید نامش را بر زبان آورید، مثلاً
بگویید این انگشتان دست راست
است، این پای راست است.

دوستی را که نوزاد یا کودکی دارد
ملاقات کنید. نزدیک کودک خود
بمانید و به او بفهمانید این افراد
جدید، خوب هستند. برقراری
ارتباط با آن‌ها زمان می‌برد.

با کودک خود روی زمین بنشینید
و با او بازی‌های مخصوص او را
انجام دهید. به اسباب بازی‌ها،
کتاب‌ها یا اشیاء با هم نگاه کنید. با
هم تفریح کنید، بخندید و از با هم
بودن لذت ببرید.

زمان حمام، زمان مناسبی برای
تفریح و نزدیک شدن به کودکانتان
است. لیف، فنجان پلاستیکی، لباس
شسته شده، اسباب بازی‌های ساده
و ارزان برای بازی با کودک در حمام
هستند.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی - احساسی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



برای پیاده روی او را به پارک و یا جایی ببرید که کودکان در حال بازی هستند. اجازه دهید کودکان آن‌ها را تماشا کند و اگر آمادگی دارد با کودکی آشنا شود.

با او بازی‌های پرتحرک انجام دهید. وقتی بالا و پایین می‌پرد، دستان او را بگیرید و با هم این کار را انجام دهید. وقتی می‌پرد، دست بزنید و تشویقش کنید.

هر روز وقتی کودکان از خواب بیدار می‌شود و هر بار شب‌ها در حال خوابیدن است به او بگویید که چقدر دوستش دارید و چقدر او برای شما خاص است.

هر روز روی زمین بنشینید و با کودک خود بازی کنید. با او چهار دست و پا راه بروید یا فقط بنشینید و در حد او بازی کنید. او از کنار شما بودن واقعاً لذت می‌برد.

وقتی به او لباس می‌پوشانید و یا وقتی در حال پوشک کردن او هستید، در مورد اعضای بدنش با او صحبت کنید و قسمت‌هایی از بدن خود را به او نشان دهید. بگویید: این بینی مامان است، این بینی مباب است.

به آرامی کودک خود را قلقلک دهید، هر زمان که کودک تمایل به بازی نداشت از قلقلک دادن دست بردارید.

روی زمین بنشینید و با او توپ بازی کنید. وقتی کودکان توپ را به سمت شما می‌اندازد یا توپ را می‌گیرد، دست بزنید و او را تشویق کنید.

کودک خود را دور تا دور بچرخانید. او از چرخیدن و جست و خیز کردن لذت می‌برد اما مطمئن شوید وقتی این کار را به اندازه کافی انجام دادید، دست از این بازی بردارید.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی - احساسی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



کودک شما به زمان زیادی برای حرکت و ورزش نیاز دارد. به پیاده روی و زمین بازی بروید و یا به مرکز خرید بروید.

وانمود کنید با حیوانات پارچه‌ای یا عروسک‌ها مهمانی گرفته‌اید. می‌توانید عکس‌های مجله‌ای را ببرید و به عنوان هدیه استفاده کنید. کیکی الکی آماده کنید و آواز تولد مبارک بخوانید.

کودک شما نیاز به داشتن یک برنامه روزانه منظم دارد. در مورد کاری که برایش انجام می‌دهید و کاری که قرار است برایش انجام دهید با او صحبت کنید. برای فعالیت داشتن و برای آرام بودن به او زمان بدهید.

با کودک خود حرکات ورزشی انجام دهید. از وسیله‌ای ساده مانند لوله بلند پلاستیکی جهت تپل زدن و یا ظرفی پلاستیکی پر شده با برنج و لوبیا به عنوان جغجه استفاده کنید.

کودک شما به کمک در کارهای خانه علاقه دارد. به او وظایف کوچکی بدهید و به او بفهمانید بزرگ شده است. او می‌تواند میز را تمیز کند، اسباب بازی‌هایش را جمع کند یا در جارو زدن کمک کند.

کمک کنید کودکان احساسات را یاد بگیرند. مقابل آینه شکلک خوشحال، ناراحت، عصبانی در بیاورید. این کار سرگرمی خوبی است.

برای بازی او با کودکان دیگر وقت تنظیم کنید. هنوز کودک شما نمی‌فهمد چطور چیزی را شریک شود. بنابراین مطمئن شوید مقدار کافی اسباب بازی وجود دارد. کنار او بمانید و کمکش کنید تا یاد بگیرد چطور با کودکان دیگر بازی کند.

زمان‌های داستان خوانی، خصوصاً قبل از چرت زدن و وقت خواب، روش مناسبی برای آرام کردن او قبل از خواب است. بگذارید کودکان کتابی را که دوست دارد انتخاب کنند. در ورق زدن کمک کند و خودش ورق بزند. کمک کنید تصاویری را که می‌بیند، نام ببرد.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی - احساسی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



همراه کودک خود نمایش بازی کنید و یا او را برای انجام کاری رهبری کنید. کودک شما دوست دارد از شما پیروی کند و رهبری کردن را یاد بگیرد.

سعی کنید برنامه‌های منظمی در طول روز داشته باشید، اجازه دهید کودکتان از برنامه بعدی با خبر شود. اینطور بگویید: وقتی موهات رو شانه زدم، لباس می‌پوشیم.

هر روز زمان مخصوصی برای خواندن با کودک خود داشته باشید. کنار هم بنشینید و به هم نزدیک شوید. قبل از خواب یا چرت زدن، زمان مناسبی است برای اینکه با هم داستان بخوانید.

به کودک خود حق انتخاب بدهید. توجه کنید انتخاب‌های آسانی باشد. اجازه دهید هنگام لباس پوشیدن پیراهن قرمز یا آبی را انتخاب کند. اجازه دهید شیر یا آبمیوه انتخاب کند.

کودک خود را تشویق کنید که بازی‌هایی با وانمود کردن انجام دهد. مندلی‌های کوچکی را پشت به هم قرار دهید تا بوسی بسازید، مقداری کاغذ ببرید و به جای پول از آن استفاده کنید. از او بپرسید امروز قرار است کجا برویم؟

به کودک خود آوازهای ساده و بازی‌های ساده به وسیله انگشتان یاد بدهید مثل آتل متل و کلاغ پر...

کودک شما در حال یادگیری احساسات است. به او کمک کنید احساساتش را بشناسد. وقتی عصبانی، ناراحت یا خوشحال است بگویید: تو واقعاً خوشحالی یا عصبانی به نظرمی رسی.

روی زمین بنشینید و با کودک خود بازی کنید. سعی کنید با اسباب بازی‌هایی که انتخاب می‌کند بازی کنید و ایده‌های او را امتحان کنید. اینگونه از خواسته‌های او پیروی خواهید کرد.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی - احساسی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



به کودک خود دستورهای دو مرحله‌ای بدهید. بگویید: اسباب بازی‌ها را در جعبه بریز و در قفسه قرار بده. طوری رفتار کنید تا احساس کند کار او کمک بزرگی است.

یک کتاب به عنوان «کتاب من» برای کودک خود بسازید. دفتری بردارید و عکس‌های او، عکس‌های خانوادگی، عکسی از حیوان خانگی‌تان و یا عکس‌های دیگر مورد علاقه او را در آن قرار دهید.

اجازه دهید هنگام تمیزکاری و غذا پختن کودکان به شما کمک کنند. او می‌تواند در کارهایی مثل هم زدن، ریختن آرد در فنجان یا گذاشتن قاشق‌ها و چنگال‌ها در کشو کمک کند.

اجازه دهید کودکان کارهای بیشتری برای خودش انجام دهد. او می‌تواند وقت بیرون رفتن خودش لباس و کفش بپوشد. مطمئن شوید به او زمان کافی برای تمرین این مهارت‌های جدید را داده‌اید. بگویید: چه پسر بزرگی!

کودک شما دوست دارد از شما تقلید کند. کلمات جدید بکار ببرید. صدای حیوانات مختلف را در بیاورید و ببینید آیا کودک شما چیزی که می‌گویید یا صدایی که درمی‌آورید را تکرار می‌کند.

بازی‌های خلاقانه او مانند: طراحی با مداد شمعی، نقاشی و بازی با خمیر را تشویق کنید. گچ بازی روی پیاده‌رو تفریح خوبی است.

با کودک خود بازی کنید و به او کمک کنید تا شریک شدن را یاد بگیرد. وقتی چیزی را با شما شریک می‌شود از این کار خوب او تعریف کنید. این کار برای او یک موفقیت جدید است پس در این سن خیلی از او انتظار نداشته باشید این کار را به خوبی انجام دهد.

با دوستی که بچه‌ای هم سن و سال او دارد، قرار بازی بگذارید. سعی کنید این قرار کوتاه، مثلاً یک یا دو ساعت باشد. وقت برای بازی همراه اسباب بازی، برای خوردن غذایی سبک و برای بازی بیرون از خانه بگذارید. در آخر بگویید: خیلی خوش گذشت. دفعه بعدی می‌بینیمت.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی- احساسی

یادگیری فرزندتان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندتان را تحسین کنید.



برای کودک خود داستانی ساده در مورد کار خنده دار یا جالبی که در گذشته انجام داده تعریف کنید. ببینید آیا او می‌تواند داستان دیگری در مورد خودش تعریف کند.

وقت شام به اعضای خانواده فرصت دهید تا در مورد اتفاقات روزشان صحبت کنند. کمک کنید کودکان در مورد روزش صحبت کنند. بگویید: من و ماما امروز به پارک رفتیم. ماما، به خواهرت بگو امروز در پارک چکار کردی.

صورت‌های ساده‌ای که احساساتی چون شادی، غم، هیجان یا حماقت را نشان می‌دهد بکشید، آن‌ها را ببرید و به چوب بستنی یا خودکار بچسبانید. اجازه دهید کودکان با این عروسک‌ها احساسات مختلف را نشان دهند.

به کودک خود دستوراتی بدهید که حداقل دو مرحله داشته باشد. وقتی با هم در حال آشپزی، لباس پوشیدن، تمیز کردن هستید بگویید: آن ماهیتابه را در سینک ظرفشویی بگذار و سپس آن قاشق قرمز را بردار و بیاور.

برای کودک خود لطفه‌های ساده و خنده دار تعریف کنید. معماها هم سرگرم کننده هستند. زمان خوبی را با کودک خود بگذرانید و با هم بخندید.

برای کودک خود داستان مورد علاقه‌اش را بگویید. مثل داستان: بزیز قندی، کدو قلقله زن، سه بچه خرس. ببینید آیا کودک شما می‌تواند احساسات شخصیت‌های داستان را بیان کند.

بازی‌هایی انجام دهید که او را درگیر پیروی از قوانین ساده‌ای چون: «مادر اجازه دارم.....» و «چراغ قرمز، چراغ سبز» کند.

بحثی الکی بین حیوانات پارچه‌ای یا عروسک‌ها ایجاد کنید و با کودک خود در مورد اتفاقی که افتاد، احساسات و بهترین راه حل مشکلاتی که بوجود می‌آیند صحبت کنید.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی - احساسی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



هر روز یک احساس جدید را به او معرفی کنید، مثل: بی حوصلگی، برای نشان دادن این احساس از تصاویر، حرکات صورت و کلمات استفاده کنید. کودک خود را تشویق کنید تا از کلمات مختلفی برای بیان احساساتش استفاده کند.

او را تشویق به انجام فعالیت‌هایی کنید که شامل شریک شدن می‌شود، مثل لگوبازی، رنگ آمیزی با مداد شمعی، بازی لباس پوشیدن، به کودک خود آموزش دهید چگونه برای بازی کردن نوبت بگیرد. به کودک خود زمان زیادی برای بازی با کودکان دیگر بدهید.

کودک خود را برای داستان خواندن به کتابخانه ببرید. او می‌تواند نشستن گروهی و داستان خواندن را یاد بگیرد.

کودک خود را به مغازه، رستوران و کتابخانه ببرید. مکان‌هایی جدید را به او آموزش دهید. در مورد اینکه چطور مردم شبیه به هم و یا متفاوت هستند با او صحبت کنید.

با چسب و کاغذ عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی بسازید و به عنوان موبر روی سرشان کاموا بچسبانید. با عروسک‌ها برنامه‌ای در مورد دو کودک که تازه همدیگر را دیده و دوست شده اند اجرا کنید.

وقتی در حال انجام کارهای خانه یا حیاط هستید، به کودک خود اجازه دهید قسمت‌های کوچکی از کار را خودش به تنهایی انجام دهد. اجازه دهید سطل زباله را خالی کند یا خرده نان‌ها را از روی میز پاک کند.

فرصت‌هایی برای خلاق بودن کودک خود فراهم کنید. قوطی‌های خالی، چسب، روزنامه‌ها، نوار چسب و مجلات می‌توانند ابزار مناسبی برای نوآوری باشند.

از حیوانات پارچه‌ای برای نقش بازی کردن استفاده کنید. طوری که با هم بحث کنند. سپس در مورد تفاوت احساسات حیوانات مختلف صحبت کنید و بعد در مورد راه‌های مختلف به توافق رسیدن صحبت کنید.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت‌های اجتماعی - احساسی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



وقتی کودکان دوستانش را دعوت کرده، او را تشویق به انجام بازی‌های دسته جمعی کنید. سعی کنید با ملحفه‌ها چادر بسازید، قایم باشک بازی کنید یا تئاتر اجرا کنید.

از کودک خود تاریخ تولد، شماره تلفن و نام و نام خانوادگی‌اش را بپرسید. با او تمرین کنید که اگر در مغازه از شما جدا شود، چه خواهد کرد.

بازی‌های تخته‌ای و یا کارتی که دو یا سه قانون دارد برای کودک خود انجام دهید.

با کودک خود داستان‌های کودکانه‌ای بخوانید و در مورد درست یا غلط بودن تصمیماتی که شخصیت‌های داستان گرفته‌اند، گفتگو کنید.

در مورد خطرات واقعی صحبت کنید (آتش، اسلحه، ماشین) و همچنین در مورد خطرات خیالی مانند هیولای زیر تخت. برای توضیح بیشتر نقاشی بکشید و یا از تصاویر موجود مجلات استفاده کنید.

به کودک خود تصاویر مردم با فرهنگ‌های متفاوت را نشان دهید و با او در مورد مسائلی که بین خانواده شما و آن‌ها مشترک یا متفاوت است توضیح دهید.

پیراهن، کلاه و کلاً لباس‌های قدیمی دوستان خود را جمع کنید و با آن‌ها نمایش اجرا کنید و آواز بخوانید.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی
یادگیری فرزندتان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندتان را تحسین کنید.



وقتی کودکتان صداهایی مثل حرف زدن از خود در می‌آورد، با رعایت نوبت به گفتگو با او بپردازید. این کار را با صداهای ساده‌ای انجام دهید که او هم بتواند تکرار کند.

کودک خود را بر روی شکم روی بازوی خود نگه دارید و دست خود را روی سینه او قرار دهید. از دست دیگر خود برای ایمنی کودک و محافظت از سر و گردنش استفاده کنید. به آرامی او را عقب و جلو تاب دهید. وقتی کمی بزرگتر شد، در این حالت راه بروید تا مناظر بیشتری را در معرض چشم او قرار دهید.

به آرامی جفجه یا اسباب بازی دیگری که صدادار است؛ تکان دهید آن را به دست کودک بدهید، حتی اگر برای لحظه‌ای آن را بگیرد و تکان دهد.

کتاب‌های ساده برای کودکتان بخوانید. حتی اگر داستان را متوجه نشود، از گوش دادن به خواندن شما لذت می‌برد.

روی کاغذ سفید با ماژیک مشکی تصاویری بکشید که به راحتی قابل تشخیص باشد. با طرح‌های ساده مثل: خطوط مورب، دایره و مثلث شروع کنید. این تصاویر را جایی در فاصله ۳۰ سانتیمتر از چشم او قرار دهید. این تصاویر را جلوی تخت خواب یا صندوق ماشین او قرار دهید.

عروسک پارچه‌ای یا جوراب کوچکی روی انگشت خود قرار دهید و در حالی که انگشت خود را به بالا و پایین تکان می‌دهید، نام کودکتان را صدا بزنید. توجه کنید که او حرکات را دنبال می‌کند یا نه. حالا انگشت خود را به صورت دایره‌ای حرکت دهید و هر بار که کودکتان توانایی دنبال کردن حرکت شما را پیدا کرد، حرکتی جدید را امتحان کنید.

آینه نشکنی را نزدیک کودک خود، در جایی قرار دهید که او به راحتی بتواند خود را ببیند. شروع به ضربه زدن به شیشه و حرف زدن با او کنید تا توجه او را جذب کنید. بالاخره کودک متوجه واکنش‌های خود خواهد شد و آینه برای او انگیزه تصویری به وجود می‌آورد.

برای کودکتان آواز بخوانید (حتی اگر این کار را بخوبی انجام نمی‌دهید) تکرار ترانه‌ها و لالایی‌ها کمک می‌کند تا کودک تان گوش بدهد و یاد بگیرد.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی

یادگیری فرزندتان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندتان را تحسین کنید.



در حالی که روی زمین نشسته‌اید، کودک‌تان را بین پاهایتان بنشانید. از پاها و بدن‌تان برای حمایت مورد نیاز کودک جهت نشستن استفاده کنید. این حالت نشستن به شما کمک می‌کند در حالی که به او مستقل نشستن را آموزش می‌دهید، با او بازی کنید.

به آرامی لباس نرمی، حوله، کاغذ یا نایلونی به تن کودک خود بمالید، با او در مورد اینکه بالمس اینها چه احساسی دارد صحبت کنید. (نرم، زبر، لغزنده) استفاده از لوسیون‌ها هم احساس خوبی به او می‌دهد.

بازی‌های صوتی انجام دهید.
با صدای بلند و کوتاه حرف بزنید. با زبان خود صداهایی در بیاورید. زمزمه کنید. به نوبت این کارها را با هم انجام دهید و صداهایی که او تولید می‌کند تکرار کنید. کودک‌تان را طوری قرار دهید که صورت‌تان رو به روی هم قرار گیرد، اینگونه وقتی شما صداهای او را تولید می‌کنید، کودک‌تان شما را می‌بیند.

به وسیله لوازم خانگی معمولی مانند قاشق‌های اندازه‌گیری و فنجان‌های پیمانه، اسباب‌بازی‌هایی با صداهای جذاب بسازید و آن‌ها را از جایی که در دسترس کودک است می‌تواند به آن‌ها ضربه بزند به صورت ردیفی آویزان کنید. اجازه دهید کودک برای بررسی و تکان دادن، آن‌ها را در دست‌تانش بگیرد.

در حالی که کودک‌تان را به پشت خوابانده‌اید، یک اسباب‌بازی را در معرض دید او اما دور از دسترس قرار دهید. یا یک اسباب‌بازی را در محدوده دید او حرکت دهید. او را تشویق کنید برای گرفتن اسباب‌بازی غلت بزند.

کودک خود را طوری روی صندلی یا صندلی ماشین قرار دهید تا تمامی فعالیت‌ها را ببیند. کاری را که انجام می‌دهید برای او شرح دهید. اجازه دهید کودک ببیند، بشنود و اشیاء معمولی را لمس کند. شما می‌توانید وقتی در حال انجام کارها هستید، به کودک خود توجه کنید.

کودک‌تان دوست دارد اسباب‌بازی‌ها را روی زمین بریزد. کمی وقت بگذارید و بازی «برو و بیارش» را انجام دهید. این کار به کودک کمک می‌کند تا جمع‌آوری اشیاء را یاد بگیرد. به کودک جعبه‌ای دهید تا تمرین کند اسباب‌بازی‌ها را در آن بیاورد.

کودک‌تان را رو به روی خود قرار دهید، کودک می‌تواند حالت‌های صورت‌تان را ببیند (لبخند، بیرون آوردن زبان، بالا بردن ابروان و فوت کردن) نوبت را به کودک‌تان بدهید تا این کارها را انجام دهد و کارهای او را تکرار کنید.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.

انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.

تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



اجازه دهید کودکان در انجام کارهای روزانه کمک کند. کودک تان را تشویق کنید وقت ناهار خودش از قاشق و فنجان استفاده کند. خودش کفش و کتتش را برای پوشیدن پیدا کند و خودش شلوار و پوشک اش را برای تعویض بیاورد. با انجام این کارها، مهارت مهمی که کودک شما یاد می‌گیرد، پیروی از دستورالعمل‌هاست.

کودکان در این سن عاشق بازی کردن هستند. روش‌های مختلف انجام بازی‌ها را امتحان کنید و ببینید آیا کودک تان شما را همراهی می‌کند. برای «دالی کردن» پشت درب یا مبل قایم شوید. برای انجام بازی «صدا در آوردن» با درب دیگ‌ها یا ماهیتابه صدا تولید کنید.

کودکان از بازی با اسباب بازی‌هایی که می‌توانند هل بدهند یا به دنبال خود بکشند لذت می‌برند. با بریدن ظروف مقوایی مواد خوراکی، فرفره یا با وصل کردن نخ نرمی (طول نخ حدود ۱ متر باشد) به جعبه‌های کوچک به راحتی چنین اسباب بازی‌هایی بسازید. یک حلقه پلاستیکی به عنوان دسته، به یک طرف آن ببندید.

تکه کاغذ بزرگی را با نوار چسب به میز بچسبانید. به کودک تان یاد دهید چطور با مداد شمعی خط خطی کند. به نوبت روی کاغذ نقاشی بکشید. نقاشی با آبرنگ هم سرگرم کننده است.

به وسیله جوراب یا کیسه کاغذی یک عروسک خیمه شب بازی برای خودتان و یکی هم برای کودکان بسازید. با عروسک خیمه شب بازی با کودکان و یا عروسک او صحبت کنید و کودکان را تشویق به جواب دادن کنید.

غذاهای کوچک بی‌خطر را تکه کنید. (از غذاهایی که ممکن است باعث خفگی کودکان شود استفاده نکنید) و به کودک اجازه دهید خودش غذا بخورد. این تمرین خوبی برای برداشتن قطعه‌های کوچک و احساس کردن بافت‌های مختلف است. (موز، کلوچه‌های نرم، میوه‌های توت مانند)

الان زمانی است که کودک شما یاد می‌گیرد که بزرگترها می‌توانند برای او مفید باشند. وقتی کودکان با سرو صدا یا اشاره کردن چیزی را درخواست می‌کند، به خواسته اش پاسخ دهید. وسیله‌ای را که می‌خواهد نام ببرید و او را تشویق کنید دوباره خواسته اش را بیان کند و در مورد آن وسیله با او صحبت کنید.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



شعرهای مورد علاقه کودک را با همدیگر بخوانید و با هم در حین خواندن شعرها دست‌ها و بدن خود را حرکت دهید و به عکس‌العمل کودک خود نگاه کنید.

کودک نوپای شما جست‌خیز و فعالیت را دوست دارد. او را برای، سوار شدن در اسباب بازی‌ها مثل سرسره و تاب به پارک ببرید. اما به این نکته نیز توجه داشته باشید در هنگام استفاده از برخی اسباب بازی‌ها مانند چرخ فلک، کودکان در بغل شما باشد و کمربند بسته شود.

فعالیت‌های هنری مثل نقاشی برای کودکان جالب و سرگرم‌کننده است برای اینکار از مداد رنگی‌های غیرسرب‌دار استفاده کنید و آنها را همراه با کاغذ در اختیار کودکان قرار دهید. در برخی موارد کودکان مازیک‌های رنگ روشن و براق را بیشتر دوست دارند و بازی با آنها برایشان هیجان‌انگیزتر است اجازه دهید با مدادها یا مازیک‌های رنگی روی کاغذ خط خطی کنند.

کودکان در این سنین علاقه دارند اشیاء را در هر حفره یا سوراخی که می‌بینند قرار دهند برای اینکار از پازل‌های ساده با تیکه‌های بزرگ استفاده کنید یا کلیدهای اسباب بازی را در اختیار کودکان قرار دهید تا آن‌ها را به داخل جا کلید ببرد یا بازی‌های مشابه این که برای کودک شما بسیار سرگرم‌کننده است را با وی برنامه ریزی کنید.

تظاهر به بازی با کودک نوپایان در این سنین حتی سرگرم‌کننده‌تر می‌شود. او را تشویق کنید تا فعالیت‌های روزانه‌اش مانند رفتن به رختخواب، جست و خیز، خوردن و پریدن را با یک اسباب بازی پارچه‌ای یا عروسک مورد علاقه خود انجام دهد. در واقع عروسک خود را در فعالیت‌های روزانه شریک کند.

یکی از اسباب بازی مورد علاقه کودکان را در سید لباس‌ها به طوری که در دسترس یا در دید کودکان باشد، قرار دهید و منتظر بمانید تا وی اسباب بازی خود را ببیند و آن را از شما درخواست کند، این یکی از راه‌هایی است که بتوانید با کودک ارتباط برقرار کنید. پس به درخواست وی پاسخ بدهید.

با کودکان بازی «این چیه» را انجام دهید برای اینکار به لباس‌ها، اسباب بازی‌ها، تصاویر و عکس‌های اشیاء و یا حتی اعضا بدن کودک اشاره کنید و از وی بپرسید این چیست؟ اگر کودکان نتوانست پاسخ سوال را بدهد، شما به وی اسم شیء مورد اشاره را بگویید و از او بخواهید تکرار کند.

یک تشست پلاستیکی را پر از آرد گندم یا ذرت کنید. داخل آن وسایل آشپزخانه مانند قاشق، فنجان‌های اندازه‌گیری، قیف، ظروف پلاستیکی، یا آبکش‌های کوچک قرار دهید. کودک نوپای شما می‌تواند با این وسایل، پر کردن و خالی کردن را یاد بگیرد. همچنین اشیاء با جنس‌ها و بافت‌های مختلف را لمس کند و یاد بگیرد که چگونه می‌توان از بعضی اشیاء به عنوان ابزار استفاده کرد. چسیدن احتمالی آرد هم خطرناک نیست.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



برای کودکان شرایط نقاشی کردن را فراهم کنید برای اینکار کاغذ و مداد رنگی را در اختیارش بگذارید. برای کودکان اشکال بزرگ را روی کاغذ رسم کنید. به کودکان بگویید این اشکال را رنگ کند.

برای کودکان یک زمین بولینگ درست کنید. به این ترتیب که از قوطی‌ها یا بطری‌ها و ظروف سبک پلاستیکی به عنوان هدف استفاده کنید. به کودکان یاد دهید که چگونه توپ را به سمت هدف‌ها قل دهد تا آنها را واژگون کند. بعد بگذارید کودکان خودش امتحان کند.

مهارت شنیدن کودکان را افزایش دهید برای این کار از سرودهای تند و آرام استفاده کنید. در حین پخش سرود با کودکان حرکات تند و آرام را بازی کنید.

**خواندن اشعار مورد علاقه
مهد کودک فرزندان را به
فعالیت‌های روزانه اضافه کنید
و این کار را با اشعار آسان و
قافیه دار شروع کنید.**

رهبر و راهنما بودن را با کودکان تمرین کنید برای اینکار روی جدول کنار پیاده‌روها با کودکان قدم بزنید سپس به عقب قدم‌ها را بردارید و در ادامه آرام و تند قدم بردارید یا با قدم‌های بلند و کوتاه راه بروید. (قدم‌رو)

کودکان در این سن عاشق بازی‌های وانمودی و خیالی هستند و وقتی شما هم بتوانید همراه آنها وانمود کنید، خیلی لذت می‌برند. مثلاً وانمود کنید که شما یک حیوان، مثل گربه یا سگ هستید. صدا و حرکات مشابه حیوان مورد نظر را در آورید. بگذارید کودکان وانمود کند که صاحب شما است و به شما غذا بدهد.

کودکان قادر هستند از جعبه‌ها استفاده‌های زیادی بکنند به طور مثال کودکان می‌توانند با یک جعبه بزرگ، یک ماشین یا یک خانه بسازد به این صورت که یک سوراخ به عنوان در و یک سوراخ به عنوان پنجره در آن ایجاد کنید. یا جعبه را با استفاده از مداد رنگی و ماژیک و نقاشی کردن بر روی آن تزئین کند. این فعالیت‌ها برای کودک شما سرگرم کننده است.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



قصه آشنا که قبلا کودکان

آن را بارها شنیده است، را برای
او بخوانید و در میان جملات بعضی
کلمات را جا بیاندازید. مثلا بگویید:
«شنگول به آقا گرگه گفت
..... ها تو نشون بده
ببینم».

یک لیوان به کودکان بدهید و یک
لیوان برای خودتان بردارید. قطعات میوه یا تکه
های نان یا بیسکویت را به ترتیب داخل لیوان
کودکتان و داخل لیوان خودتان بیاندازید و
بگویید «یکی برای تو، یکی برای من» بعد لیوان
کودکتان را برگردانید و محتویات داخل آن را خالی
کرده و به او کمک کنید که آنها را بشمارد. این
تمرین خوبی برای کسب مهارت‌های
اولیه ریاضی است.

تعدادی کارت های بازی کودکانه،
که دو به دو مشابه هستند، را در
مقابل کودکان بچینید. به کودکان
یک کارت بدهید واز او بخواهید کارت
دیگر حاوی شکل مشابه را در میان
سایر کارت‌ها پیدا کند.

به کودکان یاد بدهید که هر روز کلمات تازه را
برای توصیف اجسام اطرافش یاد بگیرد و از این کلمات
در گفتگوهای روزانه استفاده کند مثلا توصیف رنگ
اندازه و شکل اشیا (لیوان آبی، توپ بزرگ). همچنین
نحوه حرکت اجسام را توصیف کند (این ماشین تند
حرکت می‌کند، آهسته حرکت می‌کند) و اینکه وقتی
اجسام را لمس می‌کند یا چیزی را می‌خورد یا می‌نوشد
چگونه است؟ سرد، گرم، داغ (بستنی سرد است،
سوپ داغ است)

از مجلات قدیمی عکس‌هایی ببرید که به دو گروه
متفاوت تعلق داشته باشند (مثل گروه حیوانات،
دسته غذاها، دسته لباس‌ها، دسته اسباب بازی‌ها
و...). دو جعبه تهیه کنید و مثلا در یکی از جعبه‌ها
تصویر یک سگ و در جعبه دیگر تصویر یک غذا را قرار
دهید. حالا از کودکان بخواهید که سایر تصاویر
بریده شده از مجله را نیز به طور صحیح در جعبه
متناسب خود قرار دهد. به این ترتیب شما به
کودکتان کمک می‌کنید که «دسته بندی» یا
«طبقه بندی» را یاد بگیرد.

با انداختن یک پتو یا لحاف روی یک میز،
یک خانه یا چادر درست کنید. یک سبد
پیک نیک (سبد مخصوص گردش) هم
برای کودکان آماده کنید. یک بالش هم
برای استراحت و خواب نیم روز به کودکان
بدهید که هنگام پیک نیک و کمپینگ (چادر
زدن) از آن استفاده کند. استفاده از چراغ
قوه هم خیلی لذت بخش
خواهد بود.

برای تقویت هماهنگی و تعادل،
طرز راه رفتن حیوانات مختلف را به کودکان
نشان دهید تا انجام دهد. مثلا «راه رفتن مثل
خرس» به صورت راه رفتن روی دست‌ها و پاها
به طوری که زانوها و آرنج‌ها حتی الامکان خم
نشوند؛ یا «پریدن مثل خرگوش» به
صورت خم کردن کمر و زانو به حالت
شبه چمباتمه و سپس پریدن
به جلو

از کودک خود بخواهید در چیدن میز
به شما کمک کنه برای این کار ابتدا به وی
بگویید بشقاب‌ها را در روی میز و سرجای
خود بچیند سپس لیوان‌ها و در آخر دستمال
سفره را بر روی میز بگذارد با اینکار یاد
می‌گیرد که هر چیزی در کجا قرار گرفته و
تطابق دادن افزایش می‌یابد.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



بیرون از خانه، برای کودکان جاده

یا مسیر حرکت درست کنید. به این صورت که با استفاده از یک تکه گچ، یا شلنگ آب در باغچه، یا یک طناب بلند، مسیری را برای حرکت کودکان بسازید که از کنار دیوار و دور درخت و از زیر نیمکت و ... عبور کند. ابتدا خودتان به کودک برای طی کردن این مسیر کمک کنید و هر بار هم به کلمات «زیر»، «کنار»، «دور»، ... اشاره کنید. وقتی کودکان عبور از این مسیر را به خوبی یاد گرفت، مسیر جدیدی برای بسازید. می‌توانید از کودک بخواهید که خودش یک مسیر جدید بسازد.

همراه با کودکان و با استفاده

از میوه، میوه‌های خشک یا خوراکی‌ها یک گردنبند درست کنید. برای اینکار از خوراکی‌ها و میوه‌هایی مانند انجیر خشک، مویز و یک تکه نخ محکم استفاده کنید. خوراکی‌ها را داخل نخ کرده سپس هر دو انتهای نخ را به هم گره بزنید. تا به شکل یک گردنبند در بیاید.

همراه با کودکان به موسیقی گوش

دهید و بازی کنید. قرار بگذارید که با قطع کردن موسیقی برای لحظاتی، همه باید کاملاً بی حرکت شده و در همان حالتی که قرار دارید، «بی حرکت بمانید». بعد با شروع دوباره موسیقی، حرکات مجدداً شروع می‌شود. برای جالب تر شدن این بازی، سعی کنید در حالت‌های عجیب و غیرعادی بی حرکت شوید.



قبل از زمان خواب، همراه با کودکان

به یک مجله یا کتاب کودکان نگاه کنید. به بعضی از تصاویر اشاره کنید و از کودکان بخواهید که آنها را نام ببرند. مثلاً: «کامیون کجا است؟» گاهی به شوخی از او بخواهید که با آرنج یا پایش تصویر مورد نظر را نشان دهد. از او بخواهید که یک چیز گرد یا یک چیزی که سریع حرکت می‌کند، را در تصاویر نشان دهد.

یک کاغذ بزرگ یا یک مقوا را پیدا کنید و از کودکان بخواهید با مداد رنگی یا ماژیک، یک نقاشی را روی کاغذ رسم کند. حالا بازی را شروع کنید برای اینکار ابتدا کودک را به عنوان مربی در نظر بگیرید و شما هم تمام نقاشی‌های رسم شده توسط کودک را مانند وی بکشید. مثلاً دایره یا خط مستقیم.

موقع درست کردن یا خوردن غذا با کودکان بازی «کمتر» و «بیشتر» را انجام دهید. مثلاً پرسید کی بیشتر سیب زمینی دارد؟ یا اینکه در لیوان‌های با سایز مساوی مقادیرهای متفاوتی شیر، آب یا آب میوه بریزید و از وی بخواهید، لیوان‌های با مایع کمتر و بیشتر را نشان بدهد.

توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.

انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.

تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



بازی «حدس بزنید که چی شده؟» را انجام دهید. این بازی منجر به افزایش مهارت کودک شما در حل مسائل و بهبود مهارت فکر کردن در وی می‌شود. مثلا در طی حمام دادن کودکان از وی بپرسید «اگر آب داغ یا سرد را باز کنم یا آب داغ و سرد را همزمان با هم باز کنم، فکر می‌کنی چه اتفاقی می‌افتد؟»

کودکتان را به انجام یک بازی شمارش اعداد تشویق کنید. یک ورق کاغذ بزرگ بردارید و یک مسیر صاف که به چندین خانه مربع شکل تقسیم شده است، روی کاغذ بکشید. تاس بیاندازید. براساس عددی که تاس نشان می‌دهد، مهره‌ای را روی خانه‌های مربع به جلو حرکت دهید. دفعاتی که مهره با خانه‌های جدول تماس پیدا می‌کند را همراه با کودکان بشمارید.

در حین پیاده‌روی با کودکان، اجسامی را که پیدا می‌کنید، جمع‌آوری کرده و به خانه بیاورید. پس از شستشو به فرزندان کمک کنید که آنها را در گروه‌های سنگ‌ها و برگ‌ها تقسیم کند. کودک خود را تشویق کنید اجسامی که گروه‌بندی کرده در جعبه یا محل خاصی نگه دارد و بتواند اجسام جمع‌آوری شده را به نمایش بگذارد.

با کودکان بازی «نشانه‌گیری» را انجام دهید. یک سطل بزرگ را حدود ۱/۵ الی ۲ متر دورتر از جایی که کودکان ایستاده است، قرار دهید و از او بخواهید که یک توپ با اندازه متوسط را داخل سطل پرتاب کند. همین بازی را می‌توانید در یک روز تابستانی بیرون از منزل انجام دهید و داخل سطل را پر از آب کنید.

یک کیسه از حبوبات را برای پرتاب کردن و گرفتن بسازید. برای اینکار از یک جوراب کهنه یا جوراب شلواری استفاده کنید و سه چهارم آن را با حبوبات پر کنید. آن قسمت که باز است را بدوزید. حالا بازی ساده «این را بگیر» را انجام دهید. کودک را برای پرتاب توپی که درست کرده‌اید تشویق کنید و از او بخواهید توپ را با دست به بالا و پایین پرتاب کند.

با کودکان «سیرک بازی» کنید. لباس‌های قدیمی رنگارنگ پیدا کنید و به کودکان کمک کنید که یک نمایش سیرک راه بیاندازد. یک طناب روی زمین قرار دهید که کودکان از روی آن راه بروند، یک جعبه سنگین و محکم در اختیارش بگذارید که روی آن بروند و مانند مجری برنامه‌ها را اعلام کند، وسایلی به او بدهید که با آن شعبده بازی کند، و حیوانات پارچه‌ای به او بدهید که با آنها نمایش حیوانات را اجرا کند. سعی کنید قوه تخیل و خلاقیت کودک را برای برنامه ریزی نمایش‌ها برانگیزید. یادتان نرود که برایش دست بزنید.

با کودکان نامه بنویسید و آن را پست کنید. برای اینکار یک کاغذ، پاکت نامه، مداد و مداد رنگی را بیاورید و از کودکان بخواهید برای یک دوست یا اقوام‌تان یک نامه بنویسند. اجازه دهید کودکان نامه را به شکل کشیدن خط یا نوشتن چیزی بنویسند یا می‌توانید به او بگویید آنچه که می‌خواهد در نامه بنویسد را عنوان کند تا شما برای وی نامه را بنویسید. پس از نوشتن نامه حالا به او یاد بدهید نامه را تا کرده و در پاکت بگذارد و در پایان لبه‌های پاکت را به هم بچسباند. آدرس را در جلوی وی روی پاکت بنویسید و مطمئن شوید که کودکان پاکت را با مداد رنگی تزیین می‌کند. در پایان به او کمک کنید تمبر را روی پاکت بچسباند و نامه را پست کند.



توصیه‌هایی برای تکامل کودک

سرگرمی و فعالیت های ارتقای تکامل حرکتی، ذهنی و ارتباطی

یادگیری فرزندان را از راه بازی‌ها تحریک کنید.
انجام این فعالیت‌ها را برای کودک و خودتان لذت بخش کنید.
تلاش‌های فرزندان را تحسین کنید.



با کودکان نوشتن نام دوستان،
فامیل، یا اسباب بازی‌هایش را
تمرین کنید. ابتدا ممکن است لازم
باشد کودکان از روی نوشته شما
کپی کنند. سعی کنید اسامی را با
حروف درشت بنویسید.

وقتی سوار ماشین یا اتوبوس هستید،
همراه با کودکان پلاک ماشین‌ها را نگاه کنید و
اعداد مختلف را در آنها شناسایی کنید. ابتدا به
دنبال پلاک ماشینی بگردید که حاوی عدد ۱ است.
بعد به ترتیب روی پلاک ماشین‌ها به دنبال
عدد ۲، ۳، ۴ و ... تا ۱۰ بگردید. وقتی کودکان
شمارش اعداد را از کمتر به بیشتر یاد گرفت،
می‌توانید شمارش را از اعداد بزرگتر به کوچکتر
تغییر دهید. یعنی اول از عدد ۹ شروع کرده و بعد
به ترتیب ۸، ۷، ۶، ۵ و ... تا ۱ را روی پلاک
ماشین‌ها پیدا و شناسایی کنید.

کودک را تشویق به بازی‌های نمایشی
کنید. برای اینکار به فرزندان کمک کنید
که نقش شخصیت‌های مورد علاقه‌شان،
کارتون یا داستان‌های خود را بازی کنند.
از لباس‌های بزرگ و قدیمی برای لباس
نمایش استفاده کنید.

بازی «معمای صداها» را با کودکان
انجام دهید برای اینکار از صداها، لوازم داخل
منزل مانند صدای ساعت، جعبه، غلات، درب
فلزی و کیسه‌های چپس و ... استفاده کنید.
با یک دستمال چشمان کودکان را ببندید
و از او بخواهید حدس بزند هر کدام از این
صداها مربوط به کدام یک از لوازم داخل
منزل می‌باشد. این کار را به نوبت
با هر کدام از صداها تکرار
کنید.

برای تقویت حافظه کودک با وی
بازی «حافظه» را انجام دهید برای اینکار
پنج یا شش شیء آشنا روی یک میز قرار
دهید چشم‌های کودک را ببندید؛ یکی از
اشیای روی میز را بردارید و بقیه را دوباره
روی میز بچینید. چشمان کودک را باز
کنید و از وی بپرسید کدام شیء حذف
شده این کار را به نوبت تکرار کنید.

در داخل یا خارج از خانه برای کودکان
یک مسیر با مانع درست کنید. شما می‌توانید از جعبه‌های
مقوایی برای پریدن از روی آنها یا عبور از داخل آنها، استفاده
کنید. همچنین می‌توانید با قرار دادن دسته بلند یک جارو
یا تی بین دو مندرلی، مانعی برای رد شدن از زیر آن بسازید،
و نیز بالش‌هایی روی زمین قرار دهید که باید آنها را دور
بزنند. بگذارید کودکان در چینش موانع در مسیر، به شما
کمک کنند. بعد از چند بار تمرین کردن، از او بخواهید
که مسیر با مانع را با حداکثر سرعت ممکن طی کند. آنگاه از
او بخواهید سعی کند همین مسیر را با لی لی کردن یا جفت
پا پریدن طی کند.

به کودکان اجازه دهید که در انجام
کارهای ساده آشپزی به شما کمک کنند. مثلاً
سیب زمینی‌های پخته را له کند، لقمه یا
ساندویچ پنیر درست کند، یا یک کاسه را با
تکه‌های بیسکویت و شیر پر کند. سپس، ببینید
آیا او می‌تواند کارهایی را که شما به ترتیب برای
آشپزی انجام داده‌اید، نام ببرد. کودک باید از
هر طرف ۱ متر با اجاق گاز فاصله داشته باشد.
خیلی به دقت مراقب او باشید.





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر معاونت سلامت، خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی

مراقبت ۳-۵ روزگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور: نکات کلیدی مراقبت ۵-۳ روزگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان. مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری: ۲۴ص؛ ۱۵ × ۱۵ س.م.
 شابک: دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۴-۲۴-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 موضوع: نوزاد نو رسیده - مراقبت Newborn infants - Care
 موضوع: نوزاد نورسیده - رشد Newborn infants - Development
 موضوع: نوزاد نو رسیده - تغذیه Newborn infants - Nutrition
 رده بندی کنگره: ۳۵۲JR
 رده بندی دیویی: ۱۲۲/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۸۷۹۳



نکات کلیدی مراقبت ۵-۳ روزگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۶۲۴-۴
 شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۶۲۵-۱

۳	مقدمه
۴	اهمیت ویزیت های مراقبت سلامت کودک
۵	حمایت خانواده
۷	نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
۸	تغذیه کودک
۸	کودک تان را با شیر مادر تغذیه کنید
۹	ایمنی کودک
۱۱	مراقبت های دیگر
۱۱	دمای محیط و پوشش مناسب
۱۲	مراقبت از محل ناف و بند ناف نوزاد
۱۳	مراقبت از ختنه نوزاد
۱۴	خواب کودک
۱۵	آروغ زدن و بالا آوردن شیر (ریفلاکس نوزادی)
۱۵	کولیک نوزادان
۱۶	گریه های نوزاد
۱۸	تعویض پوشک و بهداشت ناحیه پوشک
۱۸	حمام کردن نوزاد
۲۰	واکسیناسیون
۲۲	زمان مراقبت بعدی کودک شما ۱۵ - ۱۴ روزگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه‌اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه‌های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. به‌هوزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی‌ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می‌دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۳-۵ روزه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودک‌تان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت‌هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- علاوه بر معاینه بدو تولد در بیمارستان لازم است در این مراقبت نیز توسط پزشک معاینه شود.

- واکسن های ب.ث.ژ، فلج اطفال، هیپاتیت ب را در بدو تولد دریافت کرده باشد.
- غربالگری بیماری های متابولیک ارثی
- پایش رشد (قد، وزن و دور سر کودک اندازه گیری و منحنی رشد او در کارت مراقبت کودک رسم شود)
- ارزیابی تغذیه با شیر مادر و مشاوره و راهنمایی لازم
- ارزیابی شنوایی
- ارزیابی ژنتیک
- راهنمایی هایی برای سلامت مادر
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از آسیب کودکان
- راهنمایی هایی برای مراقبت نوزادی
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از عوامل محیطی موثر بر سلامت کودک
- مکمل ویتامین آ+ د

اهمیت ویزیت های مراقبت سلامت کودک

کودکی که به دنیا می آید معجزه ای است در دستان شما. سلامت این کودک به مراقبت

نکات کلیدی مراقبت ۳-۵ روزگی

و توجه والدین قبل از بارداری و سال‌های اولیه تولد بستگی دارد پس از تولد، معاینه کاملی از نوزاد در بیمارستان به عمل می‌آید و سپس در ۳ تا ۵ روزگی اولین ویزیت برای ارزیابی سلامت نوزاد توسط پزشک تیم سلامت باید انجام شود. در فواصل مشخص در مراکز بهداشتی و توسط ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، کودک از نظر سلامتی و روند رشد بررسی شده و مشاوره‌های لازم از نظر تغذیه و تکامل جسمی و روانی انجام می‌شود.

هدف از این ویزیت‌ها شناسایی به موقع مشکلات کودک و انجام مداخلات لازم برای پیشگیری از بروز بیماری‌هاست تا کودکان ما در بهترین و مناسب‌ترین شرایط زیستی به حداکثر توانمندی خود برسند.



حمایت خانواده

- اگر بیش از چند روز احساس ناراحتی، اندوه، غم، بیماری دارید، با خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود تماس بگیرید.
- سعی کنید وقتی کودک تان خوابیده است، شما نیز بخوابید و استراحت کنید.

- از خانواده و دوستان کمک بگیرید.
- به دیگر فرزندانتان مسئولیت‌های کوچک و ایمن برای کمک به نگهداری کودک‌تان بدهید.
- زمان مخصوصی را تنها با هر فرزند خود سپری کنید.
- روال عادی خانواده را ادامه دهید.
- اگر از طرف کسی به شما توصیه‌ای شد که نمی‌خواهید آن را انجام دهید و یا با آن موافق نیستید، لب‌خند بزنید، تشکر کنید و موضوع را عوض کنید.



نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می‌کند:

۷

- فرصت‌هایی برای نوزاد خود فراهم کنید تا کودک شما را ببیند، بشنود و دست و پای خود را آزادانه حرکت دهد.
- به چشمان کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید، زمان تغذیه با شیر مادر فرصت خوبی است او صورت شما را می‌بیند و صدایتان را می‌شنود.
- با نوزاد تماس پوست با پوست داشته باشید و با ملایمت سراو را لمس کنید.
- به آرامی کودکتان را آرام کرده، نوازش کنید و در آغوش بگیرید، به ملایمت او را تکان دهید. (هنگام گریه او را بغل کنید و به حرکات و صدای او پاسخ دهید)
- روال ساده‌ای برای حمام کردن، غذا دادن، خواباندن و بازی کردن هرروزه داشته باشید.



• با استفاده از روش‌های زیر کودکتان را برای شیر دادن بیدار کنید:

- نوازش کردن
- عوض کردن پوشک
- درآوردن لباس‌ها

- با آرامش و با صدای آهنگین از هر دو طرف با کودک صحبت کنید یا لالایی بخوانید.

تغذیه کودک

- کودک تان را فقط با شیر مادر تغذیه کنید.
- در ۶ ماه اول به کودک تان به جز شیر مادر و قطره آ+د چیز دیگری ندهید. مایعات دیگر حتی آب نیز به او ندهید.
- هنگامی که کودک تان گرسنه است به او شیر بدهید. (علائم گرسنگی مانند حرکات دهان، مکیدن لب، بردن دست ها به سمت دهان، تکان دادن دست ها و پاها، غرزدن و نق نق کردن)
- شیر دادن را وقتی تمام کنید که نشانه های سیری را در کودک تان می بینید. (علائم سیری مانند توقف صدای بلع، توقف بیشترین دفعات مکیدن، رفع نشانه های گرسنگی، رها کردن پستان، برگشتن، بستن دهان، دست های آرام، به خواب رفتن)

کودک تان را با شیر مادر تغذیه کنید:

- شیرخوار را شب و روز هر چقدر و هر زمان که میل دارد با شیر مادر تغذیه کنید، حداقل ۱۰-۱۲ بار در ۲۴ ساعت او را با شیر خود تغذیه کنید. اگر کودک خودش برای شیر خوردن بیدار نشود او را بعد از ۳ ساعت بیدار کنید.

نکات کلیدی مراقبت ۵-۳ روزگی

- در هر وعده وقتی از یک پستان تغذیه شد، او را به پستان دیگر بگذارید و در وعده بعد تغذیه را از پستانی که کمتر خورده شروع کنید.
- اطمینان حاصل کنید کودک تان تعداد ۱ نوبت مدفوع و ۱ کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روز اول تولد، تعداد ۲-۳ نوبت مدفوع و ۲-۳ کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روز دوم و ۳-۴ کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روز سوم و ۶ تا ۸ پوشک مرطوب در روز ۵-۷ تولد داشته باشد.



- از تغذیه شیرخوار با بطری و دادن پستانک بپرهیزید.
- مراقبین بهداشتی / بهورزان می توانند در مورد چگونگی نگه داشتن کودک تان در زمان شیردهی و راحتی شما، اطلاعاتی در اختیارتان بگذارند و شما را راهنمایی کنند.
- در همه خانه های بهداشت / پایگاه های سلامت / مراکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مشاوره شیردهی انجام می شود.

ایمنی کودک

- در تمام خودروها از صندلی ایمنی کودک، رو به عقب استفاده کنید.

- هرگز کودک تان را در صندلی جلوی خودرو قرار ندهید بخصوص در خودرویی که کیسه هوای مسافر دارد.

- همیشه در اتومبیل کمربند ایمنی تان را ببندید.
- محیط زندگی کودکان را عاری از دود (سماور، والر، منقل و...) نگه دارید. استعمال سیگار را در خانه و ماشین تان ممنوع کنید.
- کودک تان را از آب و نوشیدنی های داغ دور نگه دارید.
- وقتی کودک تان را در آغوش گرفته اید، مایعات داغ نخورید.



- اطمینان حاصل کنید، دمای آبگرمکن شما کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.
- دمای آب حمام کودک تان را با آرنج یا پشت دست امتحان کنید.
- کودک تان را به پشت یا به پهلو بخوابانید، او را به شکم نخوابانید.
- کودک را در تخت یا گهواره ای دارای محافظ در اتاقتان بخوابانید، او را در تخت خودتان نخوابانید.
- کودک را در گهواره ای با استانداردهای ایمنی بخوابانید. حداقل ارتفاع گهواره از روی

تشک تا بالای آن ۵۰ سانتی متر باشد. فاصله بین نرده‌های تخت کمتر از ۶ سانتی متر باشد.



- اگر گهواره کودک ریل میله دارد، همیشه آن را در حالت بالا و قفل نگه دارید.
- اشیاء نرم و ملحفه مانند لحاف، بالش، تشک و اسباب بازی‌ها را بیرون گهواره نگه دارید.
- ساک حمل شیرخوار را از زیر بگیرید.
- شیرخوار را قنداق نکنید، شکم او را محکم نبندید، از بالش برای او استفاده نکنید.
- لیستی از تلفن‌های ضروری داشته باشید.

مراقبت‌های دیگر

دمای محیط و پوشش مناسب

- دمای مناسب اتاق برای کودک ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی گراد است.
- بطور معمول در هر دمایی که خودتان احساس سرما می‌کنید یک لایه لباس بیشتر از

خودتان به کودک ببوشانید از لباس های راحت، نرم، سبک و با امکان تعویض آسان استفاده کنید، دکمه یا زیپ لباس باید از بالا به پایین باز شود و از روبان یا رشته هایی که ممکن است باعث خفگی و تنگ شدن لباس شود در لباس کودک استفاده نکنید.

مراقبت از محل ناف و بند ناف نوزاد

- بند ناف بتدریج خشک و چروکیده شده، از روز دوم تا سوم شروع به تیره شدن می کند و معمولا طی ۲ هفته اول تولد می افتد.
- لازم است از به کار بردن هر گونه ماده ضد عفونی کننده مانند الکل یا بتادین و مواد سنتی روی بند ناف خودداری کنید، زیرا سبب تازه شدن بند ناف شده و افتادن آن را به تاخیر می اندازد.
- بند ناف باید همیشه خشک، تمیز و باز نگه داشته شود بنابراین نباید از ناف بند استفاده کرد. پوشک را باید طوری بست که بند ناف داخل پوشک قرار نگیرد تا به ادرار آغشته نشود.
- بعضی از مادران تصور می کنند تا بند ناف نیفتاده، نباید نوزاد را استحمام کرد. این باور درست نیست و استحمام نوزاد مخصوصا تمیز کردن اطراف ناف در زودتر افتادن بند ناف موثر است.



- در صورت قرمزی اطراف بند ناف، بوی بد یا ترشح از بند ناف باید فوراً به پزشک مراجعه شود.
- توصیه می‌شود بند ناف از نظر خونریزی احتمالی حداقل روزی یکبار مشاهده شود.

مراقبت از ختنه نوزاد

- توصیه می‌شود ختنه نوزاد پسر در ماه اول و ترجیحاً قبل از ترخیص نوزاد، توسط پزشک صورت گیرد.
- برای مراقبت از محل ختنه، از استعمال ترکیبات خانگی و مواد سنتی یا گیاهی یا هر گونه دارو بدون دستور پزشک خودداری گردد.
- مهمترین مراقبت از محل ختنه، خشک و تمیز نگه داشتن محل آن است.
- معمولاً بین ۷ تا ۱۰ روز زمان لازم است تا زخم آن بهبود یابد و در طی این مدت ممکن است نوک آلت زرد رنگ به نظر برسد که طبیعی است.
- بنفش بودن سرآلت پس از ختنه نوزاد ناشی از تحریک و پرخونی سرآلت و کاملاً طبیعی است.

• در چند هفته اول نوزاد حداکثر تا ۳ ساعت سیراست و باید در هر ساعتی از شبانه روز به او شیر داد.

• وضعیت خوابیدن مناسب تا ۶ ماهگی، خوابیدن به پشت است این کار سندرم مرگ ناگهانی را کاهش می دهد. با رعایت موارد زیر می توان خطر وقوع آن را کاهش داد:

* خواباندن کودک به پشت

* عدم استفاده از وسایل خواب شل و نرم

* خواباندن کودک در اتاق والدین و در رختخواب جدا از والدین

* محیطی عاری از دود سیگار برای

خواباندن کودک

* تغذیه با شیر مادر

* حرارت اتاق مناسب (۲۷-۲۵ درجه

سانتی گراد) و پرهیز از گرم کردن بیش از حد

اتاق

* معاینات دوره ای و واکسیناسیون به

موقع کودک



- در اطراف سر کودک وسایلی مثل عروسک یا پتو و... قرار ندهید.
- گاهی برای خواباندن نوزاد لازم است از روش هایی مثل راه بردن یا تکان آرام یا نوازش کردن کمک گرفت.

آروغ زدن و بالا آوردن شیر (ریفلاکس نوزادی)

- شیرخوار به طور طبیعی هنگام شیر خوردن، مقداری هوا می بلعد که باعث ناآرامی و کج خلقی او می شود. برای کاهش بالا آوردن شیر در شیرخوار نکات زیر را رعایت کنید:
- با آرامش و در محیط شاد و ساکت به نوزاد شیر دهید.
 - شیردهی را بطور ناگهانی قطع نکنید.
 - بعد از شیردهی کودک را در حالت قائم نگه دارید تا آروغ بزند.
 - کودک را بعد از شیر دادن تکان ندهید.
 - قبل از گرسنگی شدید و گریه کردن نوزاد به او شیر بدهید.



کولیک نوزادان

- اغلب در ساعات بعد از ظهر بی قراری، شکم درد و گریه های ناشی از کولیک رخ می دهد.

- این کولیک‌ها تا هفته ششم حداکثر ۳ ساعت در روز است و بتدریج کاهش می‌یابد و تا ۳ تا ۴ ماهگی (گاهی تا ۶ ماهگی) ادامه می‌یابد.
- دلیل این اتساع شکم، دردهای شکمی و گریه‌های شدید کاملاً مشخص نیست، برای مقابله با آن:
 - * صبور باشید و تحمل کنید.
 - * کودک را راه ببرید و برای او یک آهنگ آرام بگذارید.
 - * شیرخوار را به شکم روی زانو بخوابانید و به پشتش به آرامی ضربه بزنید و نوازش کنید.
 - * شیرخوار را در یک پتو پیچید تا احساس امنیت و آرامش کند.
 - * از یکی از اعضای خانواده یا یک دوست برای آرام کردن شیرخوار کمک بگیرید و خودتان استراحت کنید.

گریه‌های نوزاد

- به گریه‌های کودک توجه کنید تا بتوانید مشکل او را شناسایی کنید.
- در چند ماه اول تولد باید فوراً به گریه شیرخوار توجه کنید، این توجه او را لوس نخواهد کرد.

• در مواردی که گریه کودک ناشی از چند مسئله باشد باید برای مشکلات وی اولویت قائل شوید. اگر مشکلات کودک را برطرف کرده اید و او آرام نمی شود روش های زیر را امتحان و انتخاب کنید:

- به آرامی او را نوازش کنید و به پشت یا سینه اش بزنید.
- او را در پتو یا ملحفه بپیچید و در محل آرامی قرار دهید.
- از یک موسیقی آرام یا لالایی استفاده کنید.
- او را در کالسکه یا در بغل یا اتومبیل راه ببرید.
- حمام کردن به کودک کمک می کند.
- هر قدر شما آرام تر باشید، تحمل کنید و به مشکلات کودک بیشتر توجه کنید گریه های او کمتر و کوتاه تر می شود.
- وقتی خسته یا عصبی هستید از کسی برای آرام کردن او کمک بگیرید.
- هرگز برای آرام کردن کودک او را به شدت تکان ندهید تکان های شدید باعث آسیب مغزی، نابینایی و حتی مرگ می شود.



تعویض پوشک و بهداشت ناحیه پوشک

- شستن دست‌ها قبل از بغل کردن و مراقبت از کودک و بخصوص بعد از تعویض پوشک ضروری است.
- بعد از هر بار اجابت مزاج باید پوشک کودک عوض شود و کودک با آب ولرم شستشو شود و روغن مخصوص استفاده شود.
- هرگز شیرخوار را با این تصور که قادر به غلتیدن نیست، حتی برای یک لحظه، روی میز تعویض پوشک یا هر جای بلندی تنها نگذارید.
- خیس ماندن کودک به مدت طولانی باعث سوختگی ناحیه پوشک می‌شود که اغلب با شستشو و کرم‌های محافظ کودک و کمی باز گذاشتن پوشک بهبود می‌یابد.
- کرم‌های حاوی اکسید روی برای پیشگیری و درمان سوختگی پای نوزاد مفید است.
- اگر سوختگی ناحیه پوشک بیش از سه روز طول کشید با پزشک تماس بگیرید.

حمام کردن نوزاد

اگر شستشوی روزانه محل پوشک انجام شود، ۲ تا ۳



- بار حمام در هفته کافی است. در حمام کردن نوزاد به نکات زیر توجه شود:
- برای حمام کردن نوزاد از شامپو و روغن مخصوص کودک استفاده کنید. بعد از حمام کردن نوزاد فوری او را خشک کنید و از یک لوسیون مرطوب کننده غیر معطر برای جلوگیری از خشک شدن بیش از حد پوست او استفاده کنید.



- استحمام نوزاد مخصوصا تمیز کردن اطراف ناف در زودتر افتادن بند ناف مؤثر است. برای جلوگیری از لیز خوردن شیرخوار داخل وان حمام، او را روی یک حوله و در حمایت بازوی خود قرار دهید.
- گرمای آب حمام نوزاد را با محل آرنج یا مچ دست خود امتحان کنید، دمای آب حدود ۳۷-۳۸ درجه سانتی‌گراد باشد. دمای آب گرم منزل را روی ۴۹ درجه سانتی‌گراد یا کمتر تنظیم کنید که مانع سوختگی کودک شود.
- از لگن پلاستیکی با ۵ تا ۷ سانتیمتر ارتفاع آب استفاده کنید.
- به شستشوی کامل نواحی چین‌های بدن کودک توجه کنید.

- هرگز نوزاد را در حمام رها نکنید.

واکسیناسیون

- واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری ها طبق برنامه کشوری بسیار ضروری و مهم است، هر واکسن باید طبق برنامه انجام شود مگر در موارد خاص مثل وجود برخی بیماری ها یا شرایط خاص که پزشک کودکان توصیه های لازم را خواهد کرد. برخی از کودکان پس از واکسیناسیون ممکن است دچار تب یا بی قراری شوند که برای پیشگیری از آن بهتر است قبل از انجام واکسیناسیون توصیه های لازم را از مراقب سلامت / بهورز بگیرید.





- کودک شما دربدو تولد باید واکسن های ب.ث.ژ، فلج اطفال خوراکی، هیپاتیت ب را دریافت کرده باشد.
- * در کودکان ۳ ماهه و کوچکتر، تب مسئله ای جدی است. اگر دمای بدن کودک تان ۳۷٫۵ درجه سانتی گراد زیر بغلی یا بیشتر بود با پزشک تماس بگیرید.
- * اغلب، دستان خود را بشوید. هر کسی که کودک را لمس می کند مجبور کنید اول دستش را بشوید و بعد کودک را لمس کند.
- * از بردن کودک به مکان های شلوغ پرهیزید.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۱۵-۱۴ روزگی است

در مراقبت ۱۵-۱۴ روزگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی رفتار با کودک
- ارزیابی بینایی
- ارزیابی شنوایی
- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک با شیر مادر
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

شاب: 9789643001254



ISBN 9789643001254



ISBN 9789643001254



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سازمان حمایت خانواده و بحران
اداره سلامت کودکان

نکات کلیدی

مراقبت ۱۴-۱۵ روزگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی مراقبت ۱۵- ۱۴ روزگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان. مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری : ۱۲ص؛ ۱۵ × ۱۵ س. م.
شابک: دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸؛ ۸-۲۶-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : نوزاد نرسیده - مراقبت - Newborn infants - Care
موضوع : نوزاد نرسیده - رشد - Newborn infants - Development
موضوع : نوزاد نرسیده - تغذیه - Newborn infants - Nutrition
رده بندی کنگره : RJ۲۵۲
رده بندی دیویی : ۱۲۲/۶۴۹
شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۴۷۵۹۲



نکات کلیدی مراقبت ۱۵- ۱۴ روزگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
ناشر: اندیشه ماندگار
نوبت چاپ: اول- ۱۳۹۹
تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
شابک: ۸-۲۶-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۴ حمایت خانواده
- ۴ رشد و تکامل کودک
- ۵ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۵ تغذیه کودک
- ۷ ایمنی کودک
- ۸ مراقبت های دیگر
- ۸ خواب
- ۹ مراقبت از دهان و دندان
- ۹ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۳۰ - ۴۵ روزگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف از جمله ۵-۱۴ روزه لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه بهداشتی / خانه بهداشت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید مراقبین سلامت / بهورزان و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۱۵-۱۴ روزه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پیش رشد (قد، وزن و دور سر کودک اندازه گیری و منحنی رشد کودک در کارت مراقبت کودک رسم می شود)
- تغذیه با شیر مادر ارزیابی می شود و مشاوره و راهنمایی لازم انجام می شود.
- ارزیابی رفتار با کودک

- ارزیابی بینایی
- ارزیابی شنوایی

حمایت خانواده

- ممکن است خسته باشید یا سرتان شلوغ باشد. وقتی کودک تان خواب است، بخوابید و استراحت کنید.
- شما و همسرتان به زمانی برای با هم بودن و زمانی برای استراحت کردن احتیاج دارید.
- ممکن است احساس دست پاچگی، ترس یا خستگی کنید، از فامیل و دوستان کمک بخواهید. اگر بیش از ۲ هفته احساس مریضی یا افسردگی داشتید، با مراقب سلامت / بهورز تماس بگیرید.
- والد بودن سخت‌ترین شغلی است که خواهید داشت. داشتن حمایت و اطلاعات مهم هستند. وقتی احساس نیاز کردید، کمک بخواهید.

رشد و تکامل کودک

- در این سن کودک شما:
- وقتی صداهایی می‌شنود، ساکت می‌شود.
 - وقتی بر روی شکم خوابیده است، سرش را به آرامی تکان می‌دهد.

نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می‌کند:

۵

- فرصت‌هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا کودک شما ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند.
- اشیاء رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد. اشیاء مختلف با رنگ‌های روشن و درخشان را در فاصله نزدیک (۲۰ سانتی متری) صورتش به او نشان دهید. (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جفجغه)
- به چشمان کودک تان بسیار نگاه کنید، به او لبخند بزنید و بخندید. بیشتر اوقات با او صحبت کنید. با تقلید صدا یا ژست کودکان تان با او مکالمه کنید.
- به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به او نشان دهید.
- کودک تان را بغل کنید و او را لمس کنید. ارتباط لمسی بسیار مهم است. او را با بغل کردن و لمس کردن لوس نمی‌کنید.
- اجازه دهید انگشتان شما را بگیرد و برای تشویق به شل کردن انگشتانش یکی یکی آن‌ها را باز کنید.



تغذیه کودک

- کودک تان را فقط با شیر مادر تغذیه کنید.

• کودک خود را شب و روز هر چقدر و هر زمان که میل دارد با شیر مادر تغذیه کنید، حداقل ۱۰-۱۲ بار در شبانه روز او را با شیر خود تغذیه کنید. اگر کودک خودش برای شیر خوردن بیدار نشود او را بعد از ۳ ساعت بیدار کنید.

- به شیرخوار غذا یا مایعات دیگر حتی آب ندهید، شیر مادر به تنهایی همه نیاز شیرخوار را برآورده می‌کند.
- در صورتی که کودک شما از شیر مادر محروم است و از شیشه شیر برای تغذیه او استفاده می‌کنید، هرگز برای شیر دادن، شیشه را بین خود و کودکتان قرار ندهید تا بتوانید چشمان یکدیگر را ببینید.



- کودک شما در این سن به غذای جامد نیازی ندارد.
- یک کودک بطور متوسط هر ۲ یا ۴ ساعت شیر می‌خورد. او ممکن است گاهی بیشتر یا کمتر شیر بخورد.
- به کودک خود هر روز ۴۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین د و ۱۵۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین آ بدهید.
- مراقبین بهداشتی / بهورزان می‌توانند در مورد چگونگی نگه داشتن کودک‌تان در زمان شیردهی و راحتی شما، اطلاعاتی در اختیارتان بگذارند و شما را راهنمایی کنند.
- در خانه‌های بهداشت / پایگاه‌های سلامت / مراکز خدمات جامع سلامت محل زندگی شما



مشاوره شیردهی انجام می شود.

ایمنی کودک

- هرگاه کودک تان سوار خودرو می شود از صندلی ایمنی کودک استفاده کنید. صندلی کودک باید کاملاً ایمن در صندلی عقب ماشین قرار بگیرد.
- صندلی کودک در خودرو تا ۲ سالگی رو به عقب قرار بگیرد.
- هرگز کودک خود را در خودرو تنها نگذارید.
- اطمینان حاصل کنید میله های گهواره یا تخت کودک بیش از ۶ سانتی متر فاصله نداشته باشد. برخی گهواره های قدیمی ایمن نیستند، سر کودک ممکن است بین میله ها گیر کند.
- کودک خود را از آتش، آب داغ، اجاق گاز، چوب های آتش گرفته و دیگر اشیاء داغ دور نگه دارید.
- هیچ وقت به کسی اجازه ندهید در خانه یا خودرو شما سیگار بکشد. در معرض دود سیگار قرار گرفتن می تواند میزان ابتلا به بیماری های تنفسی را در کودک بالا ببرد.
- در خانه به خصوص در محل نگه داری کودک تان از ردیاب دودی استفاده کنید که به خوبی کار کند. ردیاب دود خود را کنترل کنید.
- هرگز کودک خود را حتی برای چند لحظه تنها نگذارید. کودک شما ممکن است قادر به

- غلتیدن نباشد، ولی شما اینطور در نظر بگیرید که او می تواند و در همه حال مراقب او باشید.
- وقتی در حال تعویض پوشک و حمام کردن کودک خود هستید، در تمام مدت با یک دست او را نگه دارید.
- پارچه ای در وان حمام قرار دهید تا از سر خوردن کودک تان جلوگیری کنید.
- هرگز زنجیر یا گرد نبندی در گردن کودک تان نگذارید. همچنین اگر کودک از پستانک استفاده می کند، آن را با زنجیر یا نخ به گردن او آویزان نکنید.
- هرگز کودک خود را به شدت تکان ندهید.
- کودک خود را بیشتر از ۱۰ دقیقه در معرض نور آفتاب قرار ندهید. اگر بیرون هستید، او را با کلاه، لباس آستین بلند و شلوار بپوشانید.

مراقبت های دیگر

خواب

- کودک خود را به پشت بخوابانید، این کار احتمال مرگ ناگهانی نوزاد را کاهش می دهد. او را بر روی شکم ن خوابانید.
- در تخت کودک تان ن خوابید همچنین او را در تخت خواب خود ن خوابانید.
- کودک شما هر روز حدود ۱۶ - ۱۴ ساعت می خوابد.



- کودک شما ممکن است ۳ تا ۳/۵ ساعت پی در پی در شب بخوابد. این مدت زمان ممکن است موقعی که کودک شما ۲ ماهه می شود، متفاوت باشد.
- پس از تغذیه روزانه با کودک خود صحبت کنید یا با او بازی کنید. تا کم کم یاد بگیرد که روز برای بازی کردن و بیدار ماندن و شب برای خوابیدن است.



مراقبت از دهان و دندان

- دهان کودک خود را با پارچه ای تمیز و آب تمیز کنید.

مدفوع

اگر کودک خود را با شیر مادر تغذیه می کنید، مدفوع کردن او می تواند هر پنج روز یک بار یا بعد از هر بار شیر خوردن باشد. زمان بندی مدفوع کردن ممکن است با بزرگ شدن او تغییر کند. مدفوع او ممکن است آبکی، زرد و بلغمی باشد. اگر او را با شیر مصنوعی تغذیه می کنید، مدفوع او ممکن است رنگ، غلظت یا بوی متفاوتی داشته باشد. ممکن است کودک به هنگام مدفوع کردن، حتی در صورتی که مدفوع نرم است زور بزند.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۳۰-۴۵ روزگی است

در مراقبت ۳۰-۴۵ روزگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی رفتار با کودک
- ارزیابی شنوایی
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- مکمل (ویتامین آ + د)
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سازمان حمایت خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی

مراقبت ۳۰-۴۵ روزگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور: نکات کلیدی مراقبت ۴۵-۳۰ روزگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان.
 مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری: ۱۲ص: ۱۵×۱۵ س.م.
 شابک: دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۵: ۲۷-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۵
 وضعیت فهرست نویسی: فیبا
 موضوع: نوزاد نورسیده - مراقبت Newborn infants - Care
 موضوع: نوزاد نورسیده - رشد Newborn infants - Development
 موضوع: نوزاد نورسیده - تغذیه Newborn infants - Nutrition
 رده بندی کنگره: ۳۵۲JR
 رده بندی دیویی: ۱۲۲/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۸۸۱۳



نکات کلیدی مراقبت ۴۵-۳۰ روزگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۷-۵

شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۵-۱

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۴ حمایت خانواده
- ۵ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۶ تغذیه کودک
- ۷ کودک تان را با شیر مادر تغذیه کنید
- ۷ اگر کودک شما از شیر مادر محروم است و او را با شیشه تغذیه می کنید
- ۷ ایمنی کودک
- ۹ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۲ ماهگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف از جمله ۳۰-۴۵ روزگی لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه بهداشتی / خانه بهداشت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه‌های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید مراقبین سلامت / بهورزان و پزشکان در برابر نگرانی‌ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می‌دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۳۰-۴۵ روزه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت‌هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پیش‌رشد (قد، وزن و دور سر کودک اندازه‌گیری و منحنی رشد او در کارت مراقبت کودک

رسم می‌شود)

- ارزیابی تغذیه با شیرمادر و ارائه مشاوره و راهنمایی لازم

- مکمل ویتامین آ+ د

- ارزیابی رفتار با کودک

- ارزیابی شنوایی

- کودکانی که نارس به دنیا آمده‌اند (وزن

هنگام تولد کمتر از ۲۰۰۰ گرم یا سن جنینی کمتر

از ۳۴ هفته) همچنین صرف نظر از سن حاملگی

و وزن تولد، همه نوزادانی که مسیر درمانی پیچیده‌ای را در بخش مراقبت ویژه نوزادان،

مانند اکسیژن درمانی و تعویض خون طی کرده‌اند، وضعیت بالینی ناپایدار داشته‌اند یا

توسط پزشک معالج در معرض خطر تشخیص داده شوند، می‌بایست از نظر رتینوپاتی

معاینه چشم شوند.



حمایت خانواده

- با همسر، دوستان و خانواده برنامه‌ریزی کنید تا برای خودتان وقت صرف کنید.

- برای همسران هم وقت بگذارید.

• اگر شما و کودکتان به وسیله کسی صدمه دیده‌اید و در خانه امنیت ندارید، با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.

• مراقبت از خودتان به شما انرژی مراقبت از فرزندتان را می‌دهد. به خاطر داشته باشید که برای معاینه پس از زایمان به پزشک مراجعه کنید.



• آگاه باشید که برگشتن به کار یا دانشگاه برای بیشتر پدرها و مادرها سخت است. اگر در حال برنامه‌ریزی برای برگشتن به کار یا دانشگاه هستید، به این فکر کنید که چگونه می‌توانید همچنان به شیردهی ادامه دهید. یک مراقب مورد اطمینان برای فرزندتان پیدا کنید.

نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می‌کند:

• با کودکتان تماس چشمی برقرار کنید.

• فرصت‌هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا او شما را ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند.

• اشیا رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد. (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)

• به کودک خود لبخند بزنید و بخندید.

- با کودک خود صحبت کنید. با تقلید صدا یا ژست کودکتان با او مکالمه کنید.
- اغلب اوقات او را در آغوش بگیرید.
- وقتی کودکتان بیدار است و شما در کنارش هستید روزی ۲ تا ۳ بار او را بر روی شکم بخوابانید تا عضلات پشت و گردن او تقویت شود.
- گریه کردن طبیعی است و ممکن است بین ۶ تا ۸ هفته‌گی افزایش یابد. هرگز کودکتان را تکان شدید ندهید. اگر احساس ناراحتی می‌کنید، کودکتان را در محل امنی بگذارید و کمک بگیرید.
- روال ساده ای برای حمام، غذا دادن، خواباندن و بازی کردن هرروزه داشته باشید.

تغذیه کودک

- کودک خود را شب و روز و هر زمان می‌خواهد حداقل ۱۲-۸ بار در شبانه روز فقط با شیر مادر تغذیه کنید.
- برای شیر دادن به کودک تان، او را نوازش کنید، به آرامی تکان دهید، لباس هایش را در آورید و یا پوشک اش را عوض کنید تا بیدار شود.
- وقتی نشانه‌های گرسنگی (مکیدن انگشتان، دست گذاشتن در دهان، حرکات دهان و اندام‌ها، غرزدن و نق نق کردن) را در کودک تان می‌بینید، او را بیدار کنید.

- شیر دادن را وقتی تمام کنید که نشانه های سیری (رها کردن پستان، بستن دهان، بازوها و دستان آرام) را در کودکان می بینید.

کودک تان را با شیر مادر تغذیه کنید:

- به مصرف ویتامین های پیش از زایمان خود ادامه دهید.

اگر کودک شما از شیر مادر محروم است و او را با شیشه تغذیه می کنید:

- هر ۲ یا ۳ ساعت به کودک خود شیر بدهید. اگر کودک تان همچنان گرسنه است، می توانید بیشتر به او شیر بدهید.
- کودک تان را در آغوش بگیرید تا بتوانید به یکدیگر نگاه کنید. شیشه را بین خودتان قرار ندهید.

ایمنی کودک

- در تمام خودروها از صندلی ایمنی کودک، رو به عقب استفاده کنید.
- هرگز کودک تان را در صندلی جلوی خودرو و بخصوص خودروهایی که کیسه هوای



مسافر دارد، قرار ندهید. صندلی عقب خودرو ایمن ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است.

- طناب‌ها، نخ‌ها، گردنبندها و دستبندها را دور از دسترس کودک نگه دارید.
- کمک‌های اولیه و احیای قلبی عروقی کودکان را بیاموزید.
- در خانه یک جعبه کمک‌های اولیه نگه دارید.
- لیستی از شماره‌های اضطراری داشته باشید.
- بدانید که چطور دمای بدن کودکان را اندازه‌گیری کنید. اگر ۳۷٫۵ درجه سانتی‌گراد زیربغلی و یا بیشتر است، با پزشک تماس بگیرید.



- برای کمک به سلامتی کودک تان، دست هایتان را بشویید.
- کودکتان را به پشت بخوابانید.
- کودک را در تخت خودتان ن خوابانید، او را در تخت یا گهواره ای در اتاقتان بخوابانید. در گهواره ای که استاندارد ایمنی را داشته باشد.
- اشیاء نرم مانند لحاف، بالش، تشک و اسباب بازی های نرم را بیرون گهواره نگه دارید.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۲ ماهگی است.

در مراقبت ۲ ماهگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی رفتار با کودک
- ارزیابی تکامل
- ارزیابی بینایی
- ارزیابی شنوایی



- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک
 - مکمل ویتامین آ+ د
 - واکسن‌های فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

شاب ۹۷۸۶۲۰۷۰۱۲۵-۹



ISBN 978620700125-9





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سازمان حمایت خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت ۲ ماهگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور: نکات کلیدی مراقبت ۲ ماهگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان.
 مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹.
 مشخصات ظاهری: ۱۲ص: مصور(رنگی).
 شابک: دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۲؛ ۲-۲۸-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۲
 وضعیت فهرست نویسی: فیبا
 موضوع: نوزاد نورسیده - مراقبت Newborn infants - Care
 موضوع: نوزاد نورسیده - تغذیه Newborn infants - Nutrition
 موضوع: نوزاد نورسیده - رشد Newborn infants - Development
 رده بندی کنگره: RJ۲۵۳
 رده بندی دیویی: ۱۲۲/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۸۸۱۱



نکات کلیدی مراقبت ۲ ماهگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اداره سلامت کودکان

ناشر: اندیشه ماندگار

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

شابک: ۲-۲۸-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۲

شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۲

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۴ حمایت خانواده
- ۵ رشد و تکامل کودک
- ۵ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۷ تغذیه کودک
- ۸ کودک تان را با شیر مادر تغذیه کنید
- ۸ ایمنی کودک
- ۹ مراقبت های دیگر
- ۹ خواب
- ۱۰ تعویض پوشک
- ۱۰ واکسیناسیون
- ۱۰ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۴ ماهگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، گزینه‌اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه‌های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. به‌روزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی‌ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می‌دهند. در سن ۲ ماهگی لازم است کودک مورد پایش قرار گیرد. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۲ ماهه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت‌هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- واکسن‌های فلج اطفال خوراکی، پنج‌گانه شامل: (دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه، هیپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ ب)
- پایش رشد (اندازه‌گیری قد، وزن و دور سر کودک و رسم منحنی رشد در کارت مراقبت کودک)
- مکمل ویتامین آ+د
- ارزیابی تغذیه با شیرمادر و ارائه مشاوره و راهنمایی‌های لازم

- ارزیابی تکامل
- ارزیابی رفتار با کودک

حمایت خانواده

- وظایفی که در قبال کودک و کارهای خانه دارید با همسر، خانواده و دوستان تقسیم کنید.
- با خانواده و دوستان در ارتباط باشید.
- به خواهر و برادر کودک تان توجه ویژه‌ای نشان دهید و از آنها در نگهداری کودک تان کمک بگیرید. به آن‌ها مسئولیت‌های امن کوچک برای کمک به کودک، مانند آوردن چیزی که لازم دارید یا نگه داشتن دست کودک، بدهید.
- وقت خاصی را به هر کودک برای خواندن، صحبت کردن و انجام کارها با هم، اختصاص دهید.
- کلاس‌های «رشد و تکامل همه جانبه ابتدای کودکی» و «آموزش فرزندپروری» راه بسیار مناسبی برای برقراری ارتباط، پیدا کردن پشتیبانی و بدست آوردن اطلاعات است. سایت‌های معتبر و محل‌های آموزش نزدیک محل زندگی خود را پیدا کنید.
- مراقبت از خودتان به شما انرژی مراقبت از فرزندتان را می‌دهد. به خاطر داشته باشید که برای معاینه پس از زایمان به پزشک مراجعه کنید.
- برای وقت گذراندن با همسرتان راه‌هایی پیدا کنید.
- با خانواده و دوستان در ارتباط باشید.

- برای برگشت به محل کار یا دانشگاه، برنامه‌ریزی کنید. یک مراقب مورد اطمینان و دوست داشتنی برای کودک خود پیدا کنید.

رشد و تکامل کودک

در این سن کودک شما:

- با شنیدن صدای بلند در شیرخوردن مکث می‌کند یا در هنگام خواب از جا می‌پرد.
- اجسام متحرک را با نگاه دنبال می‌کند.
- به اشخاص لبخند می‌زند.
- وقتی روی شکم دراز کشیده، می‌تواند چانه‌اش را به مدت کوتاهی از زمین بلند کند.
- در صورتی که کودک شما هر یک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۲ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز/ مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

نکاتی که به تکامل فرزندان کمک می‌کند:

- با کودکان تماس چشمی برقرار کنید، سعی کنید اشارات او را درک کنید و پاسخ مناسب بدهید.
- با کودک صحبت کنید.
- به ایما و اشاره کودک خود پاسخ دهید.
- سعی کنید او را بخندانید.
- رشد مغزی کودک را با اسباب بازی‌های مناسب سن، و اسباب



و تجربه‌های یادگیری، افزایش دهید.

- در هنگام شیردادن، بازی کردن و عوض کردن پوشک با کودک خود صحبت کنید و او را بغل کنید.
- وقتی گریه می‌کند، او را آرام کنید.
- وقتی کودک تان بیدار است، او را بر روی شکم بخوابانید. این امر به قوی شدن و ساخته شدن ماهیچه‌های او کمک خواهد کرد. مطمئن شوید کودک تان وقتی بر روی شکم خوابیده است، بیدار است. گذاشتن کودک چند بار در روز بر روی شکم، کمک می‌کند تا او برای غلت زدن و چهار دست و پا راه رفتن آماده شود. شما می‌توانید با دوره‌های کوتاه زمانی (۳ تا ۵ دقیقه) شروع کنید. اگر کودک تان علاقه نشان داد، به آرامی این مدت زمان را افزایش دهید.
- اسباب بازی‌ها را دور تا دور کودک قرار دهید. دسترسی پیدا کردن به نقاط مختلف در دایره دورش به ساخته شدن مناسب ماهیچه‌ها برای چرخش، لیز خوردن روی شکم و چهار دست و پا رفتن کمک می‌کند.
- هر شب برای کودک تان لالایی بخوانید.
- او را با بغل کردن و نوازش کردن لوس نمی‌کنید.
- روال عادی هرروزه‌ای برای حمام کردن، غذا دادن، خواباندن و بازی کردن با کودک داشته باشید.
- اغلب اوقات کودکان را در آغوش بگیرید، با او صحبت کنید، او را نوازش کنید، برای او آواز بخوانید و با او بازی کنید. این کارها کمک می‌کند کودکان به شما اعتماد کند.

۷

- توجه کنید کودکان با چه چیزی آرام می شود، مثل انگشتان، تکان دادن، حرف زدن و یا راه بردن.
- اجازه دهید با اشیاء بازی کند و جنس آن ها را لمس کند.
- کودک شما به خوبی می شنود. صحبت کردن و بازی کردن باعث پیشرفت رشد جسمی و زبانی او می شود.

تغذیه کودک



- تا ۶ ماهگی کودک تان را فقط با شیر مادر تغذیه کنید.
- تعداد وعده های شیر خوردن کودک ممکن است کمتر شود ولی در هر وعده بیشتر شیر بخورد.
- کودک شما ممکن است هر سه یا چهار ساعت یکبار در روز شیر بخورد و این مدت زمان در شب بیشتر شود.
- کودک شما در این سن به غذای جامد نیاز ندارد.
- به کودک خود هر روز ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین د و ۱۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین آ بدهید.
- از دادن غذاهای جامد و آب تا ۶ ماهگی پرهیزید.
- دست گذاشتن در دهان، مکیدن، غرزدن و نق نق کردن از نشانه های گرسنگی در کودکان است. وقتی نشانه های گرسنگی را در کودک تان می بینید، او را برای تغذیه با شیر خودتان بیدار کنید.

- برگشتن، بستن دهان، بازوها و دستان آرام از نشانه‌های سیری در کودکان است. شیر دادن را وقتی تمام کنید که نشانه‌های سیری را در کودکان می‌بینید.
- بگذارید کودک تان در بین وعده‌های غذایی معمول، آروغ بزند.

کودک تان را با شیر مادر تغذیه کنید:

- حداقل ۱۲-۸ بار در شبانه روز شیر بدهید.
- برای خالی کردن و ذخیره کردن شیر پستان برنامه‌ریزی کنید. روش دوشیدن را از مراقبین سلامت / بهورزان سوال کنید.
- کودک تان را طوری در آغوش بگیرید تا بتوانید به یکدیگر نگاه کنید. این وضعیت باعث ایجاد رابطه بین کودک و مراقب می‌شود و امنیت عاطفی را بالا می‌برد.
- تغذیه با شیر مادر از بروز بیماری‌ها و شرایط مختلفی، مانند اضافه وزن، چاقی مفرط، اسهال، عفونت دستگاه تنفسی و عفونت گوش در کودک پیشگیری می‌کند.

ایمنی کودک

- هرگاه کودک تان سوار خودرو می‌شود، از صندلی مناسب قد و وزن او استفاده کنید. صندلی ایمنی کودک باید کاملاً ایمن در صندلی عقب ماشین قرار بگیرد.
- صندلی کودک در خودرو تا ۲ سالگی باید رو به عقب باشد.



- هرگز کودک تان را در صندلی جلوی خودرو قرار ندهید.
- ممکن است کودک شما شروع به چرخیدن از روی شکم به پشت خود کند. از ایمنی او اطمینان حاصل کنید.
- به کودک خود اسباب بازی هایی بدهید که شکستنی نباشند، اجزای کوچک یا لبه های تیز نداشته باشند و آنقدر بزرگ باشند که قابل بلعیدن نباشند. اشیاء کوچک یا دیگر اشیاء خطرناک را از کودک خود دور نگه دارید.
- کیسه های پلاستیک، بادکنک ها و دیگر اشیاء کوچک، مخصوصا اسباب بازی های بچه های دیگر را از او دور نگه دارید.
- کودکان می توانند غلت بزنند، پس وقتی او را عوض می کنید یا لباس می پوشانید، با دست او را نگه دارید.
- هرگز کودک تان را در حمام تنها نگذارید.

مراقبت های دیگر

خواب

- کودک را به پشت بخوابانید.
- اسباب بازی ها، حیوانات پارچه ای و ملحفه های اضافی را در رختخواب کودک نگذارید.
- بین ۲ تا ۴ ماهگی، کودک شما باید زمان بندی خواب روزانه و شبانه داشته باشد.



- کودک شما ممکن است یک یا چهار بار در روز چرت بزند. او ممکن است خواب‌های کوتاه ۱۰ تا ۳۰ دقیقه‌ای در یک زمان از روز همراه با خواب‌های کوتاه هر ۲ یا ۴ ساعت یکبار داشته باشد.
- کودک شما ممکن است شروع به خوابیدن بیشتر در شب کند و کمتر از خواب بیدار شود.

تعویض پوشک

- پوشک‌ها مکرراً به عنوان امری ضروری و طبق روال عادی هرروزه کودک‌تان، عوض خواهد شد.
- در حین عوض کردن پوشک، کارهایی انجام دهید شامل حرف زدن در مورد روال عادی عوض کردن پوشک، آواز خواندن و یاد دادن کلماتی مانند شستن دست‌ها، انگشتان و غیره.
- از روش‌های تعویض پوشکی که وضعیتی تمیز، سالم و بهداشتی را برای کودک شما به وجود آورد، استفاده کنید.

واکسیناسیون

- کودک شما برای کنترل و پیشگیری از بیماری باید به خانه بهداشت / پایگاه بهداشتی / مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کند.
- در ۲ ماهگی کودک شما نیاز به واکسن‌های پنج‌گانه و فلج اطفال خوراکی دارد.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۴ ماهگی است:

- در مراقبت ۴ ماهگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:
- پایش رشد

- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی رفتار با کودک
- ارزیابی شنوایی
- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی‌هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی‌هایی برای پیشگیری از آسیب
- مکمل ویتامین آ+ د
- واکسن‌های پنج‌گانه، فلج اطفال خوراکی، فلج اطفال تزریقی
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

ISBN 978-964-01-1215-8



ISBN 978-964-01-1215-8





وزارت صحت، برہنہ و اہولاریہ برائے
حکومت پنجاب
دفتر تعلیمات صحت، گلوارہ و عباسی
انڈیا سٹریٹ، لاہور

نکات کلیدی مراقبت ۴ ماہگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور: نکات کلیدی مراقبت ۴ ماهگی/دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان .
 مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹.
 مشخصات ظاهری: ۱۲ص: مصور(رنگی).
 شابک: دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸؛ ۹-۲۹-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی: فیبا
 موضوع: نوزاد نورسیده - مراقبت Newborn infants - Care
 موضوع: نوزاد نورسیده - تغذیه Newborn infants - Nutrition
 موضوع: نوزاد نورسیده - رشد Newborn infants - Development
 رده بندی کنگره: RJ۲۵۳
 رده بندی دیویی: ۱۲۲/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۸۷۷۴



نکات کلیدی مراقبت ۴ ماهگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۹-۲۹-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۴ حمایت خانواده
- ۴ رشد و تکامل کودک
- ۵ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۷ تغذیه کودک
- ۷ تغذیه با شیر مادر
- ۷ ایمنی کودک
- ۹ مراقبت های دیگر
- ۹ خواب
- ۹ واکسیناسیون
- ۱۰ تعویض پوشک
- ۱۰ گریه کردن
- ۱۰ بیمار شدن
- ۱۰ مراقبت های دهان و دندان
- ۱۱ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۶ ماهگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. بهروزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در سن ۴ ماهگی لازم است کودک مورد پایش قرار گیرد. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۴ ماهه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- واکسن های فلج اطفال خوراکی، پنج گانه، فلج اطفال تزریقی
- پایش رشد (قد، وزن و دور سر کودک اندازه گیری و منحنی رشد کودک در کارت مراقبت کودک رسم می شود)
- مکمل ویتامین آ+د
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی شنوایی
- ارزیابی رفتار با کودک

- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از آسیب

حمایت خانواده

- والدین مانند دو شریک هستند و باید با احترام با هم رفتار کنند.
- برای خودتان وقت بگذارید.
- با همسرتان وقت بگذرانید.
- برای هر یک از فرزندانان به تنهایی وقت بگذرانید.
- همسرتان را تشویق کنید که از کودکان مراقبت کند.
- اگر شاغل هستید، برای بازگشت به کار برنامه ریزی کنید.

رشد و تکامل کودک

- در این سن کودک شما:
- اشیای در حال حرکت را با نگاه دنبال می کند.
 - به افراد لبخند می زند.
 - می تواند سرش را ثابت نگه دارد.
 - وقتی او را به حالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار می دهید، می تواند با پاهایش به سمت پایین فشار وارد کند.
 - اشیای را به دهان می برد.

- می تواند بغبغو کند یا صداهای دیگری با دهانش تولید کند.
- می تواند یک یا دو چشمش را در همه جهات حرکت دهد.
- در صورتی که کودک شما هر یک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۴ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز / مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند:



- با کودکتان تماس چشمی برقرار کنید و سعی کنید اشارات او را درک کرده و پاسخ مناسب بدهید.
- فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند.
- به کودک خود لبخند بزنید، بخندید و سعی کنید او را بخندانید.
- با کودک خود صحبت کنید. با تقلید صدا یا ژست خودش با او مکالمه کنید.
- اولین روش های ارتباط برقرار کردن کودک، گفتن کلمات نامفهوم، لبخند زدن و خندیدن است. آن ها را تقویت کنید.
- هر روز کودکتان را بغل کنید، با او حرف بزنید، و برایش آواز بخوانید و کودکتان را به آرامی تکان دهید.
- به کودکتان اسباب بازی بدهید، او می تواند آن ها را تکان دهد یا به آنها ضربه بزند. یک

اسباب بازی که در حال تکان خوردن صدا می دهد آگاهی کودک شما را افزایش می دهد. او دوباره این کار را تکرار خواهد کرد.

- برای کودکان هر شب لالایی بخوانید.
- یاد بگیرید که کودکان چه چیزی دوست دارد و چه چیزی دوست ندارد.
- چیزهایی مثل آینه (بی خطر مخصوص کودک)، اسباب بازی های رنگارنگ را به کودکان بدهید که در دستانش نگه دارد.
- وقتی کودکان بیدار است، اجازه دهید در حالی که روی شکم است وقت زیادی را صرف تماشا کردن اطراف کند. حتماً مراقبش باشید.
- کودکان را بغل کنید و با هم صحبت کنید، اغلب برای او کتاب بخوانید.
- زمانی که کودکان توانایی نشستن پیدا کرد برای ساخت عضلاتش با او بازی کنید، کودک را به پشت بخوابانید و با گرفتن دست ها او را آرام به حالت نشسته بلند کنید. طوری در یک طرف کودک قرار بگیرید که او مجبور شود برای یافتن شما تنه خود را بچرخاند.
- کودکان دوست دارند روی زمین بنشینند، غلت بزنند، سینه خیز بروند، بنابراین به غیر از زمان مسافرت و خواب سعی کنید کودکان را داخل صندلی مخصوص کودک، تختخواب مخصوص کودک، یا جایگاه مخصوص بازی، بیشتر از ۱۵ دقیقه نگذارید.
- اسباب بازی های رنگارنگ، کتاب های رنگ شده با رنگ های روشن برای درگیر کردن کودک در بازی های فعال استفاده شود.
- هراتباط متقابل با محیط کودک و مراقب کودک ارتباطات جدیدی در ذهن او ایجاد خواهد کرد.

تغذیه کودک

- تا ۶ ماهگی فقط از شیر مادر برای تغذیه کودک استفاده کنید.
- به کودکان هر روز ۴۰۰ واحد مکمل ویتامین د و ۱۵۰۰ واحد ویتامین آ بدهید.

تغذیه با شیر مادر



- تغذیه کودک با شیر خودتان عالی است همچنان ادامه دهید.
- کودکان را شب و روز هر چقدر و هر زمان می خواهد حداقل ۸ بار در ۲۴ ساعت با شیر خود تغذیه کنید. تغذیه مکرر باعث تولید شیر بیشتر می شود.
- اگر شاغل هستید، برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر پستانتان برنامه ریزی کنید.
- برای شیردادن کودک با شیر مادر پس از بازگشت به سر کار به اندکی برنامه ریزی نیاز است. کارفرما و مراقب کودک می توانند با شما همکاری کنند تا این کار برایتان آسان تر شود.

ایمنی کودک

- اشیاء کوچک و کیسه های پلاستیکی را دور از کودک نگه دارید.
- هرگز کودک خود را در جاهای بلند مانند میز، تخت خواب بدون حفاظ، نیمکت و ... رها نکنید و در هر ارتفاعی که ممکن است کودک از آن بیافتد و آسیب ببیند با دستتان او را نگه دارید.

- زمانی که کودک را بغل کرده‌اید از نوشیدن مایعات داغ اجتناب کنید.
- هرگز کودکان را در وان یا تشت آب حتی اگر روی صندلی و یا حلقه مخصوص حمام کودک باشد، تنها رها نکنید. توصیه می‌شود از صندلی یا حلقه حمام کودک استفاده نشود.
- آشپزخانه خطرناک‌ترین محل برای کودک است اجازه ندهید کودکان در اطراف آن سینه‌خیز برود، به جای آن از صندلی‌های بلند و از جایگاه‌های ساخته شده مخصوص بازی کودکان استفاده کنید.
- از روروک استفاده نکنید زیرا به هیچ عنوان برای کودک مفید نیست و ممکن است باعث حوادث جدی شود. به جای آن از صندلی‌های مخصوص کودک بدون چرخ استفاده کنید.
- اجازه ندهید کسی در خانه یا خودروی شما سیگار بکشد.
- پودر تمیزکننده و اشیاء کوچک را همیشه دور از دسترس کودک نگه دارید.
- کودکان را بیشتر از ۱۰ دقیقه در معرض نور آفتاب قرار ندهید. اگر او را بیرون می‌برید با کلاه، لباس آستین بلند و شلوار بیرون ببرید.
- یک تخت‌خواب استاندارد مخصوص کودک، هیچ راهی برای سر خوردن کودک ندارد، فاصله نرده‌های دور تخت‌خواب بیشتر از ۶ سانتی‌متر نباشد.
- آب دهان کودک شما ممکن است تراوش کند و یا اشیایی را داخل دهانش بگذارد. مطمئن شوید که کودک شما از اشیاء کوچک و برنده به دور است.

مراقبت های دیگر

خواب

- کودک تان را به پشت بخوابانید در نظر بگیرید که ممکن است هنگام خواب غلت بزند، وقتی که کودک تان می تواند غلت بزند (معمولا در ۴ تا ۷ ماهگی) ممکن است دیگر به پشت نخوابد.
- حدود ۸۰ درصد از کودکان ۴ ماهه حداقل ۵ تا ۶ ساعت به طور پیوسته در شب می خوابند. اگر کودک شما اینگونه نیست در حالی که بیدار است او را در رختخوابش بگذارید. با او بازی نکنید و قبل از خواب با او تماس زیادی نداشته باشید.
- ماساژ دادن کودک ممکن است به او کمک کند که راحت تر بخوابد.



واکسیناسیون

- فلج اطفال خوراکی
- پنج گانه
- فلج اطفال تزریقی
- کودک باید واکسن های مورد نیاز را در زمان های تعیین شده دریافت کند. اگر از زمان بندی واکسیناسیون کودک تان اطلاع ندارید و یا عقب مانده اید کارمندان بهداشتی به شما کمک خواهند کرد تا آن را در زمان مناسب انجام دهید.

تعویض پوشک

- برای این کار برنامه‌ای منظم مثل قبل از غذا دادن به کودک، قبل از چرت روزانه و قبل از خواب شب او داشته باشید.

گریه کردن

- وقتی کودک گریه می‌کند فرض را بر این نگذارید که کودکتان گرسنه است. شاید او نیاز به آرام کردن داشته باشد.

بیمار شدن

- بیماری برای هر کسی اتفاق می‌افتد. سرماخوردگی خیلی راحت حتی برای یک فرد کوچک اتفاق می‌افتد.
- برای محافظت کودک از بیمار شدن، باید کارهای زیر را انجام دهید:
 - دست‌های خودتان و دست‌های کودک را بشویید.
 - اسباب بازی‌های کودک را تمیز نگاه دارد
 - در صورتی که کودک از پستانک استفاده می‌کند آن را حتماً تمیز نگه دارید.

مراقبت دهان و دندان

- در سال دوبار نزد دندانپزشک بروید، بسیار مهم است که دندان‌های خودتان را سالم نگه دارید چون این کار باعث می‌شود باکتری‌هایی که باعث خرابی دندان‌ها می‌شود را به فرزندتان انتقال ندهید.

نکات کلیدی مراقبت ۴ ماهگی

۱۱

- از قاشق و فنجان مشترک با فرزندان استفاده نکنید و یا از دهان خود برای تمیز کردن پستانک کودکان استفاده نکنید.
- هنگامی که کودکان در حال دندان درآوردن است و لثه هایش دچار خارش هستند، از یک حلقه دندان‌گیر مخصوص برای کودک استفاده کنید.
- دهان کودکان را با یک پارچه تمیز یا مسواک انگشتی نرم و آب تمیز کنید.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۶ ماهگی است

در مراقبت ۶ ماهگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی دهان و دندان (در صورت رویش اولین دندان)
- غربالگری تکامل با استفاده از پرسشنامه استاندارد
- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی‌هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی‌هایی برای فعالیت بدنی
- راهنمایی‌هایی برای عوامل محیطی موثر بر سلامت
- مکمل‌های (آهن و ویتامین A+D)
- واکسن‌های فلج اطفال خوراکی و تزریقی و پنج‌گانه
- معاینه توسط پزشک





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

کتابخانه ملی



ISBN 978-964-11-1111-1





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان بهداشت و درمان
دفتر سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت
آموزشی سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت مراقبت ۶ و ۷ ماهگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی مراقبت ۶ ماهگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان.
 مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری : ۱۲ص؛ ۱۵ × ۱۵ س.م.
 شابک : دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۳۰-۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۶۲۲-۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 موضوع : نوزاد - مراقبت Care - Infants
 موضوع : نوزاد - تغذیه Nutrition - Infants
 موضوع : نوزاد - رشد Development - Infants
 رده بندی کنگره: RJ۶۱
 رده بندی دیویی: ۱۲۲/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۹۶۰۲



نکات کلیدی مراقبت ۶ ماهگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۳۰-۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۶۲۲-۹۷۸
 شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۵-۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۳ رشد و تکامل کودک
- ۴ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۶ تغذیه کودک
- ۸ ایمنی کودک
- ۱۰ مراقبت های دیگر
- ۱۰ خواب
- ۱۰ واکسیناسیون
- ۱۱ مراقبت از دهان و دندان
- ۱۱ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۹ ماهگی است

مقدمه

۳

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. بهورزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در سن ۶ ماهگی لازم است کودک مورد پایش قرار گیرد. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۶ ماهه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دور سر کودک و رسم منحنی رشد در کارت مراقبت کودک)
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی دهان و دندان (در صورت رویش اولین دندان)
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- غربالگری تکامل (با استفاده از پرسشنامه استاندارد)
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- مکمل های (آهن و ویتامین آ + د)
- واکسن های فلج اطفال خوراکی و تزریقی و پنج گانه
- معاینه توسط پزشک

رشد و تکامل کودک

در این سن کودک شما:

- به صداهای اطرافش واکنش نشان می دهد.

- اشیاء را به دهان می برد.
- تلاش می کند دستش را به اشیایی که در دسترس قرار دارند برساند.
- به مراقب خود توجه می کند. به صداهای اطرافش واکنش نشان می دهد.
- از خودش صداهایی مانند (آ، اه، او) در می آورد.
- به اطراف غلت می زند.
- با حمایت یا خم شدن و تکیه کردن روی دستانش می نشیند.
- می خندد، جیغ می کشد.
- در صورتی که کودک شما هریک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۶ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید.
- پس از تکمیل برای بررسی به بهورز/ مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند:

- با کودکان تماس چشمی برقرار کرده و سعی کنید اشارات او را درک کرده و پاسخ مناسب دهید.
- سعی کنید او را بخندانید.
- در این سن کودک شما دوست دارد با شما و دیگر افراد بزرگسال بازی کند.
- وسایل خانگی تمیز و بی خطر مانند ظروف دردار، قابلمه و قاشق فلزی را به کودک خود بدهید تا با آن ها بازی کند، به هم بزند و بیاندازد.
- به صدا و علایق کودک خود پاسخ دهید، نام او را صدا کنید و پاسخ او را ببینید.
- کودک شما توجه و عشق شما نسبت به خودش را دوست دارد، کودکان را به خاطر کارهای مثبتی که انجام می دهد تشویق کنید.
- هر روز لحظات خاصی با کودکان داشته باشید، اطمینان حاصل کنید که به طور روزانه هر روز

- دقایقی را با فرزندتان کار مشترکی انجام می دهید.
- جای کودکان را طوری تنظیم کنید که بتواند راست بنشیند و اطراف را نگاه کند.
- صدای کودکان را ضبط کنید و با صدای ضبط شده خودش با او صحبت کنید.
- با هم کتاب مصور نگاه کنید و هر شب برایش کتاب بخوانید.
- کودکان معنی کلمه «نه» را درک نمی کند، به جای اینکه از کلمه «نه» استفاده کنید، خانه را برای او امن کنید و هرگونه شرایط خطرناکی را حذف کنید.
- نق زدن یا گریه کودک شما به دلیل یک نیاز یا یک ناراحتی است. او برای ناراحت کردن شما یا شیطنت گریه نمی کند.
- به کودک اسباب بازی های مناسب سنش و کاملاً ایمن بدهید که نگه دارد یا در دهانش بگذارد و مطمئن شوید که به اندازه کافی خواب روزانه و منظم و وقت بازی دارد.
- به او کمک کنید که در محیط امنی سینه خیز از یک جا به جای دیگر برود. این کار کمک می کند که در او حس اعتماد به نفس و قدرت که برای راه رفتن نیاز دارد، ایجاد شود.
- با کودکان صحبت کنید و به صداهایی که او ایجاد می کند پاسخ دهید. این کار صحبت کردن را در او تحریک می کند.
- کودکان ممکن است اضطراب جدایی داشته باشد. بدین معنی که هنگام ترک والدین، ناراحت می شود. این مساله و نگرانی در حضور غریبه ها طبیعی است. پیشنهادات زیر به او کمک می کند جدایی موقت از مادر را بهتر بپذیرد:
- به کودکان اطمینان بدهید که برمی گردید و او را با خودتان می برید.
- به خودتان زمان بیشتری بدهید.
- دزدکی از اتاق خارج نشوید، این کار باعث گیج شدن کودک می شود و زمانی که متوجه می شود شما

رفته اید، به اطمینانش نسبت به شما لطمه می زند.

- از مراقب سلامت / بهورز خود بخواهید پرسشنامه غربالگری ۶ ماهگی تکامل کودکان را در اختیار شما قرار دهد و درباره نحوه تکمیل آن برای شما توضیح دهد.
- فعالیت های پرسشنامه را طی ۲-۱ هفته با حضور همسران با کودک انجام دهید و نتیجه را ثبت نمایید، سپس پرسشنامه تکمیل شده را برای بررسی به مراقب سلامت / بهورز تحویل دهید.

تغذیه کودک

- اگر کودکان را با شیر مادر تغذیه می کنید به این روند ادامه دهید. تا تولد دو سالگی او را با شیر مادر تغذیه کنید. مطابق میل شیرخوار حداقل ۸ بار در ۲۴ ساعت او را با شیر خود تغذیه کنید.
 - اگر کودک شما از شیر مادر محروم است و با شیر بطری تغذیه می شود اطمینان حاصل کنید که از شیر غنی شده با آهن استفاده می کنید. در صورت تغذیه با شیر مصنوعی:
- * مطمئن شوید که تمام مراحل آماده کردن، گرم کردن و ذخیره کردن شیر را سالم و بدون خطر انجام می دهید.

- * کودکان را هنگام شیر دادن طوری در آغوش بگیرید که بتوانید یکدیگر را ببینید. کودکان در حال تغذیه با بطری همیشه باید در آغوش گرفته شوند، این روش باعث ایجاد رابطه عاطفی بین مادر یا مراقب کودک و کودک خواهد شد و همچنین حس امنیت عاطفی در کودک ایجاد خواهد کرد، هیچگاه بطری شیر را به چیزی تکیه ندهید. این کار ممکن است باعث خفگی کودک شود.
- * قبل از خواب روزانه و شبانه باید شیر دادن با بطری به کودک تمام شده باشد. کودک نباید زمان خواب روزانه و شبانه با بطری بخوابد.

- به کودکان هر روز قطره آهن، ۴۰۰ واحد مکمل ویتامین د و ۱۵۰۰ واحد ویتامین آ بدهید.
- از پایان ۶ ماهگی تغذیه با غذای کمکی را برای کودک شروع کنید. بعضی از علامت هایی که کودک

نکات کلیدی مراقبت ۶ و ۷ ماهگی

۷

در صورت آمادگی برای تغذیه با غذاهای جامد از خود نشان می دهد عبارتند از:

* باز کردن دهان برای قاشق

* نشستن با کمک دیگران

* کنترل خوب سر و گردن

* علاقه نشان دادن به غذاهایی که شما می خورید.

• با راهنمایی مراقب سلامت / بهورز غذای کمکی را می توان با ۳-۲ قاشق مرباخوری از فرنی یا حریره بادام با غلظت مناسب (غلظت مشابه ماست معمولی) ۳-۲ بار در روز شروع نموده و این میزان را به تدریج افزایش داد.

• پس از معرفی غلات، می توانید پوره یا شکل نرم شده انواع گوشت ها (قرمز، مرغ، ماهی و پرندگان) که خوب پخته شده و ریز ریز شده، سبزی ها (هویج، سیب زمینی، کدو حلوائی) و میوه های متنوع



کاملاً رسیده و نرم (انبه، سیب، گلابی، موز، طالبی، هلو) و تخم مرغ کاملاً پخته شده (شامل سفیده و زرده) را به کودکتان بدهید. سپس می توانید ترکیبی از دو یا چند ماده غذایی را به شکل پوره های ترکیبی، سوپ، حلیم یا آش به او بدهید. از حبوباتی مانند عدس و ماش نیز می توانید در سوپ و آش استفاده کنید (حبوبات قبل از پخت ابتدا در آب به مدت چند ساعت خیسانده و آب آن دور ریخته شود و سپس بطور کامل بیزد).

• ماست پاستوریزه و پنیر کم نمک پاستوریزه را به برنامه غذایی کودک اضافه کنید.

• از افزودن شکر یا نمک اجتناب کنید.

• به کودکتان هر روز ۳-۲ وعده غذا بدهید.

• ۲-۱ میان وعده غذایی مانند پوره سبزی ها (هویج یا سیب زمینی) یا پوره میوه های رسیده نرم

شده (موز، گلابی، انبه، طالبی، هلو، زردآلو، سیب، آلو) را می‌توانید براساس اشتباهی کودکان بین وعده‌های اصلی در روز به او بدهید. در مورد میوه‌های هسته‌دار مانند زردآلو، آلو یا هلو حتماً هسته آنها جدا شده و سپس به کودک داده شوند.

- میزان غذای کودکان را می‌توانید به تدریج تا نصف لیوان (هر لیوان = ۲۵۰ سی‌سی) در هر وعده غذایی افزایش دهید.
- به خاطر داشته باشید که هر غذای جدید نیاز به ۱۰ تا ۱۵ بار امتحان توسط کودک دارد تا کودک طعم آن را دوست داشته باشد.
- خود میوه کامل (به صورت پوره یا میوه له شده) از نظر غذایی کامل تر از آب میوه است پس بهتر است از پوره انواع میوه‌های رسیده و نرم مانند گلابی و موز استفاده کنید.
- کودکان را برای خوردن یا دست کشیدن از خوردن تحت فشار نگذارید. او را مجبور به خوردن یا اتمام غذا نکنید. از تغذیه زیاده از حد کودکان در صورت دیدن علائم سیری او، اجتناب کنید. این علائم می‌تواند شامل عقب کشیدن سر، رو برگرداندن از پستان، بطری یا قاشق باشد.

ایمنی کودک

- حتی در مسافرت‌های کوتاه مدت از صندلی مخصوص کودک استفاده کنید.
- هیچ‌گاه فرزندان را روی صندلی جلوی وسیله نقلیه قرار ندهید.
- کودکان را در جاهای بلندی که ممکن است از روی آنها بیافتند مثل دراور، تختخواب، کاناپه و کمد رها نکنید.
- از یک تختخواب یا جایگاه مخصوص بازی کودک برای ایمن نگاه داشتن فرزندان استفاده کنید.
- هرگز از روروک استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث صدمات جدی شود و به هیچ‌عنوان مفید نیست.

نکات کلیدی مراقبت ۶ و ۷ ماهگی

- روی ورودی پله ها در گذاشته شود.
- هنگامی که در آشپزخانه هستید کودکان را روی صندلی کودک یا جایگاه مخصوص بازی کودک قرار دهید.^۹
- دسته ماهی تابه، شیر کنری یا سماوری را که روی گاز قرار دارد به سمت عقب گاز بچرخانید (دسته آن در معرض گرفتن توسط کودک نباشد)
- اتو و لوازمی مثل سشوار، اتوی مو و... را در حالیکه از برق کشیده نشده اند رها نکنید.
- وقتی مایعات داغ می نوشید یا غذاهایی با مایعات داغ درست می کنید کودکان را بغل نکنید.
- درهای جاهایی مثل حمام را که کودکان ممکن است وارد آنها شده و آسیب ببینند همیشه بسته نگاه دارید.
- هرگز کودکان را در وان یا تشت آب تنها رها نکنید. همیشه آنقدر به کودکان نزدیک باشید که بتوانید او را لمس کنید.
- کلیه داروها، پودر تمیز کننده و اشیاء کوچک را دور از دسترس کودک نگاه دارید. همیشه در ظرف های حاوی مواد سمی، داروها و مواد پاک کننده را بسته نگاه دارید.
- خانه تان را کاملاً امن کنید. زمانی که کودک شما شروع به جست و خیز کردن و سینه خیز رفتن می کند، داخل پریزهای برق درپوش پلاستیکی بگذارید، گوشه های تیز مبلمان و اثاثیه خانه را پوشانید، مراقب کابل های آویزان از جمله طناب پرده ها، رومیزی و مایع های داغ باشید.
- اجازه ندهید کودکان اشیاء کوچک مثل اسباب بازی های کوچک، آجیل، سکه و... را بردارد، این اشیاء ممکن است خفگی ایجاد کنند.
- هیچگاه کودکان را حتی برای چند ثانیه تنها نگذارید.

مراقبت های دیگر

خواب

این پیشنهادات را هنگام خوابانیدن کودکان به یاد داشته باشید:

- یک برنامه روزانه برقرار کنید تا زمان خواب برای او قابل پیش بینی باشد. یک برنامه منظم آرامش بخش برای خواب تنظیم کنید طوری که خواب در نظر او یک برنامه مرتب شبانه معرفی شود.
- در حالی که بیدار است او را در رختخوابش بگذارید. قبل از خواب به او یک اسباب بازی خاص و یک پتوی مخصوص بدهید و هر شب همان اسباب بازی و همان پتو را به او بدهید. مراقب باشید اسباب بازی که به او می دهید ایمن باشد. قبل از خواب با او بازی نکنید و با او تماس زیادی نداشته باشید.
- به کودک پستانک ندهید، اگر مجبور شدید به کودکان پستانک بدهید در صورتی که با پستانک به خواب می رود پس از به خواب رفتن پستانک را از دهانش خارج کنید.
- اگر کودکان شب هنگام از خواب بیدار شد او را از تختخوابش بیرون نیاورید و در حالی که دراز کشیده او را آرام کنید.

واکسیناسیون

- در ۶ ماهگی کودک شما نیاز به واکسن های فلج اطفال خوراکی و پنج گانه دارد.
- اگر از زمان بندی واکسیناسیون کودکان عقب مانده اید ارائه دهندگان خدمات واکسیناسیون به شما کمک خواهند کرد تا آن را در زمان مناسب انجام دهید.
- با بهورز/ مراقب سلامت کودک خود در مورد دادن استامینوفن قبل و بعد از واکسیناسیون مشورت کنید.

مراقبت از دهان و دندان

- تعدادی از کودکان در این سن شروع به دندان درآوردن می کنند.
- با رویش اولین دندان کودک لازم است قرارهای منظم دندانپزشکی داشته باشید.
- حداقل یک بار در روز لثه های کودکان را با پارچه نرم و تمیز به نرمی ، تمیز کنید. در صورتی که دندان او بیرون آمده باشد از یک پارچه نرم یا مسواک انگشتی به کمک آب برای تمیز کردن هر دندان استفاده کنید.
- در صورتی که کودک شما از شیر مادر محروم است ، شیشه شیر را در رختخواب به کودکان ندهید.
- زمان های خاصی برای غذا دادن به کودک داشته باشید. اجازه ندهید کودکان همیشه در حال خوردن باشد.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۹ ماهگی است.

در مراقبت ۹ ماهگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پیش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی تکامل
- ارزیابی شنوایی
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- مکمل های (آهن و ویتامین آ+ د)
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران - قزوین

ISBN 978-964-12-125-8



ISBN 978-964-12-125-8



978-964-12-125-8



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سازمان جمعیت، خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت ۹ ماهگی



۷

به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی مراقبت ۹ ماهگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان.
 مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری :
 ۱۲ص؛ ۱۵ × ۱۵ س.م.
 شابک : دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۳۱-۲ : ۷۰۰۷-۶۲۲-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 موضوع : نوزاد - مراقبت - Care - Infants
 موضوع : نوزاد - تغذیه - Nutrition - Infants
 موضوع : نوزاد - رشد - Development - Infants
 رده بندی کنگره : RJ۶۱
 رده بندی دیویی : ۱۲۲/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۴۹۶۲۵



نکات کلیدی مراقبت ۹ ماهگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان

ناشر: اندیشه ماندگار

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

شابک: ۷۰۰۷-۶۲۲-۳۱-۲ : ۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۴ رشد و تکامل کودک
- ۴ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۶ تغذیه کودک
- ۷ ایمنی کودک
- ۸ مراقبت های دیگر
- ۸ خواب
- ۸ واکسیناسیون
- ۹ مراقبت از دهان و دندان
- ۹ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۱۲ ماهگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، گزینه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف از جمله ۹ ماهگی لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه بهداشتی / خانه بهداشت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید مراقبین سلامت / بهورزان و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۹ ماهه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه کودک
- ارزیابی تکامل کودک
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از آسیب کودکان
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک

۴ • مکمل‌های آهن و ویتامین آ+ د

رشد و تکامل کودک

در این سن کودک شما:

- در حالی‌که با گرفتن زیر بغل، کودک را در حالت ایستاده نگاه داشته‌اید، می‌تواند حداقل به مدت ۲ ثانیه روی کف پایش بایستد.
- می‌تواند با کمک بنشیند.
- صداهایی بی‌معنی مانند «ما--ما»، «با--با»، «دا--دا» در می‌آورد.
- وقتی با او بازی می‌کنید، با شما همراهی می‌کند.
- با شنیدن اسم خودش، واکنش نشان می‌دهد.
- افراد آشنا را از غریبه تشخیص می‌دهد.
- به طرفی که شما اشاره می‌کنید، نگاه می‌کند.
- اشیاء را از یک دست به دست دیگری می‌دهد.
- در صورتی که کودک شما هر یک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۹ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز / مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می‌کند:

- با کودکان تماس چشمی برقرار کنید، سعی کنید اشارات او را درک کرده و پاسخ مناسب بدهید.



- سعی کنید او را بخندانید.
- با کودکتان بازی کنید. او صداها و حرکات شما را تقلید می‌کند. این راهی است که کودک شما می‌آموزد.
- اسباب بازی مورد علاقه کودک را زیر پارچه یا جعبه پنهان کنید. ببینید آیا کودک می‌تواند آن را پیدا کند.
- با کودک خود دالی موشه بازی کنید.
- نام اشیا و افراد را به کودک بگویید.
- به او یاد بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بای بگوید.
- عروسکی با صورت برای او تهیه کنید.
- از علائق کودک خود مطلع شوید و به آن‌ها پاسخ دهید.
- تمرین کنید که «نه» گفتن را فقط در مواقعی که کودک در خطر است استفاده کنید در سایر موارد یک انتخاب دیگر یا اسباب بازی دیگر به او پیشنهاد دهید.
- هرگز از تنبیه بدنی استفاده نکنید.
- کمی دورتر از کودک نشسته و دستان خود را به طرف کودک باز کنید و با صدا زدن نامش و نشان دادن اشیا مورد علاقه اش او را تشویق به حرکت کنید.

- به کودک هر روز ۳-۴ وعده غذا بدهید.
- هر روز می‌توانید براساس اشتتهای کودکان بین وعده‌های اصلی، ۱-۲ میان وعده غذایی مانند هویج یا کرفس به صورت قطعات بسیار کوچک پخته شده یا میوه‌های رسیده نرم شده (موز، گلابی، سیب، هلو، طالبی) بدهید.
- میزان غذای شیرخوار را می‌توان به تدریج تا نصف لیوان در هر وعده غذایی افزایش داد.
- علاوه بر تمام مواد غذایی معرفی شده در سن ۸-۶ ماهگی، می‌توان غذاهای انگشتی که کودکان می‌تواند با دست بگیرد مانند تکه‌های کوچک انواع گوشت‌های (قرمز، مرغ، ماهی و پرندگان) که خوب پخته شده و ریزش شده و تکه‌های کوچک گوشت بدون چربی یا کوفته قلقلی کاملاً پخته شده یا با پست قاشق له شده، ماکارونی پخته شده یا نان را در برنامه غذایی کودکان بگنجانید. اگر خودش را کثیف کرد، مشکلی نیست.
- شیرخوار در این سن به دلیل خوردن غذای کمکی، شیرمادر یا شیر مصنوعی کمتری می‌نوشد.
- تا یکسالگی ابتدا شیرمادر و سپس غذای کمکی را به کودک بدهید.



- غذاهایی مثل پفک، چیپس و... به کودکان ندهید.
- هر روز قطره آهن، ۴۰۰ واحد مکمل ویتامین د و ۱۵۰۰ واحد ویتامین آ به او بدهید.

ایمنی کودک



- روی ورودی پله‌ها در تعبیه کنید.
- هرگز مایعات داغ را روی میز یا بالای پیشخوان نزدیک لبه‌های آن قرار ندهید.
- کودک خود را دور از اجاق داغ و کوره نگه دارید.
- با رعایت اصول ایمنی از سوختگی کودک پیشگیری کنید، در صورتی که کودک شما دچار سوختگی شد عضو سوخته شده را زیر آب سرد بگیرید و سریع‌تر با اورژانس تماس بگیرید.
- هرگز کودکان را تنها در حمام یا نزدیک آب رها نکنید. کودک می‌تواند در آب با عمق ۱ اینچ (کمتر از ۳ سانتی متر) غرق شود.
- اجازه ندهید کودک اجسام کوچکی مثل اسباب بازی، آجیل، سکه، تکه‌های هات داگ، بادام زمینی، ذرت بو داده، کشمش یا انگور بردارد. این‌ها می‌توانند باعث خفگی او شوند.
- کلیه داروها، بودرد تمیز کننده و اشیاء کوچک را دور از دسترس کودک نگه دارید.
- در صورتی که کودک شما مواد سمی بلعید با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید. تلفن اورژانس را در دسترس قرار دهید.

مراقبت های دیگر

خواب

- کودک شما باید بتواند در طول شب بخوابد، اگر در طول شب از خواب بیدار شود باید بدون کمک شما بتواند دوباره بخوابد.
- یک برنامه منظم شبانه وقت خواب مانند حمام کردن، مسواک زدن، خواندن کتاب، لالایی گفتن تنظیم کنید. مطمئن باشید این روال هر شب انجام می شود.
- در حالی که بیدار است او را در رختخوابش بگذارید. به او همان اسباب بازی هر شب و همان پتو را که هر شب استفاده می کند بدهید. مراقب باشید اسباب بازی ایمن باشد. با او بازی نکنید و قبل از خواب با او تماس زیادی نداشته باشید.
- به کودک پستانک ندهید ولی اگر کودکتان با پستانک به خواب می رود پس از به خواب رفتن پستانک را از دهانش خارج کنید.
- اگر کودکتان شب هنگام از خواب بیدار شد او را از تختخوابش بیرون نیاورید و در حالیکه دراز کشیده او را آرام کنید.

واکسیناسیون

اگر واکسیناسیون کودک را در زمان مقرر انجام داده اید، در ویزیت ۹ ماهگی واکسن ندارد. مگر پزشک کودک تشخیص دهد که او نیاز به تزریق واکسن آنفلوانزا دارد در این صورت برای دریافت

استامینوفن قبل و بعد از تزریق واکسن با مراقب سلامت / به‌هوزر مشورت کنید.



مراقبت از دهان و دندان

- دهان کودکتان را با یک پارچه تمیز یا مسواک نرم و آب تمیز کنید.
- از زمان رویش اولین دندان کودک، قرارهای منظم دندانپزشکی برای بررسی وضعیت دهان و دندان کودک داشته باشید.
- کودک شما ممکن است به مکمل فلوراید نیاز داشته باشد.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۱۲ ماهگی است

در مراقبت ۱۲ ماهگی خدمات زیر به کودک شما ارائه می‌شود:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی سلامت دهان و دندان و راهنمایی‌هایی برای سلامت دهان
- غربالگری تکامل (برای غربالگری تکامل کودک در این سن پرسشنامه استاندارد داده خواهد شد، آن را با دقت تکمیل نمایید و پس از تکمیل برای بررسی به مراقب سلامت تحویل دهید)
- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک

- ۱۰
- راهنمایی‌هایی برای ارتقای تکامل کودک
 - راهنمایی‌هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان
 - مکمل‌های آهن و ویتامین د
 - معاینه بالینی توسط پزشک
 - در صورت نیاز برخی موارد دیگر نیز بررسی خواهد شد.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

شاب ۹۷۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



ISBN 978-600-000000-0





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سازمان حمایت خانواده و مدارس
اداره سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت ۱۲ ماهگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور: نکات کلیدی مراقبت ۱۲ ماهگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان.
مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری: ۱۲ص؛ ۱۵ × ۱۵ س.م.

شابک: دوره ۱- ۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸؛ ۹-۳۲-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: مراقبت - Care - Infants

موضوع: نوزاد - تغذیه - Nutrition - Infants

موضوع: رشد - Development - Infants

رده بندی کنگره: RJ۶۱

رده بندی دیویی: ۱۲۲/۶۴۹

شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۹۶۲۴



نکات کلیدی مراقبت ۱۲ ماهگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان

ناشر: اندیشه ماندگار

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

شابک: ۹-۳۲-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۴ رشد و تکامل کودک
- ۴ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۷ تغذیه کودک
- ۹ ایمنی کودک
- ۱۰ مراقبت های دیگر
- ۱۰ خواب
- ۱۱ واکسیناسیون
- ۱۱ مراقبت های دهان و دندان
- ۱۱ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۱۵ ماهگی است

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف از جمله ۱۲ ماهگی لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه بهداشتی / خانه بهداشت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید مراقبین سلامت / بهورزان و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۱۲ ماهه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودک و انجام اقدامات لازم در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی سلامت دهان و دندان و راهنمایی هایی برای سلامت دهان و دندان
- غربالگری تکامل (برای غربالگری تکامل کودک در این سن پرسشنامه استاندارد داده خواهد شد، آن را با دقت تکمیل نمایید و پس از تکمیل برای بررسی به مراقب سلامت / بهورز تحویل دهید)
- ارزیابی ژنتیک
- مکمل های (آهن و ویتامین آ+د)
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک

- راهنمایی‌هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان
- معاینه بالینی توسط پزشک



رشد و تکامل کودک

در این سن کودک شما:

- می‌تواند چهار دست و پا راه برود.
- می‌تواند با کمک بایستد.
- برای پیدا کردن اشیایی که می‌بیند شما آن‌ها را پنهان می‌کنید تلاش می‌کند. یاد می‌گیرد اگر شیئی پشت یک پارچه پنهان شود هنوز آنجاست. (دوام اشیا را می‌فهمد)
- کلمات خاص مثل ماما یا بابا می‌گوید.
- بای بای یا سرسری کردن را یاد می‌گیرد.
- به اشیا اشاره می‌کند.

در صورتی که کودک شما هر یک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۱۲ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز / مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می‌کند:

- با کودکان تماس چشمی برقرار کنید، سعی کنید اشارات او را درک کرده و پاسخ مناسب بدهید.
- سعی کنید او را بخندانید.
- چیزهایی به کودک بدهید تا روی هم بچیند و داخل ظرف بیندازد و در بیاورد. می‌توانید از ظروف آشپزخانه و گیره‌های لباس استفاده کنید.

- اشیاء و افراد را نشان دهید و اسمشان را بگویید.
- از کودک بخواهید از کلمات شما استفاده کند. با تاکید بر لغاتی که کودک شما سعی دارد استفاده کند، به رشد زبان او کمک کنید.
- به او یاد بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بای بگوید.
- از علائق کودک خود مطلع شوید و به آن ها پاسخ بدهید.
- در این سن کودکان عروسک های با صورت دارند می توانید برایشان عروسک های دست ساز خانگی تهیه کنید.
- با کودکان بازی کنید و برای او کتاب بخوانید. بروی کتاب خواندن با همدیگر تمرکز کنید که سرشار از لذت است این کار می تواند قبل از خواب شبانه باشد.
- به کودکان کتاب های مصور نشان دهید. وقتی کتابی را به او نشان می دهید هیجان زده می شود و سعی می کند آن را از دست شما بگیرد و مزه مزه کند. کتاب هایش را به کسی نمی دهد آن ها را با اشتیاق ورق می زند، چندین صفحه را یکباره ورق می زند.
- هرگز کودکان را تنبیه بدنی نکنید، فریاد نکشید.
- کودک شما تقریباً هر چیزی را که شما می گوئید می فهمد و به دستورالعمل های ساده پاسخ می دهد. قوانین کوتاه و ساده برای او بگذارید.
- کودکان را برای کارهای خوبی که انجام می دهد تشویق کنید.
- وقتی که کودکان بد اخلاقی می کند زمان کوتاهی را با هم بیرون از خانه بگذرانید.
- زمانی که رفتار بدی انجام می دهد، حواسش را پرت کنید.
- در این سن کودکان بیشتر علاقه دارند که با خودشان یا بقیه کودکان بازی کنند.
- کودک شما دوست دارد سایر کودکان را در حال بازی کردن نگاه کند و می بیند که آن ها چگونه با اسباب بازی های شان بازی می کنند. از کودکان بزرگتر و مراقبینش تقلید می کند.

- کودکان را تشویق کنید همانطور که با شما و خواهر و برادرانش بازی می‌کند. به تنهایی نیز بازی کند.
- نیاز است از طریق تربیت درست به کودکان آموزش دهید. رفتار مثبت را آموزش دهید و تحسین کنید. حواس او را از رفتارهای بد و خطرناک پرت کنید و او را از انجام آن‌ها باز دارید. بد اخلاقی شایع است و باید نادیده گرفته شود. اطمینان حاصل کنید که کودک در طول اوقات تلخی درمان است.
- هیچگاه به فرزندان از نظر فیزیکی و احساسی آسیب نزنید. اگر کنترل خودتان را از دست دادید چند نفس عمیق بکشید کودکان را در یک جای امن قرار دهید و برای چند لحظه به اتاق دیگر بروید. اگر امکانش هست از کس دیگری بخواهید که از او مراقبت کند بطوری که شما بتوانید کمی استراحت کنید.
- با همسران یا دیگر افراد بزرگسال نجنکید و ناسزا نگویید فرزند شما چیزهایی که شما می‌گویید را تکرار خواهد کرد.
- هر زمانی که اجازه می‌دهد او را نوازش کنید.
- کودک باید بداند که می‌تواند به والدین یا مراقب خود اطمینان کند. این کار به خود کنترلی کودک کمک می‌کند و باعث می‌شود امنیت او تامین شود.
- برای کودک قوانین ساده و کوتاه وضع کنید.
- قوانین را به طور مدام تکرار و تاکید کنید. به طور مثال به کودک اجازه ندهید از قفسه مخصوص اسباب بازی‌ها بالا برود.
- با ایجاد یک محیط امن برای کودک که بتواند در آن بازی کند و به جستجو بپردازد زمان کمتری برای قانون گذاشتن و تاکید قوانین نیاز خواهید داشت.
- وقتی کودکان به خواب رفت، او را به اتاق خودش ببرید، این برنامه جدایی او را از اتاق والدین راحت‌تر خواهد کرد.
- از مراقب سلامت / بهورز خود بخواهید فرم غربالگری تکامل کودکان ۱۲ ماهه را در اختیار شما قرار

نکات کلیدی مراقبت ۱۲ ماهگی

دهد و درباره نحوه تکمیل آن برای شما توضیح دهد. فعالیت های پرسشنامه را طی ۲-۱ هفته با حضور همسرتان با کودک انجام دهید و نتیجه را ثبت نمایید. سپس پرسشنامه تکمیل شده را برای بررسی نزد مراقب سلامت / بهروز برگردانید.

تغذیه کودک

- برقراری زمان بندی منظم برای غذاهای اصلی و غذاهای میان وعده، به شما و کودک شما کمک خواهد کرد تا در زمان مقرر (بعد از ۲ سال) راحت تر بتوانید شروع به قطع شیر دادن کنید.
- اجازه دهید کودکتان از یک بشقاب و فنجان کوچک یا حتی لوازم آشپزخانه بی خطر مخصوص کودک برای خوردن و نوشیدن استفاده کند.
- عادات خوب از سن کم شروع می شوند پس در پیشنهاد غذاهای سالم به فرزندتان شک نکنید.
* زمان غذاهای اصلی و میان وعده باید منظم باشند.
* از غذا دادن مداوم به کودک اجتناب کنید.
- اجازه دهید کودکتان تصمیم بگیرد چه چیزی و چه میزان بخورد.
- هرگاه از خوردن دست کشید دیگر به او غذا ندهید. به عهده کودکتان بگذارید که چه اندازه غذا بخورد.
- هرگاه کودکتان تشنه بود او را تشویق کنید آب بنوشد.
- آبمیوه طبیعی را می توان ۱۲۰ سی سی (نصف لیوان) در روز به کودک داد. بهتر است خود میوه را به جای آبمیوه به او بدهید.
- از غذاهای سالم برای تغذیه کودکتان استفاده کنید و از دادن شیرینی اجتناب کنید.
- برخلاف سال اول زندگی، در کودکان ۱ تا ۲ ساله بهتر است تغذیه با شیر مادر نیم تا یک ساعت بعد از صرف غذای کودک انجام شود.
- خانواده هایی که عادت به خوردن غذاهای بیرون و فست فود دارند بیشتر احتمال اضافه وزن دارند.

- به کودکان همراه با غذا خوردن بقیه اعضای خانواده غذا بدهید. در حین غذا خوردن کودکان کنار او بنشینید. این کار به رشد اجتماعی، احساسی و حرکتی کودک کمک خواهد کرد.
- کودکان را تشویق کنید که خودش غذا بخورد. تا زمانی که کودکان یاد بگیرد به تنهایی و بدون کمک غذا بخورد صبور باشید.
- در روز ۳-۴ وعده غذایی کامل و ۱ تا ۲ وعده غذای مختصر به عنوان میان وعده به کودکان بدهید زمان دادن غذا را در فاصله‌های منظم در طول روز تنظیم کنید.
- غذاهای کامل و سالم، نرم و بدون ادویه و نمک به کودکان بدهید.
- از دادن غذاهای کوچک و سفت مثل آجیل، ذرت بوداده، هات داگ، دانه‌های انگور و سبزی‌های خام که می‌توانند باعث خفگی بشوند اجتناب کنید.
- کودکانی که از شیرمادر محروم هستند و از بطری استفاده می‌کنند، هر وقت توانستند یک فنجان را کنترل کنند می‌توانید بطری را از آن‌ها بگیرید، از زمانی شروع کنید که کودکان خیلی میل به خوردن بطری ندارد، هر هفته یک بطری کمتر به او بدهید و به جای آن یک فنجان شیر بدهید. شاید هم بتوانید یک دفعه بطری دادن به کودک را قطع کنید.
- کودکان ممکن است غذایی را که قبلاً دوست داشت دیگر نخورد و در مورد چیزهایی که می‌خورد ایراد گیر شود. اجباری نکنید که آن‌ها را بخورد، غذاهای دیگری به او بدهید.
- به خاطر داشته باشید که هر غذای جدید نیاز به ۱۰ تا ۱۵ بار امتحان توسط کودک دارد تا طعم آن را دوست داشته باشد.
- از غذا برای تنبیه یا تشویق کودک استفاده نکنید.
- به کودکان هر روز قطره آهن، ۴۰۰ واحد مکمل ویتامین د و ۱۵۰۰ واحد ویتامین آ بدهید.

ایمنی کودک

- ۹
- بی خطرترین روش سوار شدن کودک روی صندلی مخصوص کودک است که به صورت مناسب روی صندلی عقب خودرو نصب شده باشد. توصیه شده تا سن ۲ سالگی از این نوع صندلی استفاده شود.
 - یک الگوی خوب برای کودکان باشید. هنگام رانندگی با تلفن صحبت نکنید و پیامک ندهید.
 - زمین خوردن در این سن کاملاً رایج است درهای به سمت پله ها یا جاهای خطرناک را بسته نگاه دارید. در بالا و پایین پله ها در بگذارید و روی پنجره ها حفاظ نصب کنید، مبلمان دور از پنجره ها قرار گیرند.
 - کودکان در این سن سعی می کنند چیزهای مختلف را با گذاشتن در دهانش کشف کند، کلیه داروها، پودرهای تمیزکننده را دور از دسترس او نگاه دارید. همیشه در ظرف های حاوی مواد سمی، داروها و مواد پاک کننده را بسته نگاه دارید.
 - به کودکان غذاهایی با اندازه های کوچک مثل بادام زمینی، تکه های هات داگ یا انگور، که می توانند باعث خفگی شوند، ندهید. اشیاء کوچک، بادکنک و کیسه های پلاستیکی را دور از دسترس او نگاه دارید.
 - هرگز مایعات داغ را روی میز یا بالای پیشخوان نزدیک لبه های آن قرار ندهید. کودک خود را دور از اجاق داغ و کوره نگاه دارید.
 - هنگام غذا پختن روی اجاق دسته ماهیتابه را به سمت داخل بچرخانید و از شعله های عقبی گاز استفاده کنید.
 - سیم های برق و اشیاء مضر و خطرناک را دور از دسترس کودکان نگاه دارید.
 - هرگز کودکان را تنها در حمام یا نزدیک آب رها نکنید. کنار آب یا داخل آب فاصله تان در حدی باشد که بتوانید با دست او را لمس کنید.

- بعد از استفاده آب سطل، وان، تشت، استخر و... را خالی کنید. کودکان حتی در آب با ارتفاع ۳ سانتی متر نیز غرق می شوند.
- هنگام رانندگی به عقب در پارکینگ، کودک در فاصله امنی نگه داشته شود.
- چاقوها و قیچی را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- مطمئن شوید فضاهایی که کودکان از آنها استفاده می کند کاملاً امن است. مواقعی که خودتان نمی توانید از او مراقبت کنید، کودک نوپای خود را فقط به یک فرد بزرگسال، بالغ و مطمئن بسپارید.

مراقبت های دیگر

خواب

- کودکان در این سن باید حتماً یک خواب روزانه داشته باشد، طوری زمان آن را تنظیم کنید که کاملاً خسته باشد و راحت بخواب برود. این خواب روزانه جزو برنامه منظم روزانه او خواهد بود. یک ساعت قبل از خواب را به نوازش، محبت کردن و آرام کردن او اختصاص دهید. یک برنامه منظم و ساده برای زمان خواب شبانه داشته باشید که شامل خواندن کتاب برای کودک باشد.
- کودک شما ممکن است یک خواب روزانه در طول ۶ ماه آینده داشته باشد.
- ممکن است به حدود ۱۳ ساعت خواب در هر شبانه روز نیاز داشته باشد.
- برنامه منظم قبل از خواب شبانه، حمام کردن، مسواک زدن دندان ها و کتاب خواندن را ادامه دهید.
- سعی کنید کودک در شرایطی بخوابد که وقتی بعد از مدتی بیدار شد بتواند دوباره خودش را بخواباند. روی سینه یا روی پا خواباندن یا خوابانیدن با راه رفتن را کاهش دهید.
- کودک شما گاهی طی خواب شب نیمه بیدار خواهد شد و صدا و گاهی گریه خفیف خواهد کرد. برای خوابیدن مجدد کنارش باشید و لالایی آرام بخوانید. بغلش نکنید، شیرش ندهید و راهش نبرید. این کارها باعث بیداری کامل او خواهد شد. اگر فکر می کنید بخاطر این بیدار شده است که زمان شیرش

فرارسیده او را شیر بدهید.

واکسیناسیون

- اگر از زمان بندی واکسیناسیون کودکان عقب مانده اید ارائه دهندگان خدمات واکسیناسیون به شما کمک خواهند کرد تا آن را در زمان مناسب انجام دهید.
- کودک شما نیاز دارد واکسن MMR (سرخک، سرخجه، اوریون) را در این زمان دریافت کند. با بهورز/مراقب سلامت کودک خود در مورد دادن استامینوفن قبل و بعد از واکسیناسیون مشورت کنید.

مراقبت های دهان و دندان

- قرارهای منظم دندانپزشکی داشته باشید.
- روزی ۱ یا ۲ بار فقط با آب خالی و استفاده از یک مسواک انگشتی، دندان های کودکان را مسواک بزنید. نیازی به استفاده از خمیر دندان نیست. اگر از خمیر دندان استفاده می کنید به مقدار خیلی کم باشد. اجازه دهید کودکان بعد از مسواک زدن با مسواک بازی کند.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۱۵ ماهگی است

در مراقبت ۱۵ ماهگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- راهنمایی هایی برای تغذیه
- مکمل های (آهن و ویتامین آ+د)
- در صورت نیاز موارد دیگری بررسی خواهد شد.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

شاب ۹۷۸۶۰۲۲۰۳۱۰۲۲۵-۸



ISBN 9786022031025



MTR 9786022031025



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان بهداشت و درمان
دفتر سازمان حمایت خانواده و بچگی
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت ۱۵ ماهگی





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سازمان حمایت خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی

مراقبت ۱۸ ماهگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی مراقبت ۱۸ ماهگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان.
 مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری:
 ۱۲ ص:، ۱۵ × ۱۵ س.م.
 شابک : دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۳-۳۴-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۳
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 موضوع : نوزاد - مراقبت - Care - Infants
 موضوع : نوزاد - تغذیه - Nutrition - Infants
 موضوع : نوزاد - رشد - Development - Infants
 رده بندی کنگره : RJ۶۱:
 رده بندی دیویی : ۱۲۲/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۴۸۵۹۲



نکات کلیدی مراقبت ۱۸ ماهگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۳-۳۴-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۳
 شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۳

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۳ رشد و تکامل کودک
- ۴ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۶ تغذیه کودک
- ۹ ایمنی کودک
- ۱۰ مراقبت های دیگر
- ۱۰ خواب
- ۱۱ واکسیناسیون
- ۱۱ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۲ سالگی است

مقدمه

۳

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، گزینه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. بهورزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۱۸ ماهه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تکامل
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- مکمل آهن و ویتامین آ+د
- ارزیابی تغذیه
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث
- واکسن های سه گانه، فلج اطفال خوراکی، MMR

رشد و تکامل کودک

کودک شما در این سن:

- می تواند راه برود.
- برای نشان دادن اشیا به دیگران به آن ها اشاره کند.
- می داند اشیا معمول اطرافش (مثل قاشق، تلفن) چه کاربردی دارند.

- می‌تواند کارهای دیگران را تقلید کند.
- کلمه‌های جدید را یاد می‌گیرد.
- می‌تواند حداقل ۶ کلمه بگوید.
- وقتی مادر یا مراقبش او را ترک می‌کند یا پیش او برمی‌گردد، توجه می‌کند و اهمیت می‌دهد.
- در صورتی که کودک شما هریک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۱۸ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز / مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

نکاتی که به تکامل فرزندان کمک می‌کند:

- با کودکان تماس چشمی برقرار کنید، سعی کنید اشارات او را درک کرده و پاسخ مناسب بدهید.
- سعی کنید او را بخندانید.
- چیزهایی مانند ظروف آشپزخانه به کودک بدهید تا روی هم بچیند و گیره‌های لباس بدهید که داخل ظرف بیندازد و در بیاورد.
- سوالات ساده از او بپرسید، به تلاش‌های کودک برای صحبت کردن جواب بدهید.
- اشیاء، طبیعت و تصاویر را به او نشان بدهید و در باره آن‌ها با او صحبت کنید.
- تلاش کودکان را در یادگیری مهارت‌های جدید تحسین کنید. وقتی کاری را به خوبی انجام داده، به او بگویید.
- کودک شما کلمات بیشتری به نسبت کلماتی که می‌گوید، می‌فهمد. در مورد مسائل روزمره با او صحبت کنید. برای پیشرفت زبان گفته‌های او را به تفصیل شرح دهید. به عنوان مثال وقتی کودک می‌گوید: کتاب. به او بگویید: می‌خواهی کتاب بخوانی؟

- هر روز برای او کتاب بخوانید، به تصویری در کتاب که کودک تان نام می برد اشاره کنید و در مورد عکس های کتاب ها برایش توضیح دهید. از کلمات ساده برای توضیح دادن استفاده کنید.
- کتاب هایی در مورد برادر یا خواهر بزرگتر بودن برای او بخوانید.
- با کودک نوپا به گردش بروید. (یک ساعت یا کمتر)
- به کودک تان آموزش دهید مردم و حیوانات اهلی را نزند، گاز نگیرد یا به آنها آسیب نرساند.
- او را ترغیب کنید به مهربانی با دیگران رفتار کند و به او یاد بدهید رفتارهای خشن مثل گاز گرفتن و کتک زدن قابل قبول نیستند.
- یادگیری شریک شدن با کودکان دیگر برای کودکانی که آمادگی این کار را ندارند بسیار سخت است. مفهوم شریک شدن را برای او شرح دهید. به فرزندان بزرگترتان برای با اسباب بازی هایی که نمی خواهند با دیگران شریک شوند، مکانی امن بدهید.
- کودک شما در این سن تلاش می کند از حالت همواره وابسته بودن به مستقل بودن برسد.
- حد و حدودی را که برایتان مهم است تعیین کنید و از دیگران بخواهید همانطور با کودک تان رفتار کنند. با او رفتار ثابتی داشته باشید. اگر کودک برای دنبال کردن قوانین ساده به طور ثابت راهنمایی شود، برای پیروی از قوانین بیشتر علاقمند می شود.
- از او سؤالات ساده پرسید، جواب هایش را تأیید کنید و برایش به سادگی توضیح دهید.
- کودک شما از کمک در کارهای ساده روزمره لذت خواهد برد. ممکن است علاقمند به انجام کارهای خانه باشد. اگر ممکن است به او اجازه دهید با دیگ، ماهی تابه و ظروف پلاستیکی بازی کند یا در کارهای روزمره ساده ای کمک کند. با انجام دادن کارهایی که دوست دارد، هر روز با او بازی کنید.
- مطمئن شوید کودک تان نظم و انضباط ثابتی در خانه و در مراقبت روزانه دارد.
- به جای تمرکز بر روی کارهایی که کودک تان نباید انجام دهد، بر روی کارهایی مانند راه رفتن که او

باید انجام دهد تمرکز کنید.

- با حالتی خوب و با کلمات ساده و واضح به کودک خود بگویید چه کاری انجام دهد. برای تقویت رفتار مثبت، در صورت مشاهده تلاش‌ها و موفقیت‌های او، دقیقاً پس از انجام آن کار در مورد اینکه چه کاری را درست انجام داده است، او را تحسین کنید و به زبان ساده بگویید که چه کارهایی را اشتباه انجام داده است. اگر کودک تان ناراحت شده است، توجهش را به یک اسباب بازی یا فعالیت دیگری جلب کنید.
- به او اسباب بازی‌های سفتی بدهید که بتواند قطعاتش را از هم جدا و به هم متصل کند و آنها را بسازد. اسباب بازی‌هایی با قطعات کوچک و تیز ندهید.
- در صورت امکان به او انتخاب‌هایی بدهید، مثلاً دوست داری



اسباب بازی را در سبد بگذاری یا در جعبه؟

- کودک شما با کلماتی که برای احساسات او به کار می‌برید به خوبی پرورش خواهد یافت.
- کلاس‌های فرزند پروری به شما کمک می‌کند رفتار کودک تان را درک کنید و به شما آموزش می‌دهد چه کاری انجام دهید.

تغذیه کودک

- هر چقدر میل دارد او را با شیر خود تغذیه کنید. برخلاف سال اول زندگی، در کودکان ۱ تا ۲ ساله تغذیه با شیرمادر بهتر است نیم تا ۱ ساعت پس از صرف غذای کودک انجام شود و در حقیقت تغذیه از سفره خانوار بر تغذیه با شیرمادر اولویت دارد.

۷

- کودک شما هر روز به حداقل ۸۰۰ میلی گرم کلسیم و ۴۰۰ واحد ویتامین د نیاز دارد. شیر منبع اصلی کلسیم و ویتامین د است. شیر و لبنیات غیر پاستوریزه به او ندهید.
- قطره‌های ویتامین آ+د و آهن را بطور مرتب و روزانه طبق مقدار مورد نیاز به کودکتان بدهید. (این مطلب که قطره آهن موجب سیاهی دندان می شود نباید مانع مصرف آن شود، بلکه باید قطره آهن را با قاشق چایخوری در عقب دهان ریخت و پس از آن به کودک آب داد و با پارچه ای تمیز روی دندان های او را نیز تمیز نمود.)
- به کودک تان غذاهای متنوع سالم پیشنهاد بدهید. برای مطلع شدن از اینکه یک رژیم غذایی سالم دارد، در نظر بگیرید که در محدوده زمانی ۴ یا ۵ روزه میزان خوبی از غذاها را از همه گروه های غذایی می خورد. در برنامه غذایی او، تنوع غذایی و استفاده از مواد غذایی دارای ارزش تغذیه ای مناسب را در نظر بگیرید. از تمام گروه های اصلی غذایی (نان و غلات، شیر و لبنیات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغز دانه ها، سبزی ها و میوه ها) استفاده کنید. به عنوان مثال از انواع گوشت ها (گوشت قرمز، مرغ، ماهی)، تخم مرغ، حبوبات (عدس، ماش، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی، ...)، محصولات لبنی پاستوریزه (شیر، پنیر کم نمک، ماست، کشک کم نمک و دوغ کم نمک و بدون گاز)، سبزی های با برگ سبز یا زرد (جعفری، گشنیز، شوید، کدو، هویج و کدو حلوائی)، میوه ها (سیب، موز، هلو، آلو، گلابی، زردآلو، طالبی، خرما (بدون پوست و هسته)، آناناس، هندوانه، انبه، انواع مرکبات و ...)، غلات (برنج، نان، ماکارونی، رشته فرنگی) در برنامه غذایی کودک استفاده کنید.
- هر روز ۳ تا ۴ وعده و در هر وعده به اندازه سه چهارم لیوان، به کودکتان غذا بدهید. انتخاب های مغذی ارائه دهید و به بخش های کوچکی تقسیم کنید. کودکان معمولا غذاهای مختلف با اشکال و مزه های متفاوت را در وعده های غذایی شان دوست دارند.

- هر روز ۱-۲ بار میان وعده مغذی (از گروه های اصلی غذایی) در بین وعده های غذایی اصلی، ۱٫۵ تا ۲ ساعت قبل از آن به کودک بدهید. به عنوان مثال از انواع میوه ها، سبزی ها، شیر پاستوریزه، ماست، نان، پنیر کم نمک و خرما استفاده کنید. تنقلات بی ارزش نظیر غلات حجیم شده، شکلات، چیپس، آب میوه های تجاری و نظایر آنها به کودک ندهید. شیرینی و غذاهای فوری را محدود کنید. از دادن انواع نوشیدنی های شیرین به دلیل افزایش خطر اضافه وزن و چاقی، پوسیدگی دندان و کاهش دریافت مواد مغذی تا حد امکان خودداری کنید.
- زمان های مشخصی برای وعده های غذایی و میان وعده ها تنظیم کنید. بخش های کوچکی از غذا سرو کنید، اگر لازم شد بیشتر به او غذا بدهید. علائق غذایی کودک شما ممکن است تغییر کند. غذاهایی جدید در کنار غذاهایی که دوست دارد، قرار دهید. او را تشویق کنید که غذا جدید را لمس کند، بو کند، لیس بزند یا بجشد.
- در برنامه غذایی کودک فقط از ماست پاستوریزه ساده استفاده کنید و از مصرف انواع ماست میوه های صنعتی خودداری کنید. در صورت تهیه ماست میوه خانگی فقط میوه به ماست اضافه کنید و شکر اضافه نکنید.
- اگر برنج به صورت کته یا کاملا نرم شده نیست آن را با پشته قاشق و کمی آب خورش نرم و له کنید.
- مغزها، آب نبات، هویج خام، انگور و ذرت را به دلیل احتمال خفگی به کودکان ندهید. (از مغزها می توانید به صورت پودر شده برای مقوی کردن غذای کودک استفاده کنید).
- تخم مرغ را کاملا پخته به کودکان بدهید و تخم مرغ خام یا خوب پخته نشده به او ندهید.
- آب آشامیدنی بهترین نوشیدنی برای رفع تشنگی کودک است. کودک باید روزانه دو فنجان آب بنوشد. اگر کودک تان تشنه است او را به خوردن آب تشویق کنید.
- آبمیوه طبیعی را می توان ۱۲۰ سی سی در روز به او بدهید. بهتر است به جای آبمیوه، میوه تازه بدهید.

• از تغذیه کردن پی در پی کودک خودداری کنید. کودکان را مجبور به خوردن نکنید. این کار باعث می شود از خوردن غذا خودداری کند یا کمتر بخورد. کودک شما خودش باید تصمیم بگیرد چه مقدار غذا می خواهد. موقع غذا خوردن کشمکش نداشته باشید. برایش از غذاهایی که خودتان می خورید، انتخاب کنید. غذا خوردن کودک همراه با حواس پرت کردن، نباشد. از غذا به عنوان جایزه یا وسیله ای برای تشویق یا تنبیه استفاده نکنید. در هنگام غذا خوردن، تلویزیون خاموش باشد.

• به کودک تان بیاموزید دست و صورت خود را بشوید و تأکید کنید این کار قبل از غذا خوردن ضروری است. ظرف غذای او مجزا باشد. نکات بهداشتی در مراحل آماده سازی، تهیه و طبخ غذا را رعایت کنید.

• از نمک پید دار تصفیه شده در پخت غذا استفاده کنید.

• از بشقاب، قاشق و چنگال نشکن استفاده کنید.

• اطمینان حاصل کنید هر کسی که از کودک شما نگهداری می کند غذاهای سالمی به او می دهد و از دادن شیرینی به او خودداری می کند.

ایمنی کودک

• کودک شما متوجه خطر نمی شود. او کلمه «نه» را به خاطر نمی سپارد. از او در مقابل خطر یا رفتار منفی محافظت کنید.

• هرگاه کودک تان سوار خودرو می شود، از صندلی مناسب برای قد و وزن او استفاده کنید.

• از کودک خود در مقابل خطراتی چون افتادن، سوختن، غرق شدن، خفه شدن و دیگر حوادث محافظت کنید.

- تمامی داروها، مواد شوینده و سم‌ها را دور از دسترس او قرار دهید. آن‌ها را در محفظه ای قفل شده نگه دارید.
- شماره تلفن اورژانس ۱۱۵ را به خاطر بسپارید یا در دسترس خود در کنار تلفن نگه دارید.
- کودکان را حتی برای یک لحظه در خانه یا ماشین تنها نگذارید.
- بالا و پایین پله‌ها در ورودی بگذارید و برای پنجره‌ها حفاظ بگذارید.
- مبلمان را از پنجره‌ها دور نگه دارید.
- وقتی کودک تان روی پله‌ها است با دقت مراقب او باشید.
- وقتی با ماشین دنده عقب از پارکینگ بیرون می‌آیید یا در جلوی خانه رانندگی می‌کنید، از یک فرد بزرگسال بخواهید کودک تان را در محل امن و با فاصله نگه دارد، خطر زیر گرفتن او را جدی بگیرید.
- هرگز در خانه اسلحه نداشته باشید. اگر مجبور هستید اسلحه داشته باشید، آنرا خالی و قفل با مهماتی که قفل شده و جدا از اسلحه قرار داده شده، نگه دارید.
- از سوختگی کودک تان با دور نگه داشتن مایعات داغ، کبریت، فندک و همچنین دور نگه داشتن بخاری از او، جلوگیری کنید.

مراقبت‌های دیگر

خواب

- برنامه خواب کودک شما ممکن است از اصلاً نخوابیدن تا دو بار خوابیدن در روز تغییر کند. اگر کودک تان نمی‌خوابد، زمان آرامی را برای او فراهم کنید. از این زمان برای استراحت خودتان هم استفاده کنید.
- کودک شما ممکن است از تاریکی بترسد. استفاده از چراغ خواب یا باز گذاشتن در اتاق خواب ممکن است به از بین بردن ترس او کمک کند.

نکات کلیدی مراقبت ۱۸ ماهگی

- فعالیت‌های آرامی را قبل از خواب انجام دهید. داشتن یک زمان خواب ثابت بسیار خوب است.
- به جریان منظم و عادی شبانه خود مانند حمام کردن، مسواک زدن و کتاب خواندن ادامه دهید.

واکسیناسیون

- کودک شما برای کنترل و پیشگیری از بیماری باید به مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه سلامت / خانه بهداشت مراجعه کند.
- در ۱۸ ماهگی کودک شما نیاز به واکسن‌های سه گانه، فلج اطفال خوراکی و MMR (سرخک، سرخچه و اوربون) دارد.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۲ سالگی است

در مراقبت ۲ سالگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پایش رشد
- ارزیابی دهان و دندان
- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک
- مکمل ویتامین آ + د و آهن
- عوامل محیطی موثر بر سلامت
- راهنمایی‌هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.
- ارزیابی تغذیه
- غربالگری تکامل با کمک پرسشنامه استاندارد
- راهنمایی‌هایی برای ارتقای تکامل کودک
- غربالگری تکامل
- فعالیت بدنی



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

0491 623 00125-1



978-623-00125-1



978-623-00125-1

به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور: نکات کلیدی مراقبت ۱۵ ماهگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان .
 مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری:
 ۱۲ص: مصور (رنگی)؛ ۱۵ × ۱۵ س. م.
 شابک: دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۶ : ۶-۳۳-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی: فیبا
 موضوع: نوزاد - مراقبت - Care - Infants
 موضوع: نوزاد - تغذیه - Nutrition - Infants
 موضوع: نوزاد - رشد - Development - Infants
 رده بندی کنگره: RJ۶۱
 رده بندی دیویی: ۱۲۲/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۸۸۱۴



نکات کلیدی مراقبت ۱۵ ماهگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۶-۳۳-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۴ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۶ تغذیه کودک
- ۷ ایمنی کودک
- ۹ مراقبت های دیگر
- ۹ خواب
- ۹ مراقبت از دهان و دندان
- ۹ آموزش توالت رفتن
- ۱۰ تماشای تلویزیون
- ۱۰ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۱۸ ماهگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه‌های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. به‌هوزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی‌ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می‌دهند. در سن ۱۵ ماهگی لازم است کودک مورد پایش قرار گیرد. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۱۵ ماهه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت‌طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت‌هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی شنوایی

- راهنمایی هایی برای تغذیه
- مکمل های (آهن و ویتامین آ + د)

نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند:



- با کودکان تماس چشمی برقرار کنید، سعی کنید اشارات او را درک کرده و پاسخ مناسب بدهید.
- سعی کنید او را بخندانید.
- به کودکان نشان دهید که چگونه از کلمات استفاده کند.
- از لغات برای تعریف احساسات او استفاده کنید.
- ژست های کودکان را با لغات تعریف کنید.
- از عبارات ساده و روشن برای صحبت با او استفاده کنید.
- اغلب برایش کتاب بخوانید. هنگام خواندن کتاب از کلمات ساده برای توضیح عکس ها استفاده کنید.
- کودکان را اغلب بغل کنید، نوازش کنید و ببوسید. او در حال مستقل شدن است، نیاز دارد که بداند شما دوستش دارید و حمایتش می کنید.
- سعی کنید به کودکان گزینه هایی برای انتخاب بدهید. از او پرسید « دوست داری لباس

سبزپوشی یا قرمز؟» به او اجازه دهید که بین دو گزینه خوب مثل موز و سیب، یا بین دو کتاب مورد علاقه یکی را انتخاب کند.

• کودک شما ممکن است اطراف آدم‌های جدید احساس اضطراب کند این کاملاً طبیعی است او را آرام کنید.

• بد خلقی‌های کودک را کم کنید. اگر می‌توانید حواسش را پرت کنید. رفتارهای مثبت را به او آموزش بدهید و تشویق کنید.

• هیچگاه به فرزندتان از نظر فیزیکی و احساسی آسیب نزنید. اگر کنترل خودتان را از دست دادید، چند نفس عمیق بکشید او را در یک جای امن قرار دهید و برای چند لحظه به اتاق دیگر بروید. اگر امکانش هست از کس دیگری بخواهید که از کودک شما مراقبت کند بطوری که شما بتوانید کمی استراحت کنید.

می‌توانید به یک دوست زنگ بزنید.

• قوانینی را برای تربیت، آموزش و محافظت از او

وضع کنید، تنبیه نکنید. قوانین روشن و واضح وضع کنید و در اجرای آن‌ها ثابت قدم باشید.

• با امن کردن فضای خانه و حیاط، استفاده

از جمله «نه اینکار رو انجام نده» را به حداقل برسانید.



- کودکان را به خاطر انجام کارهای خوب تشویق کنید.
- در مورد شلخته غذا خوردن و ریختن و پاش کردن به هنگام بازی کردن کودکان صبور باشید، فرزند شما در حال یادگیری است.
- به کودکان تقسیم کردن را آموزش بدهید (تقسیم کردن غذا، اسباب بازی....). فقط بدانید که او ممکن است در این سن برای این کار آماده نباشد.

تغذیه کودک

- کودک شما می تواند غذای سفره بخورد و همچنین هر بار کل شیرش را بنوشد.
- غذاهای سالم و مغذی به او بدهید. غذاهایی که به راحتی قابل جویدن باشد.
- کودک شما بعضی از غذاها را نسبت به بقیه ترجیح می دهد. نگران نباشید این مساله تغییر می کند.
- به کودکان برای غذا خوردن قاشق بدهید او برای استفاده از آن نیاز به تمرین دارد.
- از دادن غذاهای سفت و کوچک مثل ذرت بو داده، آجیل، هات داگ و هویج که می توانند خفگی ایجاد کنند اجتناب کنید.
- به کودک خود ۳-۴ وعده غذای خانواده و ۱-۲ بار میان وعده مغذی و سبک متناسب با سنش مثل میوه های نرم، ماست و پنیر بدهید.
- کودک شما حداقل روزی ۸۰۰ میلی گرم کلسیم و ۴۰۰ واحد مکمل ویتامین D نیاز دارد.
- شیریک منبع غنی کلسیم و ویتامین D است.

ایمنی کودک

۷

- یک صندلی تایید شده و استاندارد مخصوص وسیله نقلیه متناسب با وزن و قد کودک خود تهیه کنید. برای سوار شدن کودک شما در وسیله نقلیه حتما باید از این صندلی استفاده شود.
- بی خطرترین روش سوار شدن برای کودک شما سوار شدن روی صندلی ایمنی کودک رو به عقب است که به صورت مناسب روی صندلی عقب خودرو نصب شده باشد. توصیه اکید است که تا سن ۲ سالگی یا تا زمانی که کودکان از نظر وزن و قد به اندازه استاندارد که کارخانجات سازنده صندلی های اتومبیل برسد کودکان در صندلی به سمت عقب خودرو نشانداده شود.

وضعیت رو به جلو



وضعیت رو به عقب



- هیچگاه صندلی کودک را روی صندلی جلوی اتومبیلی که به کیسه هوا مجهز است قرار ندهید. صندلی عقب امن ترین جا برای فرزند شماست.

- تشک مخصوص تختخواب کودک را در پایین ترین ارتفاعش تنظیم کنید. زمانی که کودک شروع به بالا رفتن از تختخواب می کند. زمان آن است که کودکتان را به جای تختخواب کودک در تختخواب مخصوص کودک نوپا بخواهانیید.
- کلیه داروها، پودرهای تمیزکننده را دور از دسترس کودک نگه دارید. همیشه در ظرف های حاوی مواد سمی، داروها و مواد پاک کننده را بسته نگاه دارید.
- از دستگیره های ایمنی روی کسوها و کابینت ها استفاده کنید. پریزها را با درپوش پلاستیکی بپوشانید.

- کودکتان را از چیزهایی مثل دسته ماهیتابه (روی گاز)، لوازم برقی کوچک مثل آسیاب برقی، چرخ گوشت و...، شومینه و سایر گرما دهنده ها مثل بخاری، شوفاژ و... دور نگاه دارید.
- چیزهایی مثل سیگار، کبریت، فندک و الکل را در جایگاه های قفل شده نگاه دارید.
- هرگز کودکتان را تنها در حمام یا نزدیک آب رها نکنید.



مراقبت های دیگر

خواب

- یک ساعت قبل از خواب را به نوازش، محبت کردن و آرام کردن کودکتان اختصاص دهید.
- یک برنامه منظم و ساده برای زمان خواب شبانه کودکتان داشته باشید که شامل حمام کردن، مسواک زدن دندان ها و خواندن کتاب برای او باشد.
- کودکتان را مثل هر شب یا کمی زودتر به رختخواب ببرید.
- اگر کودکتان خواب آلود است ولی هنوز به خواب نرفته رختخوابش را همانجا بیاورید و بگذارید همانجا بخوابد
- اگر کودکتان شب هنگام از خواب بیدار شد به او توجه نشان ندهید. از کلماتی استفاده کنید که به او اطمینان بدهد و آرام شود. به او یک پتوی نازک یا یک اسباب بازی بدهید که نگه دارد.
- کودکتان در این سن باید حتما یک خواب روزانه داشته باشد، طوری زمان آن را تنظیم کنید که کاملا خسته باشد و راحت بخواب برود.

مراقبت از دهان و دندان

- استفاده از بطری پوسیدگی دندان را افزایش می دهد. اگر کودکتان تاکنون از بطری استفاده می کرده در این سن حتما از فنجان برای نوشیدن شیر استفاده کند، تا از دندان های او محافظت شود.

- روزی ۱ یا ۲ بار دندان های کودکتان را با مسواک نرم به روش افقی مسواک کنید. نیازی به استفاده از خمیر دندان نیست. اگر از خمیر دندان استفاده می کنید به مقدار خیلی کم باشد.
- اگر تا به حال کودکتان را برای اولین ویزیت دندانپزشکی نزد دندانپزشک نبرده اید، اینکار را انجام دهید.
- دندان های خود را مسواک بزنید و با کودکتان از فنجان و قاشق مشترک استفاده نکنید، به هیچ وجه پستانک کودکتان را با دهان خود تمیز نکنید.

آموزش توالیت رفتن

- این سن برای آموزش توالیت رفتن کمی زود است. شما می توانید یک صندلی مخصوص توالیت کودکان در دستشویی بگذارید. در این سن کودک به این صندلی به چشم یک اسباب بازی نگاه می کند.

تماشای تلویزیون

نگاه کردن تلویزیون برای کودکان زیر ۲ سال توصیه نمی شود.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۱۸ ماهگی است

- در مراقبت ۱۸ ماهگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:
- پایش رشد

- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی تکامل
- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی‌هایی برای ارتقای تکامل کودک
- مکمل‌های (آهن و ویتامین آ + د)
- دریافت واکسن‌های سه‌گانه، فلج اطفال خوراکی، MMR
- در صورت نیاز برخی موارد دیگر نیز بررسی خواهد شد.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

ISBN 978-964-12-125-1-1



ISBN 978-964-12-125-1-1





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سازمان جمعیت، خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت ۲ سالگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور: نکات کلیدی مراقبت ۲ سالگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان. مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری: ۲۴ص: مصور (رنگی): ۱۵ × ۱۵ س.م. شابک: دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۰-۳۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸ وضعیت فهرست نویسی: فیبا موضوع: کودکان - مراقبت Child care موضوع: کودکان - سلامتی و بهداشت Children - Health and hygiene موضوع: کودکان - تغذیه Children - Nutrition رده بندی کنگره: RJ۱۰۱ رده بندی دیویی: ۱/۶۴۹ شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۷۵۹۱



نکات کلیدی مراقبت ۲ سالگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
ناشر: اندیشه ماندگار
نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۳۵-۰-۳۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۵-۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۴	حمایت خانواده
۵	رشد و تکامل کودک
۶	نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
۱۰	تغذیه کودک
۱۵	ایمنی کودک
۱۷	فعالیت فیزیکی
۱۹	مراقبت های دیگر
۱۹	خواب
۲۰	مراقبت از دندان
۲۰	آموزش دستشویی رفتن
۲۱	تماشای تلویزیون
۲۱	واکسیناسیون
۲۲	زمان مراقبت بعدی کودک شما ۲/۵ سالگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه‌اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه‌های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. به‌روزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی‌ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می‌دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۲ ساله ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت‌هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- مکمل (ویتامین آ+ د و آهن)



- ارزیابی سلامت دهان و دندان
- غربالگری تکامل (برای غربالگری تکامل کودک در این سن پرسشنامه استاندارد داده خواهد شد، آن را با دقت تکمیل کنید و طی ۱-۲ هفته برای بررسی به مراقب سلامت / بهورز تحویل دهید)
- * راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- * راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- * راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث کودکان

حمایت خانواده

- برای با هم بودن خانواده وقت بگذارید.
- زمانی را به همراه خانواده به ورزش و فعالیت اختصاص دهید و با کودک خود در این مورد صحبت کنید.
- زمان زیادی را به بازی با کودک اختصاص دهید. بازی گروهی داشته باشید.
- برای هر فرزند خود جداگانه وقت بگذارید.

- بازی‌های پر جنب و جوش را به جای دیدن تلویزیون انتخاب کنید. شدیداً توصیه می‌شود کودکان زیر ۲ سال تلویزیون تماشا نکنند.
- فعالیت‌هایی مثل تمیز کردن و مرتب کردن اسباب بازی‌ها را به عنوان بازی انتخاب کنید تا کودکان این کارها را به عنوان بازی انجام دهد.
- با هم کتاب خواندن را جدی بگیرید، برای قبل از خواب سرگرمی بسیار خوبی است.
- به استراحت‌های کوتاه ادامه دهید. اطمینان حاصل کنید که مراقب خودتان هستید.

رشد و تکامل کودک

در این سن کودک شما:

- از عبارت‌های ۲ کلمه‌ای استفاده می‌کند (مثلاً شیر می‌خورم)
- کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک، تلفن یا قاشق و چنگال را می‌داند.
- می‌تواند کارها یا کلمات را تقلید کند.
- قادر به انجام دستورات ساده است.
- درست راه می‌رود (استوار یا مستقل راه می‌رود).
- در صورتی که کودک شما هر یک از این موارد





را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۲۴ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز/ مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

نکاتی که به تکامل فرزندان کمک می‌کند:

- با کودکان تماس چشمی برقرار کنید، سعی کنید اشارات او را درک کرده و پاسخ مناسب بدهید.
- سعی کنید او را بخندانید.
- به کودک خود کمک کنید تا اشیا را بشمارد، نام ببرد و مقایسه کند.
- برای او اسباب بازی های ساده بسازید.
- اشیایی با رنگ ها و شکل های متفاوت برای دسته بندی به او بدهید.
- اشیای مشابه را با برچسب مشخص کند.
- پازل درست کند.
- او را تشویق کنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهید.



۷

- به کودکان داستان، آواز و بازی یاد بدهید.
- در مورد تصاویر کتاب‌ها با او صحبت کنید.
- کودکان از داستان‌های کوتاه، ریتم دار و آهنگ دار لذت می‌برند.
- کودک شما ممکن است بارها و بارها عاشق شنیدن یک داستان تکراری باشد.
- از او بخواهید چیزهایی که شما برایش می‌خوانید را با انگشت نشان دهد.
- خواندن داستان را متوقف کنید و به او اجازه دهید صدای یک حیوان را تقلید کند یا یک قسمت داستان را تمام کند.
- تلاش کودکان را در یادگیری مهارت‌های جدید تحسین کنید.
- هر روز با کودکان بازی کنید، در کارهایی که کودکان علاقه دارد انجام دهد به او ملحق شوید. بازی کردن تفریح است. بسیاری از آموزش‌ها را می‌توانید از طریق بازی کردن به کودک ارائه دهید.
- با بازی «به دنبال فرمانده» یا بازی‌های مشابه، به کودکان دنبال کردن راهنمایی‌های ساده را بیاموزید.

- یک کودک دو ساله لذت زیادی از بازی‌های کثیف می‌برد و چیزهای زیادی از مخلوط کردن، الک کردن، ریختن، هم زدن و شکل دادن شن، گل و خاک یاد می‌گیرد. نگران کثیف کردن لباسش نباشید و به او اجازه دهید این بازی‌ها را انجام دهد.
- به کودکان لغت‌هایی را بیاموزید که بتواند با آن‌ها احساساتش را بیان کند. کودک شما لغت‌هایی را که شنیده است تکرار می‌کند.
- کودکان را تشویق کنید که در مورد اتفاقات زندگی‌شان صحبت کنند.
- با کودکان با جملات کوتاه صحبت کنید.
- فرصت‌هایی در اختیار او قرار دهید که مهره‌های بزرگ را به نخ بکشد، این مهره‌ها به اندازه کافی بزرگ باشند تا خطر خفگی برای کودک وجود نداشته باشد.
- روی کتاب خواندن با یکدیگر تمرکز کنید که پراز تفریح و سرگرمی است و می‌تواند با زمان خواب روزانه همراه شود. هر روز برای او کتاب بخوانید.
- در مورد تصاویر کتاب‌ها و همین‌طور در مورد چیزهایی که با یکدیگر می‌بینید و می‌شنوید با کودکان صحبت کنید و آنها را برای او توصیف کنید.
- آرام صحبت کنید و به یاد داشته باشید که ممکن





- است زمانی طول بکشد تا کودک شما پاسخ دهد.
- بهترین راه کمک به یادگیری صحبت در کودکان نوپا هنگام مامان بازی است، البته وقتی که به دلخواه کودک این بازی انجام شود.
- کودکان علاقه بیشتری به سایر کودکان نشان می دهد و به زودی در بازی های ساده با سایر کودکان همراه می شود.
- کودک شما بسیار مالکیت خواه است. بسیار معمول است که اسباب بازی را به کودکان دیگر داده و بعد از آنها بخواهد که آن را پس بدهند.
- کودکان دوساله کج خلقی های مکرری دارند که نتیجه قادر نبودن به بیان نیازها و افکارشان است.
- با صحبت کردن در مورد افراد آشنا و فامیل روابط را در زندگی کودکان تقویت کنید.
- به کودکان گوش کنید و با او با احترام برخورد کنید. از دیگران نیز همین رفتار را بخواهید.

- اگر کودک به طور مداوم راهنمایی بشود که از قوانین ساده پیروی کند احتمال این که درک کند و از این قوانین پیروی کند زیاد است.
- در مورد آنچه که فرزندتان به درستی انجام داد برای تقویت رفتار مثبت او، بلافاصله بعد از انجام آن فعالیت، تلاش‌ها و موفقیت‌های او را تحسین کنید.
- در این سن مراقبین سلامت / بهورزان پرسشنامه بررسی وضعیت تکامل کودک را به شما خواهند داد، فعالیت‌های پرسشنامه را طی ۱-۲ هفته با حضور همسران با کودک انجام دهید و نتیجه را ثبت نمایید و سپس پرسشنامه تکمیل شده را برای بررسی به مراقب سلامت / بهورز تحویل دهید.

تغذیه کودک

- از غذاهای متنوع خانواده شامل گروه‌های اصلی غذایی به کودک بدهید.
- برای تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز، برنامه غذایی کودکان باید شامل ترکیبی از غذاهای مختلف متشکل از گروه‌های اصلی غذایی باشد. گروه‌های اصلی غذایی برای این سن عبارتند از:



۱۱ * گروه نان و غلات (شامل نان، برنج، انواع ماکارونی و رشته‌ها) که تامین کننده انرژی، ویتامین‌های گروه ب، آهن، فیبر و پروتئین مورد نیاز کودک است و بیشترین سهم غذای روزانه کودک را باید به خود اختصاص دهد.



* گروه سبزی‌ها و گروه میوه‌ها که تامین کننده ویتامین‌ها، املاح و فیبر مورد نیاز کودک است نقش مهمی در افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها دارد. در برنامه غذایی روزانه کودک از میوه‌های زرد و سبزی‌های برگ سبز تیره گنجانده شود.

* گروه شیر و لبنیات (شامل شیر، ماست، پنیر، کشک و دوغ) که تامین کننده

کلسیم، فسفر، پروتئین، ویتامین‌های گروه ب و ویتامین‌های آ است.

* گروه گوشت و جانشین‌ها (شامل انواع گوشت‌ها، تخم مرغ، حبوبات و مغزها) که تامین کننده پروتئین، آهن و روی مورد نیاز کودک است.

• از سبزی‌های سبز تیره و نارنجی و میوه‌های زرد و نارنجی (هویج، کدو حلوايي،

جعفری، گشنیز، اسفناج، انبه، زردآلو، مرکبات) که منابع غذایی ویتامین آ و سی هستند در برنامه غذایی کودک استفاده شود.

- در هر روز ۳ وعده غذا و در هر وعده به اندازه یک لیوان کامل به کودک غذا بدهید.
- هر روز ۲ بار میان وعده مغذی (از گروه های اصلی غذایی) در بین وعده های اصلی غذا، به کودک بدهید.

- شیر پاستوریزه، ماست، میوه ها، سبزی ها، نان و پنیر کم نمک، نان و پنیر و خیار،

نان و نصف تخم مرغ پخته شده، نان با دو عدد خرما

و میوه های خشک انتخاب های بسیار خوبی برای

میان وعده غذایی کودکان هستند. مصرف برخی میان

وعده ها، مانند چیپس، پفک، غلات حجیم شده و به

طور کلی تنقلات بی ارزش علاوه بر تغییر ذائقه کودک

و افزایش احتمال ابتلای او به بیماری های غیرواگیر

در سنین بزرگسالی مانند چاقی، با تأثیر بر اشتهای

کودک و در نهایت تمایل کمتر او به وعده های اصلی

می توانند بر سرعت رشد کودک و به خصوص بر افزایش مطلوب قد تأثیر منفی داشته

باشند.



- از دادن انواع نوشیدنی‌های شیرین به دلیل افزایش خطر اضافه وزن و چاقی، پوسیدگی دندان و کاهش دریافت مواد مغذی تا حد امکان خودداری شود.
- میان وعده را ۱٫۵ تا ۲ ساعت قبل از وعده اصلی به کودک بدهید.
- مصرف آب میوه طبیعی بیشتر از ۱۲۰ سی سی در روز نباشد. بهتر است از میوه تازه استفاده کنید. کودک را به مصرف آب آشامیدنی در طول روز تشویق کنید.
- به کودک در ظرف‌ها و کاسه‌های جدا غذا بدهید.
- در طول مدت غذا خوردن با کودکان بنشینید و با او صحبت کنید، به چشمان او نگاه کنید و او را ترغیب به غذا خوردن کنید.
- غذا خوردن کودک همراه با حواس پرت کردن، تشویق و تنبیه نباشد. در هنگام غذا خوردن کودک، تلویزیون خاموش باشد.
- مراتبی از انتخاب در اختیار کودکان قرار دهید مثلاً بین دو غذای مختلف سالم بتواند یکی را انتخاب کند. با این کار به او اجازه تصمیم‌گیری بدهید. به جای تهیه کردن غذاهای جداگانه برای فرزندتان، به او اجازه دهید که به همراه شما غذا بخورد و به او سه تا چهار انتخاب خوب



که در برگیرنده غذای دلخواه او است پیشنهاد دهید. اجازه دهید کودک تان ببیند که شما انتخاب‌های مختلف سالمی فراهم کرده‌اید.

- از غذا به عنوان جایزه یا تنبیه استفاده نکنید.

- اجازه دهید کودک تان خودش غذا بخورد. ممکن است کثیف‌کاری کند، اما این یک قدم دیگر به سمت مستقل شدن است.



- به خاطر داشته باشید که معده کودک شما هنوز بسیار کوچک است و بهتر است به او مقادیر کوچکی از غذا بدهید. اگر هنوز گرسنه است می‌توانید غذاهای سالم بیشتری به او بدهید.

- کودک شما هر روز به حداقل ۸۰۰ میلی گرم کلسیم و ۴۰۰ واحد ویتامین د نیاز دارد. شیر منبع اصلی کلسیم و ویتامین د است.

- اگر کودک تان تشنه است او را تشویق کنید آب بنوشد. برای تشویق او به نوشیدن آب می‌توانید به او اجازه دهید خودش فنجانش را از شیر آب پر کند. یا قطعاتی از میوه برای تغییر مزه و ظاهر آب به آن اضافه کنید.

- بهترین روش از شیر گرفتن کودک، تدریجی است که همراه با عشق و علاقه و در طی چند ماه اتفاق افتد که می‌توان به تدریج ۲-۱ وعده شیر پاستوریزه را جایگزین شیر مادر نمود که با لیوان یا فنجان به شیرخوار داده شود.
- هر ۲-۳ روز یکبار، نباید بیش از یک وعده شیردهی را حذف کرد.
- ابتدا وعده‌های شیر قبل از ظهر و بعد از ظهر را کم کنید، سپس شیر عصر و غروب و در مرحله آخر شیردهی به کودک طی شب را حذف کنید.

ایمنی کودک

- اطمینان حاصل کنید که صندلی ایمنی کودکان به درستی در صندلی عقب خودرو نصب شده است.
- تمام کودکان دو ساله یا بزرگتر، یا آن‌هایی که کمتر از دو سال سن دارند و نسبت به صندلی رو به عقب خود اضافه وزن یا ارتفاع دارند، باید از یک صندلی ایمنی رو به جلو به همراه یک قلاب با حدکثر طول ممکن و تحمل حداکثر وزن و ارتفاعی که توسط سازنده صندلی مجاز شمرده شده است، استفاده کنند.
- همه باید در اتومبیل از کمربند ایمنی استفاده کنند. تا زمانی که همه کمربندشان را بسته‌اند اتومبیل را روشن نکنید.

- هیچگاه کودکان را در حیاط یا خانه تان مخصوصاً نزدیک اتومبیل بدون اینکه یک بزرگسال بالغ را مسئول مراقبت از او کنید، تنها نگذارید.



- هنگام خارج شدن از پارکینگ یا رانندگی در جاده کنار خانه، کسی را مسئول کنید کودکان را در یک فاصله امن نگاه دارد طوری که نتواند جلوی اتومبیل بدود.

- کودکان را از اتومبیل‌های در حال حرکت،

خیابان‌ها، درهای پارکینگ متحرک و راه‌های کنار خانه‌ها دور نگاه دارید.

- از کودک تان در برابر خطراتی چون افتادن، سوختن، غرق شدن، خفه شدن و حوادث دیگر محافظت کنید.

- تمام داروها، شوینده‌ها و سم‌ها را دور از دسترس او قرار دهید. هرگونه سمی را در قفسه قرار دهید و قفسه را قفل کنید.

- کودک خود را حتی یک دقیقه در ماشین یا خانه تنها نگذارید.

- اجازه ندهید کودک تان با کیسه‌های پلاستیکی یا بادکنک‌های لاستیکی بازی کند.

- صندلی ها را طوری کنار میز قرار دهید که کودک تان نتواند از آن ها بالا برود.
- هرگاه کودک تان در خارج از خانه بازی می کند، به دقت مراقب او باشید. مکان امنی برای بازی او فراهم کنید.
- همیشه وقتی کودک تان نزدیک آب است مراقب او باشید، شنا بلد بودن دلیل امنیت داشتن او در آب نیست.
- اجازه ندهید کودک تان در حال غذا خوردن بدود.
- به کودک تان اسباب بازی های ایمن بدهید. اجازه ندهید با اسباب بازی هایی که قسمت های تیز و کوچک دارند، بازی کند.



فعالیت فیزیکی

- زمان تماشای تلویزیون، ویدیو و بازی های ویدیویی را به یک تا دو ساعت در روز محدود کنید
- یادتان باشد که در «اوقات خاص» کودکان را اجبار به بازی های نشسته یا غذا خوردن نکنید.
- از چیزهایی غیر از خوراکی و تنقلات و وقت

تلویزیون به عنوان جایزه استفاده کنید.

- به عنوان اعضای یک خانواده، فعال باشید. اطمینان حاصل کنید که کودکان فرصت فعال بودن در خانه را دارد و تشویق می شود که در خانه یا مهد کودک فعال باشد. بسیار مهم است که وقتی برای او هر روز اختصاص دهید که فعال باشد. پیشنهادهایی برای فعال بودن:

* بالا و پایین بپرید.

* قایم موشک بازی کنید.

* دست کودکان را بگیرید و حلقه تشکیل دهید.

* توپ بازی کنید (ضربه زدن و غلطاندن توپ)

* رفتار حیوانات را تقلید کنید.

* بازی «به دنبال فرمانده» انجام دهید.

- کودک شما هر روز حداقل به یک ساعت بازی همراه

با فعالیت بدنی نیاز دارد.

- فعالیت بدنی به ساخته شدن استخوان و ماهیچه

کمک می کند. احتمال ابتلا به بیماری هایی چون دیابت را کاهش می دهد. انعطاف

پذیری و عزت نفس او را افزایش می دهد.



- در طول انجام هرگونه فعالیت بدنی مراقب کودک خود باشید و بهتر است به او ملحق شوید.

مراقبت های دیگر

خواب



- در زمان به خواب رفتن ممکن است اتفاقات اطراف باعث کنجکاوای او شود و با خواب مبارزه کند.
- اگر کودک شما هراس های شبانه داشته باشد، ممکن است گریه کند، ترسیده به نظر برسد، گیج شود و اشک در چشمانش جمع شود. ممکن است پس از این حالت، ۱۵ دقیقه طول بکشد تا به خواب رود. سعی کنید کودک تان قبل از به خواب رفتن خیلی خسته نباشد. اجازه دهید در مورد کابوس هایش صحبت کند. با این کار به او احساس راحتی و اطمینان مجدد می دهید.
- عادت های معمول شبانه مانند دستشویی رفتن، مسواک زدن و کتاب خواندن را

ادامه دهید. این کار به او کمک می‌کند به فرآیند شب عادت کند.

مراقبت از دندان

- دندان‌های کودک خود را هر روز یک تا دو بار با مسواک نرم تمیز کنید. نیازی به استفاده از خمیردندان نیست. اگر می‌خواهید، از مقدار کمی خمیردندان استفاده کنید.
- ویزیت‌های منظم دندان پزشکی داشته باشید.

آموزش دستشویی رفتن

- بعضی از علامت‌هایی که نشان می‌دهد کودک‌تان برای این آموزش‌ها آماده هست به قرار زیر است:



- « خشک بودن پوشک برای ۲ ساعت
- « متوجه می‌شود که خشک است یا خودش را خیس کرده است.
- « می‌تواند شلوارش را بالا و پایین بکشد.

« دوست دارد یاد بگیرد.

« می تواند به شما بگوید که در حال رفتن برای دستشویی کردن است.

- برای زمان های دستشویی رفتنش برنامه ریزی کنید.
- به کودکان کمک کنید که بعد از دستشویی، عوض کردن کهنه و قبل از غذا خوردن دستش را بشوید.

تماشای تلویزیون

- به نفع کودکان نوپا است که بازی کنند تا اینکه تلویزیون تماشا کنند.
- با همدیگر تلویزیون تماشا کنید و در مورد چیزهایی که می بینید و فکر می کنید با هم بحث کنید. تماشای تلویزیون را به روزانه یک تا دو ساعت یا کمتر محدود کنید.
- مراقب برنامه ها و پیام های بازرگانی که کودک شما می بیند باشید.



واکسیناسیون

- احتمال دارد نیاز باشد در این سن کودک

واکسن آنفولانزا دریافت کند.

- در مورد دادن استامینوفن قبل یا بعد از دریافت واکسن با مراقب سلامت / بهورز کودک خود صحبت کنید.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۲/۵ سالگی است

در مراقبت ۲/۵ سالگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.



مركز الصحة والذات
للطفولة

172-777790

ISBN 978-9953-0-0000-0



ISBN 978-9953-0-0000-0

ISBN 978-9953-0-0000-0





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سخت بهداشت
دفتر معاونت سلامت خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت ۳۰ ماهگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی مراقبت ۳۰ ماهگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان .
 مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹ .
 مشخصات ظاهری : ۱۲ص: مصور؛ ۱۵ × ۱۵ س.م .
 شابک: دوره ۱- ۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸ ؛ ۷-۳۶-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 موضوع: کودکان - مراقبت Child care
 موضوع: کودکان - سلامتی و بهداشت Children - Health and hygiene
 رده بندی کنگره : RJ۱۰۱
 رده بندی دیویی : ۱/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۴۸۵۷۳



نکات کلیدی مراقبت ۳۰ ماهگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۷-۳۶-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

- ۳ مقدمه
- ۴ حمایت خانواده
- ۴ نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
- ۵ ایمنی کودک
- ۷ مراقبت های دیگر
- ۷ آموزش توالت رفتن
- ۹ زمان مراقبت بعدی کودک شما ۳ سالگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف از جمله ۳۰ ماهگی لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه بهداشتی / خانه بهداشت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه‌های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید مراقبین سلامت / بهورزان و پزشکان در برابر نگرانی‌ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می‌دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۲/۵ ساله ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات لازم در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت‌هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک



- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث

حمایت خانواده

- به عنوان یک خانواده، با هم فعالیت کنید.
- خانواده تان باید در مورد این که چطور بهترین را برای رشد کودک تان فراهم کنند، با هم توافق داشته باشند.
- تمام اعضای خانواده باید قوانین یکسان داشته باشند.
- از غذا خوردن باهم، به عنوان یک خانواده لذت ببرید.

نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند:

- هر روز با هم کتاب بخوانید. بلند کتاب خواندن به کودک تان کمک می کند تا برای مهدکودک آماده شود. کودک شما ممکن است چندین بار درخواست خواندن یک کتاب را داشته باشد.
- برای پاسخ دادن به سؤالات، به کودک تان وقت اضافی بدهید.
- با دقت به کودک تان گوش بدهید و چیزی را که گفته، با دستور زبان صحیح تکرار کنید.
- به کودک تان فرصت بازی با کودکان دیگر را بدهید. دو تا از محبوب ترین اسباب بازی هایش

را همراه داشته باشید یا دوستانی با اسباب بازی های مشابه پیدا کنید تا از دعوا جلوگیری شود.

• به کودک تان حق انتخاب بین دو چیز خوب در خوراکی ها، کتاب ها و اسباب بازی ها را بدهید.



• یک روال عادی روزانه را برای غذا خوردن، خوابیدن و بازی کردن دنبال کنید.

• از باغ وحش ها، موزه ها و مکان های دیگری که ممکن است به یادگیری کودک شما کمک کند، بازدید کنید.

• در مورد چیزی که کودک تان از تلویزیون تماشا می کند، اطلاع داشته باشید. کودکان بالای ۲ سال می توانند ۱ تا ۲ ساعت در روز تلویزیون تماشا کنند.

ایمنی کودک

• اطمینان حاصل کنید که صندلی ایمنی ماشین به طور صحیح بر صندلی خودرو نصب شده است.

- هرگز کودک تان را درون یا بیرون خانه، مخصوصاً نزدیک ماشین ها تنها نگذارید.
- زمان حضور کودک زیر نور خورشید را محدود کنید. قبل از این که کودک تان از خانه بیرون برود، برای او کلاه بگذارید و کرم ضد آفتاب بزنید.

• مطمئن شوید کودک تان وقتی در حال راندن سه چرخه است یا روی دوچرخه بزرگترها نشسته است، کلاه ایمنی استاندارد متناسب با سنش روی سرش بگذارد.



- در کنار آتش، مراقب کودک خود باشید. دور آتش باز، گودال آتش یا آتش اردو حصار بگذارید. کبریت ها را دور از چشم و دسترس کودک قرار دهید.
- در هر طبقه از خانه ردیاب دود نصب کنید و هر ماه آن را کنترل کنید.

- بهتر است از ردیاب های دودی استفاده کنید که دارای باتری با عمر طولانی هستند، اما اگر آن را ندارید، هر سال باتری را عوض کنید.
- در مواقع ضروری یک برنامه ریزی برای فرار از آتش داشته باشید.



۷

- هرگاه کودک تان نزدیک آب، شامل سطل ها، استخرهای بازی و دستشویی است، به طور مداوم مراقب او باشید.
- وقتی کودک تان در آب یا نزدیک آب است، یک بزرگتر باید حتما در تمام مدت به بازوی او دسترسی داشته باشد.
- سطل، استخر بازی و وان را بلافاصله پس از استفاده، خالی کنید.
- بررسی کنید که استخر از هر چهار طرف حصار و قفل داشته باشد و طوری باشند که به طور خودکار بسته شوند.

مراقبت های دیگر

آموزش توالت رفتن

- کودک شما ممکن است به یادگیری استفاده از صندلی توالت کودک علاقه نشان دهد. نشانه های آمادگی او شامل پوشک خشک، ناله کردن یا پیچ دان شکم بعد از غذا، آگاهی از زمان رفتن به توالت، تنها به سمت صندلی توالت رفتن و درآوردن لباس یا استفاده از کلماتی مانند پی پی یا پو باشد.

- در اکثر کودکان، علاقه به یادگیری توالت رفتن بین سن ۲ تا ۳ سالگی اتفاق می افتد.
- نشانه های آمادگی برای آموزش توالت رفتن شامل:
 - * خشک بودن پوشک برای ۲ ساعت
 - * آگاه بودن از اینکه پوشک او خیس یا خشک است.
 - * کودک خودش بتواند شلوارش را بالا و پایین بکشد.
 - * خودش بخواهد یاد بگیرد.



- * بتواند به شما بگوید که مدفوع دارد.
- کتاب هایی در مورد آموزش توالت رفتن، با کودک بخوانید.
- والد از جنس کودک او را به دستشویی ببرد.
- نشستن روی توالت اطفال یا توالت را حتی با لباس تحسین کنید.
- هر وقت کودک تان احساس آمادگی کرد، پوشک او را در آورید و بگذارید شورت بپوشد.
- دستشویی رفتن را برای کودک آسان تر کنید:
 - * کودک تان را طوری لباس بپوشانید که به راحتی بتواند در بیاورد.
 - * هر یک یا دو ساعت کودک تان را دستشویی ببرید.
 - * وقتی موفق است، او را تشویق کنید.
 - * سعی کنید عادت های برای دستشویی رفتن ایجاد کنید.

* با خواندن داستان و آواز، محیطی آرام در دستشویی ایجاد کنید.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۳ سالگی است

در مراقبت ۳ سالگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پیش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی سلامت دهان و دندان و انجام وارنیش فلوراید
- غربالگری تکامل (برای غربالگری تکامل کودک در این سن پرسشنامه استاندارد داده خواهد شد، آن را با دقت تکمیل نمایید و سپس برای بررسی به مراقب سلامت / بهورز تحویل دهید.)
- غربالگری فشار خون
- غربالگری شنوایی
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث



۱۰ • در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.

• ویزیت پزشک

• ویزیت دندانپزشک





سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی برای مراقبت ۳ سالگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی مراقبت ۳ سالگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان .
 مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹ .
 مشخصات ظاهری : ۲۴ ص. : مصور (رنگی) : ۱۵ × ۱۵ س. م .
 شابک : دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۴-۳۷-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 موضوع : کودکان - مراقبت Child care
 موضوع : کودکان - سلامت و بهداشت Children – Health and hygiene
 رده بندی کنگره : RJ1۰۱
 رده بندی دیویی : ۱/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۴۸۸۰۴



نکات کلیدی مراقبت ۳ سالگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۳۷-۴
 شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۵-۱

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۴	حمایت خانواده
۵	رشد و تکامل کودک
۶	تغییرات مناسب در تکامل حرکتی
۶	تکامل اجتماعی و احساسی
۶	تکامل زبان
۷	نکاتی که به تکامل فرزندان کمک می کند
۱۳	تغذیه کودک
۱۸	ایمنی کودک
۱۹	فعالیت فیزیکی کودک
۲۱	مراقبت های دیگر
۲۱	خواب
۲۲	آموزش توالت رفتن
۲۲	مراقبت های دندانپزشکی
۲۲	زمان مراقبت بعدی کودک شما ۴ سالگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. بهورزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۳ ساله ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید.

مراقبت هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی سلامت دهان و دندان و انجام وارنیش فلوراید
- غربالگری تکامل (برای غربالگری تکامل کودک در این سن پرسشنامه استاندارد داده

خواهد شد، آن را با دقت تکمیل نمایید و پس از تکمیل برای بررسی به مراقب سلامت /

بهورز تحویل دهید.)

- غربالگری فشار خون

- غربالگری شنوایی

- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک

- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک

- راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث

- ویزیت پزشک

- ویزیت دندانپزشک



حمایت خانواده

- برای خودتان و بودن با شریک زندگیتان وقت بگذارید.

- والدین نیاز دارند تا با دوستانشان، علایقشان و کارشان در ارتباط باشند.

- ساعات بازی و غذا خوردن مشخصی در کنار خانواده داشته باشید.

- آگاه باشید که والدین شما ممکن است سبک های پرورش فرزندشان با شما متفاوت

- باشد و روش تربیت شما ممکن است متفاوت از روش والدیتان باشد.

رشد و تکامل کودک

در این سن کودک شما:

- می تواند جمله بگوید.
- می تواند با اسباب بازی های ساده مانند جورچین ساده یا دسته های چرخشی مثل فرمان بازی کند.
- از دستورات ساده پیروی می کند.
- بازی های تخیلی می کند.
- با سایر کودکان و با اسباب بازی هایش بازی می کند.
- تماس چشمی برقرار می کند.
- به درستی راه می رود.
- می تواند از پله استفاده کند.
- گفتارش مفهوم است.



• در صورتی که کودک شما هریک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۳۶ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز / مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

تغییرات مناسب در تکامل حرکتی

- کودک شما شروع به بهتر نگاه داشتن یک مداد یا مدادرنگی می‌کند.
- کودکان سه ساله در حال یاد گرفتن استقلال هستند، یاد می‌گیرند که دگمه یا زیپ لباسشان را باز و بسته کنند و کفش هایشان را بپوشند.
- قادر است یک توپ بزرگ را پرتاب کند یا به زمین بزند ولی قادر به گرفتن آن نیست.

تکامل اجتماعی و احساسی

- کودک شما در حال توسعه حس شوخ طبعی‌اش است و دوست دارد که بخندد و کلمات سبک (احمقانه) را تکرار کند.
- به دنبال کسب تایید و توجه بزرگسالان است.
- ممکن است به راحتی تحت تأثیر چیزهایی که از تلویزیون پخش می‌شود قرار بگیرد.

تکامل زبان

- این سنی است که اغلب کودکان سوال می‌کنند «چرا؟»
- کودک شما از تکرار لغت‌ها و آهنگ‌ها لذت می‌برد.



نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می‌کند:

برای ارتقای تکامل حرکتی:

« فرصت‌هایی در اختیار کودکان قرار دهید که بریدن با قیچی مخصوص کودکان در این سن را امتحان کند.

« فرصت‌هایی برای دویدن، پریدن، بالا رفتن، تاب خوردن و سوار یک اسباب بازی چرخدار شدن در اختیار کودکان قرار دهید.



برای ارتقای تکامل اجتماعی و احساسی

* کودک ۳ ساله در حال آموزش این است که چگونه با دیگران کنار بیاید. روی رفتارهای اجتماعی‌ش مثل تقسیم کردن چیزها با دیگران و مهربان بودن کار کنید.

* کارهای کوچکی برای انجام، نظیر انداختن آشغال در سطل زباله به او بدهید.

* اطمینان حاصل کنید که حداقل دقایقی

در روز به کارهایی که هر دو از انجامشان لذت می‌برید مثل کتاب خواندن، قدم زدن، صحبت کردن یا بازی کردن با یکدیگر اختصاص خواهید داد.

برای توسعه زبان

- * توضیح دهید که چرا و چگونه چیزها اتفاق می افتند.
- * کودکان ۳ ساله از نشستن دور هم برای «وقت داستان» حداقل به مدت ۵ دقیقه در روز لذت می برند.

سلامت معنوی

- * کودک خود را با نام نیک و محترمانه صدا بزنید. خواهر، برادر و مخصوصاً همسر خود را با احترام صدا بزنید تا او احترام گذاشتن در صدا زدن را بیاموزد.
- * زمان تغذیه کودک فرصتی مناسب برای ایجاد امنیت و شکل دهی دلبستگی ایمن در کودک است.
- * هنگام برطرف کردن نیازهای کودک و در آغوش گرفتن او مراقب باشید که آرام و خوش خلق باشد، این مسئله در ایجاد دلبستگی و اعتماد در کودک موثر است.
- * رابطه گرم و خوبی با همسرتان داشته



باشید، کودک شما صداها را می شنود، موقعیت ها را می بیند و امنیت را احساس می کند. یکی از مواقع مضطرب شدن کودک زمان به خواب رفتن است، لالایی خواندن یک ابزار مناسب برای فرآیند به خواب رفتن کودک است. محتوا و معنی لالایی ها ضمن کمک به امنیت و آرامش کودک در هنگام به خواب رفتن، به انتقال فضای معنوی به آن ها کمک می کند.

آموزش از طریق بازی

- * بازی کردن با بقیه هم سن و سالانش کودکان را برای رفتن به مدرسه آماده می کند.
- * اسباب بازی های مختلفی در اختیار کودکان برای تغییر لباس دادن، بازی نقش های مختلف و تقلید کردن قرار دهید.
- * مطمئن شوید که کودکان فرصت بازی با بقیه هم سن هایش را دارد.
- * به کودکان کمک کنید که هنگام بازی با دیگران نوبت را رعایت کند.
- * بازی کودک در نقش های مختلف (مثلا دکتر، پرستار، جنگجو...) برای او فرصت هایی برای پذیرفتن نقش های گوناگون ایجاد می کند.
- * بازی های ساده ای برای کودکان فراهم کنید که طی آن بتواند چیزهایی مثل رعایت نوبت و قوانین ساده را بیاموزد، به طوری که برای فعالیت های مشارکتی آماده شود.
- * به او اجازه دهید هر چقدر که دوست دارد بازی کند.

* کودک شما شروع به شمردن چیزهایی که با آن‌ها بازی می‌کند مثل قطعات، عروسک‌ها و فنجان‌ها می‌کند.

* فعالیت‌های علمی ساده‌ای مثل آهنربا، کاشتن دانه و پرواز بادبادک را برای او فراهم کنید.

* در گفتگوهای روزانه توانایی شناخت رنگ‌ها، شمردن و تشخیص شکل‌ها را تقویت کنید.

• به کودک خود کمک کنید تا اشیاء را بشمارد، نام ببرد و مقایسه کند.

• برای او اسباب بازی‌های ساده بسازید.

• اشیایی با رنگ‌ها و شکل‌های متفاوت برای

دسته بندی به او بدهید.

• اشیای مشابه را با برچسب مشخص کند.

• پازل درست کند.

• او را تشویق کنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ

دهید.

• به کودکان داستان، آواز و بازی یاد بدهید.

• هر روز برای کودکان کتاب بخوانید، آهنگ‌ها را با

آواز بخوانید و قافیه بازی کنید. وقتی کتاب‌هایی با کلمات قافیه دار خوانده می‌شوند



کودکتان تشویق خواهد شد که داستان را بازگو کند. در مورد تصاویر کتاب‌ها با او صحبت کنید.



- از طریق اشتراک لغت‌های داخل کتاب با علامت‌ها و تابلوها و همه چیزهایی که در اطراف وجود دارند، علاقه به خواندن و نوشتن را در کودکتان تشویق کنید.
- با هم کتاب خواندن و صحبت کردن در مورد داستان و عکس‌های کتاب، کمک می‌کند تا کودک شما چگونه کتاب خواندن را یاد بگیرد.
- از کتاب به عنوان راهی برای صحبت با هم استفاده کنید. از او سوال‌هایی در مورد داستان یا عکس‌ها بپرسید. از او بخواهید که قسمتی از داستان را تعریف کند.
- از کودکتان بخواهید که در مورد روزش، دوستانش و فعالیت‌هایش صحبت کند.
- کودک شما ممکن است بدون علت مشخصی بد خلقی کند. از بد خلقیش چشم‌پوشی کنید و اطمینان حاصل کنید که او در امان است. اگر شما تسلیم شوید، بیشتر بد خلقی خواهد کرد.

- به کودکان گزینه‌هایی جهت انتخاب بدهید (مثل لباس، داستان یا غذاهای صبحانه).
- این مساله فرایند تصمیم‌گیری را در او تشویق خواهد کرد.
- کودک شما می‌تواند عواقب رفتار غیرقابل قبول را بفهمد. عواقب کارهایی که درمورد آن صحبت می‌کنید را بررسی کنید. این کار باعث می‌شود بتواند خود کنترلی به دست بیاورد.
- اجازه دهید کودک کشف کند، خود را نشان دهد، شروع کند و ارتباط برقرار کند.
- ممکن است کودک شما سوال کند که نوزادان از کجا می‌آیند یا در مورد تفاوت بین دخترها و پسرها سوال کند، به این سوال‌ها صادقانه و مختصر پاسخ دهید. اجزای بدن را با نام‌های درست بیان کنید.
- به کمک هم غذا آماده کنید.
- یک لیست خرید رنگین‌کمانی برای پیدا کردن میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ تهیه کنید.
- در محله تان قدم بزنید و در تمیز کردن آن همکاری کنید.



- یک باغچه خانوادگی پرورش دهید.
- به کودکان نشان دهید که چگونه می‌تواند عصبانیت و ناامیدیش را مدیریت کند. زدن،

گاز گرفتن و جنگیدن را همین الان کنار بگذارید. به او آموزش دهید که از رفتار احترام آمیز استفاده کند. یک گفتگو را با احترام و فعال بودن مدیریت کند.

- قوانین را تقویت کنید، رفتار خوب را تشویق کنید.
- در این سن مراقبین سلامت / بهورزان پرسشنامه بررسی وضعیت تکامل کودک را به شما خواهند داد، فعالیت های پرسشنامه را طی ۲-۱ هفته با حضور همسران با کودک انجام دهید و نتیجه را ثبت نمایید، سپس پرسشنامه تکمیل شده را برای بررسی به مراقب سلامت / بهورز تحویل دهید.

تغذیه کودک

- از غذاهای متنوع خانواده شامل گروه های اصلی غذایی به کودک بدهید.
- برای تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز، برنامه غذایی کودکان باید شامل ترکیبی از غذاهای مختلف متشکل از گروه های اصلی غذایی باشد. گروه های اصلی غذایی برای این سن عبارتند از:
* گروه نان و غلات (شامل نان، برنج، انواع



ماکارونی و رشته‌ها) که تامین‌کننده انرژی، ویتامین‌های گروه ب، آهن، فیبر و پروتئین مورد نیاز کودک است و بیشترین سهم غذای روزانه کودک را باید به خود اختصاص دهد.

* گروه سبزی‌ها و گروه میوه‌ها که تامین‌کننده ویتامین‌ها، املاح و فیبر مورد نیاز کودک است نقش مهمی در افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها دارد. در برنامه غذایی روزانه کودک از میوه‌های زرد و سبزی‌های برگ سبز تیره گنجانده شود.

* گروه شیرو لبنیات (شامل شیر، ماست، پنیر، کشک و دوغ) که تامین‌کننده کلسیم، فسفر، پروتئین، ویتامین‌های گروه ب و ویتامین‌های آ است.

* گروه گوشت و جانشین‌ها (شامل انواع گوشت‌ها، تخم مرغ، حبوبات و مغزها) که تامین‌کننده پروتئین، آهن و روی مورد نیاز کودک است.



• از سبزی‌های سبز تیره و نارنجی و میوه‌های زرد و نارنجی (هویج، کدو حلوایی، جعفری، گشنیز، اسفناج، انبه، زردآلو، مرکبات) که منابع غذایی ویتامین آ و سی هستند در برنامه

غذایی کودک استفاده شود.

- در هر روز ۳ وعده غذا و در هر وعده به اندازه یک لیوان کامل به کودک غذا بدهید.
- هر روز ۲ بار میان وعده مغذی (از گروه های اصلی غذایی) در بین وعده های اصلی غذا، به کودک بدهید.

• شیر پاستوریزه، ماست، میوه ها، سبزی ها، نان و پنیر کم نمک، نان و پنیر و خیار، نان و نصف تخم مرغ پخته شده، نان با دو عدد خرما و میوه های خشک انتخاب های بسیار خوبی برای میان وعده غذایی کودکان هستند. مصرف برخی میان وعده ها، مانند چیپس، پفک، غلات حجیم شده و به طور کلی تنقلات بی ارزش علاوه بر تغییر ذائقه کودک و افزایش احتمال ابتلای او به بیماری های غیرواگیر در سنین بزرگسالی مانند چاقی، با تأثیر بر ارشتهای کودک و در نهایت تمایل کمتر او به وعده های اصلی می تواند بر سرعت رشد کودک و به خصوص بر افزایش مطلوب قد تأثیر منفی داشته باشند.



- در برنامه غذایی کودک فقط از ماست پاستوریزه ساده استفاده شود و از مصرف انواع ماست میوه های صنعتی خودداری شود. در صورت تهیه ماست میوه خانگی فقط میوه به ماست اضافه شود و از اضافه کردن شکر به ماست میوه خودداری شود.

- از دادن انواع نوشیدنی های شیرین به دلیل افزایش خطر اضافه وزن و چاقی ، پوسیدگی دندان و کاهش دریافت مواد مغذی تا حد امکان خودداری شود.
- میان وعده را ۱٫۵ تا ۲ ساعت قبل از وعده اصلی به کودک بدهید.
- مصرف آب میوه طبیعی بیشتر از ۱۲۰ سی سی در روز نباشد. بهتر است از میوه تازه استفاده کنید. کودک را به مصرف آب آشامیدنی در طول روز تشویق کنید.
- به کودک در ظرف ها و کاسه های جدا غذا بدهید.
- در طول مدت غذا خوردن با کودک تان بنشینند و با او صحبت کنید، به چشمان او نگاه کنید و او را ترغیب به غذا خوردن کنید.
- غذا خوردن کودک همراه با حواس پرت کردن، تشویق و تنبیه نباشد. در هنگام غذا خوردن کودک، تلویزیون خاموش باشد.
- خوردن غذاهای آماده و خوردن شام بیرون از خانه را محدود کنید، اگر خودتان غذا بپزید از سالم بودن آن اطمینان بیشتری دارید.
- به کودک تان اجازه دهید که در تهیه غذای خانواده به شما کمک کند. کارهای ساده ای برای انجام به او بدهید مثل سفره انداختن، ریختن سبزی های خرد شده در سالاد یا به مخلوط کردن بهتر آن ها کمک کند.
- اگر برای کودک تان سخت است که طولانی مدت دور میز شام بنشیند زمان شام را کوتاه کنید، بعد از ۱۰ دقیقه یا در همین حدود وقتی که او نشان می دهد غذا خوردنش تمام

شده است اجازه دهید بلند شود.

- غذاهای سالمی مثل یک کاسه توت فرنگی یا موز را در جایی قرار دهید که در دسترس کودک باشد به این ترتیب او می تواند هر گاه که احساس گرسنگی کرد از آن ها بخورد.
- اطمینان حاصل کنید که هر کسی که از کودکان مراقبت می کند به کودکان غذاهای سالم می دهد و از دادن شیرینی خودداری کنید.
- از دادن هله هوله و غذاهای سبک ناسالم و نوشابه ها خودداری کنید.
- اجازه ندهید که کودکان هنگام خوردن به این طرف و آن طرف برود، این کار ممکن است باعث خفگی او شود، او را هنگام خوردن بنشانید.



- کودک شما روزانه حداقل ۸۰۰ میلی گرم کلسیم و ۴۰۰ واحد ویتامین د نیاز دارد. شیر یک منبع غنی از کلسیم و ویتامین د است.

- از یک صندلی تایید شده برای قد و وزن کودک خود در هر زمان که او در یک وسیله نقلیه سوار می شود استفاده کنید.
- وقتی کودکان از نظر قدی و وزنی از استاندارد مجاز صندلی های رو به جلو فراتر رفت، صندلی ایمنی کودک را به یک صندلی تقویت کننده کمربنددار تغییر بدهید.
- الگوی خوبی برای کودک خود باشید. هنگام رانندگی با تلفن همراه خود صحبت نکنید و پیامک ندهید.
- هرگز کودکان را در خانه، اتومبیل، حیاط و هر جای دیگری تنها نگذارید.
- کودک شما کوچکتر از آن است که بتواند به تنهایی از خیابان رد شود.

- مطمئن شوید که در طبقه دوم ساختمان و بالاتر پنجره ها دارای محافظ قابل اطمینان هستند. مبلمان را دور از پنجره ها بگذارید.
- به کودکان خطرات دویدن به سمت خیابان را بیاموزید. این مساله را اغلب به او یادآوری کنید. بر بازی کودکان نزدیک خیابان و راه های ماشین رو بین منزل و خیابان نظارت داشته باشید.



- همیشه مراقب کودکان در کنار آب باشید. بلد بودن شنا ایمنی او را در آب تضمین نمی‌کند.
- کلیه داروها، مواد پاک‌کننده و سموم را دور از دسترس کودک خود نگه دارید.
- در مورد صحبت نکردن با غریبه‌ها و دنبال غریبه‌ها نرفتن با او صحبت کنید. همچنین مفهوم اندام‌های خصوصی را برای او توضیح دهید.

فعالیت فیزیکی کودک

- فعالیت‌های فیزیکی به ساختن استخوان‌ها و ماهیچه‌های قوی کمک می‌کند، موجب افزایش انعطاف پذیری و اعتماد به نفس کودک می‌شود و ریسک ابتلا به بعضی بیماری‌های خاص مثل دیابت را کاهش می‌دهد.
- فعالیت‌هایی را که کودک‌تان از آن‌ها لذت می‌برد مثل: دویدن، قدم زدن، شنا کردن و... انتخاب کنید.
- مطمئن شوید که در حین انجام فعالیت مراقب کودکان هستید و چه بهتر که در انجام این فعالیت‌ها به او ملحق شوید.



- به جز در مواقع خواب، کودکان نباید بیشتر از یک ساعت بدون فعالیت باشند.
- در کنار هم خانواده فعالی باشید.
- تماشای تلویزیون، ویدئو و بازی های کامپیوتری را به روزانه یک تا دو ساعت محدود کنید.
- در اتاق خواب کودکان تلویزیون قرار ندهید.
- کودکان را از تماشای نمایش ها و پیام های بازرگانی که ممکن است با دیدن آنها چیزهای ناسالمی بخواهد دور نگه دارید.
- مطمئن شوید که او در خانه، پیش دبستانی یا مهدکودک فعال است.
- اسباب بازی های پرتحرک تهیه کنید. به ویژه کودکان خردسال احتیاج به دسترسی آسان به توپ، طناب برای طناب زدن و سایر اسباب بازی های پرتحرک دارند.
- برای تاب خوردن، کاوش در طبیعت، پارک، پرواز یک بادبادک، حفاری در شن و ماسه، غلتیدن در برگ ها یا ساخت یک آدم برفی زمان بگذارید.
- در بیشتر روزهای هفته کودکان حداقل



۲۱ به ۶۰ دقیقه زمان بازی پر جنب و جوش نیاز دارد راه‌هایی پیدا کنید تا کودکان در فعالیت‌های یک زندگی فعال و سالم مثل گرگم به هوا بازی کردن شرکت کند.

مراقبت‌های دیگر

خواب

- کودکان ممکن است چرت زدن‌های منظم در طی روز را متوقف کند.
- عادت‌های منظم شبانه از قبیل حمام رفتن، دستشویی رفتن، مسواک زدن، کتاب خواندن و... را به طور منظم ادامه دهید.
- کودک شما ممکن است از تاریکی و هیولا بترسد که طبیعی است. شما ممکن است



بخواهید از یک چراغ خواب با نور ملایم برای جلوگیری از ترس او استفاده کنید.

آموزش توالی رفتن

- اکثر کودکان تا این سن آموزش های لازم برای دستشویی رفتن را دیده اند، به خاطر داشته باشید که هر کودک منحصر به فرد است و مطابق سرعت خودش رشد می کند. هنگامی که کودکان از صندلی توالی استفاده می کند او را در آغوش بگیرید و تحسین کنید. به کودک خود بهداشت خوب و این که چگونه دست هایش را بشوید آموزش دهید.

مراقبت های دندانی

- به کودکان آموزش دهید که چگونه دندان هایش را مسواک بزند. از یک مسواک نرم استفاده کنید. کودکان هر روز ترجیحاً قبل از خواب باید مسواک بزند. کودکان هر روز دندان هایش را با خمیردندانی فلوراید دار به اندازه یک نخود مسواک بزند.
- قرارهای منظمی با دندانپزشک داشته باشید. ۶ ماه یکبار برای کودک واریش فلوراید انجام دهید.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۴ سالگی است

در مراقبت ۴ سالگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پایش رشد

- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی دهان و دندان و انجام وارنیش فلوراید
- ارزیابی تکامل
- غربالگری بینایی
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از آسیب
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.





Ulusal Kütüphane Kurumu
T.C. KÜTÜPHANECİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISBN 978-9953-0-0000-0



ISBN 978-9953-0-0000-0





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان بهداشت و درمان
دفتر سازمان سلامت خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت ۴ سالگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی مراقبت ۴ سالگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان .
 مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹ .
 مشخصات ظاهری : ۲۴ص. . مصور (رنگی)؛ ۱۵ × ۱۵س.م .
 شابک : دوره ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۱ ؛ ۱-۳۸-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۱
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 موضوع : کودکان - مراقبت Child care
 موضوع : کودکان - سلامتی و بهداشت Children - Health and hygiene
 رده بندی کنگره : RJ۱۰۱
 رده بندی دیویی : ۱/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۴۸۷۶۴



نکات کلیدی مراقبت ۴ سالگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۱-۳۸-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۱
 شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸-۱

۳	مقدمه
۴	حمایت خانواده
۴	رشد و تکامل کودک
۵	نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می کند
۷	تکامل حرکتی
۷	تکامل اجتماعی و احساسی
۸	تکامل بیانی
۹	سلامت معنوی
۱۰	آموزش از طریق بازی
۱۰	تغذیه کودک
۱۵	ایمنی کودک
۱۷	فعالیت فیزیکی کودک
۱۹	مراقبت های دیگر
۱۹	نظم و انضباط
۲۰	مراقبت از دندان ها
۲۰	غربالگری چشم
۲۰	عادت های خوب
۲۱	تماشای تلویزیون
۲۱	آماده شدن برای مدرسه
۲۲	زمان مراقبت بعدی کودک شما ۵ سالگی است

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه‌اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت / پایگاه سلامت / مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه‌های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید. بهورزان / مراقبین سلامت و پزشکان در برابر نگرانی‌ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می‌دهند. در سن ۴ سالگی لازم است کودک مورد پایش قرار گیرد. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۴ ساله ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید.

مراقبت‌هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه

- ارزیابی دهان و دندان و انجام وارنیش فلوراید
- ارزیابی تکامل
- غربالگری بینایی
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از آسیب های کودک



حمایت خانواده

مطمئن شوید خانواده وقت قابل توجهی را برای فعال بودن در کنار هم بعنوان اعضای یک خانواده صرف می کند.

رشد و تکامل کودک

- در این سن کودک شما:
- می تواند در جا بپرد.
- به بازی های تعاملی یا وانمود کردنی علاقه نشان می دهد.
- در کپی کردن دایره مشکل ندارد.

- با کودکان دیگر بازی می‌کند.
- هنگام لباس پوشیدن و درآوردن لباس و دستشویی رفتن کمک می‌کند.
- قسمت‌هایی از داستان مورد علاقه اش را تعریف می‌کند.
- می‌تواند از دستورات سه مرحله ای پیروی کند.
- مفهوم «مشابه» و «متفاوت» را درک می‌کند.
- گفتار واضحی دارد.
- از ضمایر من و تو درست استفاده می‌کند.
- در صورتی که کودک شما هریک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۴۸ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز / مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.



نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می‌کند:

- با کودکان تماس چشمی برقرار کنید، سعی کنید اشارات او را درک کرده و پاسخ مناسب بدهید.
- سعی کنید او را بخندانید.

• حداقل روزی ۱۵ دقیقه هر روز برای او کتاب بخوانید. داستان‌ها، شعرها و کتاب‌های ریتمیک مختلف و زیادی برای او بخوانید. از کودکان سوال کنید که فکر می‌کند چه اتفاقی در داستان خواهد افتاد. به او کمک کنید که از لغات و عبارات صحیح استفاده کند.

• توانایی زبان کودک شما در حال رشد است. به او معنای کلمات جدید را بیاموزید.



• کودک شما ممکن است به نوشتن علاقمند باشد

و ممکن است به یادگیری خواندن کتاب علاقه

نشان دهد. به او آموزش دهید که چگونه اسمش

را بنویسد و با الفبا بازی کند.

• با استفاده از جملات کوتاه و شفاف به کودکان

آموزش دهید که از دستورالعمل‌ها پیروی کند.

• با مدل‌سازی معذرت‌خواهی کردن به کودک

کمک کنید که در صورت صدمه دیدن احساسات

کسی بتواند این کار را انجام دهد.

• با گوش کردن و رفتار کردن با احترام در برابر کودک به او یاد دهید که چگونه با دیگران با

احترام رفتار کند.



تکامل حرکتی

- به کودک فرصت دهید عضله های بزرگش را قوی کند با انجام کارهایی مانند:
 - * راه رفتن روی یک خط
 - * پدال زدن و هدایت یک سه چرخه
 - * تعادل بر روی یک پا
 - * گرفتن ، لگد زدن ، پرتاب و به زمین زدن توپ
- به کودک فرصت دهید عضله های کوچکش را قوی کند با انجام کارهایی مانند:
 - * کپی اشکال ، حروف و اعداد
 - * درست کردن پازل
 - * بازی با اسباب بازی هایی که قطعات کوچک دارند
 - * لباس پوشیدن و درآوردن بدون کمک دیگران

تکامل اجتماعی و احساسی

- به منظور این که کودک شما بتواند احساسات شدیدش را مدیریت کند او را تشویق کنید که با استفاده از لغات احساساتش را بیان کند.
- روی آموختن مهارت هایی مثل نشان دادن همدردی با دیگران ، حل مساله و به آرامی

پیوستن به شرایط بازی های گروهی کار کنید.

- در اجتماع مشارکت داشته باشید. هر وقت توانستید به فعالیت های اجتماعی ملحق شوید.

- در مورد تمام قسمت های بدن از واژگان صحیح استفاده کنید.
- به کودکان آموزش دهید که چگونه در کنار دیگر بزرگسالان ایمن باشد.
- هیچ کس نباید از کودکان بخواهد که رازی را از پدر و مادرش مخفی نگاه دارد.
- هیچ کس نباید از کودکان درخواست کند که قسمت های خصوصی بدنش را ببیند.

تکامل بیانی

- برای او هر روز کتاب بخوانید و برای سنجیدن درکش از کتاب از او سوالاتی بپرسید.
- مطمئن باشید که از کودکان سوالاتی در مورد روزش، دوستانش و فعالیت هایش پرسیده اید.
- از آنجایی که کودک به لغات علاقه نشان می دهد، او را با نشان دادن لغات، بازی با صداها و قافیه سازی مشغول کنید.
- به سوال های «چه چیز»، «چرا» و «چه کسی» او در مورد داستان هایی که با هم می خوانید جواب بدهید.



سلامت معنوی

۹

- جلوی چشمان کودکان رفتارهای دینی انجام دهید مانند نماز خواندن، دعا خواندن و ... اگر کودکان از شما تقلید کرد، او را تشویق و تحسین کنید.
- التزام شما به باورها، احساسات، رفتارهای دینی و رعایت اخلاق یکی دیگر از شرط‌هایی است که برای تربیت معنوی کودک مهم است. کودک مدت‌ها قبل از اینکه بتواند سخن بگوید یا مفاهیم را کامل درک کند، ارزش‌های والدینش را دریافت می‌کند.
- سپاسگزاری از نعمت یکی از مواردی است که کودک باید بیاموزد. سپاسگزاری و تشکر از رفتارهایی که والدین در قبال کودک انجام می‌دهند لازم است. تشکر در ابتدا به وسیله رفتارهای والدین در قبال هم و اعضای خانواده شکل گیرد و سپس به تدریج به صورت کلامی به کودک گوشزد شود تا در کودک نهادینه شود و شکرگزار خداوند باشد.
- هرگز نسبت به علاقه و کنجکاوی کودکان درباره خدا بی تفاوت نباشید. برای پاسخ به سوالات کودک درباره خدا، فکر کنید، مطالعه کنید و زمان مناسبی را برای پاسخ دهی به آن‌ها انتخاب کنید تا کودکان بتوانند ایمان، امید و



مفهومی متعالی را به درستی دریافت کند.

آموزش از طریق بازی

- فعالیت‌ها، اسباب بازی‌ها و بازی‌هایی برای تشویق کودکان برای آزمودن تجربه‌های جدید فراهم کنید.
- زمان دیدن برنامه‌های با کیفیت تلویزیون، ویدیو و بازی‌های کامپیوتری را به ۱ تا ۲ ساعت در هر روز محدود کنید. به همراه کودکان تلویزیون تماشا کنید و مراقب استفاده او از اینترنت باشید.
- نقاشی کردن را تشویق کنید.
- اجازه دهید که با سایر کودکان بازی کند زیرا با دیگران سهیم شدن و همکاری را در او تقویت می‌کند.

تغذیه کودک

- از غذاهای متنوع خانواده شامل گروه‌های اصلی غذایی به کودک بدهید.
- در هر روز ۳ وعده غذا و در هر وعده به اندازه یک لیوان





۱۱

- هر روز ۲ بار میان وعده مغذی (از گروه‌های اصلی غذایی) در بین وعده‌های اصلی غذا، به کودک بدهید.



- میان وعده را ۱٫۵ تا ۲ ساعت قبل از وعده اصلی به کودک بدهید.
- برای تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز، برنامه غذایی کودکان باید شامل ترکیبی از غذاهای مختلف متشکل از گروه‌های اصلی غذایی باشد.

- از سبزی‌های سبزه تیره و نارنجی و میوه‌های زرد و نارنجی (هویج، کدو حلوائی، جعفری، گشنیز، اسفناج، انبه، زردآلو، مرکبات) که

منابع غذایی ویتامین آ و سی هستند در برنامه غذایی کودک استفاده شود.

- شیرپاستوریزه، ماست، میوه‌ها، سبزی‌ها، نان و پنیر کم نمک، نان و پنیر و خیار، نان و نصف تخم مرغ پخته شده، نان با دو عدد خرما و میوه‌های خشک انتخاب‌های بسیار خوبی برای میان وعده غذایی کودکان هستند. مصرف برخی میان وعده‌ها، مانند

چیپس، پفک، غلات حجیم شده و به طور کلی تنقلات بی ارزش علاوه بر تغییر ذائقه کودک و افزایش احتمال ابتلای او به بیماری های غیرواگیر در سنین بزرگسالی مانند چاقی، با تأثیر بر اشتهای کودک و در نهایت تمایل کمتر او به وعده های اصلی می توانند بر سرعت رشد کودک و به خصوص بر افزایش مطلوب قد تأثیر منفی داشته باشند.

- در برنامه غذایی کودک فقط از ماست پاستوریزه ساده استفاده شود و از مصرف انواع ماست میوه های صنعتی خودداری شود. در صورت تهیه ماست میوه خانگی فقط میوه به ماست اضافه شود و از اضافه کردن شکر به ماست میوه خودداری شود.
- مصرف آب میوه طبیعی بیشتر از ۱۸۰ سی سی در روز نباشد. بهتر است از میوه تازه استفاده کنید. کودک را به مصرف آب آشامیدنی در طول روز تشویق کنید.

- از دادن انواع نوشیدنی های شیرین به دلیل افزایش خطر اضافه وزن و چاقی، پوسیدگی دندان و کاهش دریافت مواد مغذی تا حد امکان خودداری شود.
- زمان خوردن غذا را تبدیل به زمانی برای تفریح کنید. غذاهای انگشتی به او بدهید. با ماکارونی و ساندویچ اشکال جالب بسازید.



- در طول مدت غذا خوردن با کودکان بنشینید و با او صحبت کنید، به چشمان او نگاه کنید و او را ترغیب به غذا خوردن کنید.
- غذا خوردن کودک همراه با حواس پرت کردن، تشویق و تنبیه نباشد. در هنگام غذا خوردن، تلویزیون خاموش باشد.
- به کودک در ظرف ها و کاسه های جدا غذا بدهید.
- به جای این که به او اجازه دهید مستقیماً از یک ظرف بزرگ بخورد از فنجان و کاسه کوچک استفاده کنید.
- کودکان ۴ ساله دوست دارند خودشان به تنهایی کارهایشان را انجام دهند. میوه های تمیز و تازه و سبزیجات را در کاسه ای ریخته و آن را در جایی بگذارید که کودک بتواند از این غذاهای سالم برداشته و بخورد.
- به کودکان در مورد اندازه مناسب غذای کشیده شده آموزش دهید. اجازه دهید استفاده از فنجان های اندازه گیری را تمرین کند.
- عادت های خوب تغذیه را تشویق کنید. برای تشویق کودکان به خوردن، خودتان نیز از آن غذا بخورید. غذاهای متنوعی تهیه کنید. از او بخواهید که حداقل یک نوع غذای جدید را آزمایش کند.
- از رشوه دادن اجتناب کنید. اگر کودکان را با قول دادن شکلات به خوردن نخود فرنگی

و ادارید ممکن است در کوتاه مدت این شگرد موثر باشد ولی اینکار باعث تشویق خوردن غذاهای ناسالم می شود.

- اطمینان حاصل کنید که هر کسی که از کودکان مراقبت می کند به او غذاهای سالم می دهد و از دادن شیرینی خودداری می کند.
- هله هوله و غذاهای ناسالم و نوشابه به او ندهید.
- از غذا نباید بعنوان پاداش یا تنبیه استفاده کرد.
- اگر کودکان غمگین یا ناراحت است به او پیشنهاد دهید که با هم قدم بزنید، کتاب بخوانید، یا آواز بخوانید. این کار راه های سالمی برای مقابله، به جای آرامش دادن به خود با غذا، به او یاد می دهد.

- به کودکان غذای سبک سالم بدهید. از دادن غذاهای چرب و شیرین اجتناب کنید. از دادن غذاهایی که خطر خفگی دارند اجتناب کنید.

- اجازه دهید که کودکان در تهیه برنامه غذایی و تهیه غذاهای ساده به شما کمک کند. او می تواند در چیدن میز غذا و تمیز کردن آن و درست کردن ساندویچ و ریختن غلات صبحانه کمک کند. همیشه فعالیت های کودکان



- در آشپزخانه را نظارت کنید و در همه حال مراقب او باشید.
- کودک شما حداقل ۸۰۰ میلی‌گرم کلسیم ۴۰۰ واحد ویتامین د به طور روزانه نیاز دارد.

ایمنی کودک

- از یک صندلی ایمنی رو به جلو یا یک صندلی حمایت کننده در صندلی عقب همه خودروها استفاده کنید. وقتی که کودکان به محدودیت وزنی یا قدی صندلی ایمنی اش برسد، شانه هایش بالاتر از شکاف بالایی قلاب قرار گیرد، یا اینکه گوش هایش تا بالای صندلی ایمنی خودرو بیاید باید از یک صندلی تقویتی (booster sit) با کمربند ایمنی استفاده کنید. برچسب ایمنی روی صندلی خودرو را چک کنید. مطمئن شوید که سایر کودکان و بزرگسالان در خودرو نیز کمربندشان را بسته اند.
- الگوی خوبی برای کودکان باشید. هنگام رانندگی با تلفن صحبت نکنید و پیامک ندهید.
- هیچ وقت کودکان را تنها در خودرو، خانه یا حیاط رها نکنید.
- به او اجازه ندهید که به تنهایی از خیابان رد شود.
- ایمنی در خیابان را تمرین کنید. برای او توضیح دهید که چرا مهم است که دور از ترافیک



- بگذارید کودکتان به دور از خیابان سه چرخه سواری کند. مطمئن شوید که در هر بار سه چرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده می‌کند.
- تجهیزات بازی بیرون از خانه را به منظور اطمینان از شل نبودن قطعات آن و نداشتن لبه‌های تیز بررسی کنید. هنگام بازی در زمین بازی مراقب او باشید. اجازه ندهید به تنهایی در خارج از خانه بازی کند.
- به کودکتان ایمنی در آب را بیاموزید. اگر مناسب می‌دانید او را در کلاس شنا ثبت نام کنید. مطمئن شوید هنگامی که کنار دریاچه یا رودخانه است مراقبت می‌شود و از جلیقه نجات استفاده می‌کند.

• کلیه داروها، مواد شوینده و سموم را دور از دسترس او نگاه دارید.

- به او بیاموزید که چگونه در کنار حیوانات ایمن باشد.
- به کودکتان آموزش دهید هنگامی که یک غریبه به او نزدیک شد چه کار کند. به او هشدار دهید که هیچگاه با یک غریبه جایی نرود و چیزی از غریبه‌ها قبول نکند.
- به کودکتان بیاموزید که وقتی احساس راحتی نمی‌کند



- از «نه» استفاده کند و همینطور در مورد «لمس خوب» و «لمس بد» با او صحبت کنید.
- به او اسم، آدرس، شماره تلفن و تماس با شماره تلفن مشخصی در مواقع ضروری را یاد بدهید.

فعالیت فیزیکی کودک

- برای بازی های روزانه فرصت ایجاد کنید. فعالیت های فیزیکی به ساخت استخوان ها و عضلات قوی کمک می کند، ریسک ابتلا به بعضی از بیماری ها مثل دیابت را کاهش می دهد، انعطاف پذیری و اعتماد به نفس را افزایش می دهد.
- فعالیت هایی را انتخاب کنید که کودکان از آن لذت می برد مثل دویدن، شنا و....
- فعالیت ها باید سرگرم کننده باشند و او را به کشف و امتحان چیزهای جدید تشویق کنند. توسعه مهارت های حرکتی بنیادی پیش نیاز یادگیری مهارت های ورزشی در سنین بالاتر است. نمونه ای از این بازی ها در کتابچه «فعالیت ها و بازی هایی برای حمایت از تکامل حرکتی، ذهنی، ارتباطی، اجتماعی و



هیجانی کودکان» آمده است که می‌توانید از این کتابچه استفاده کنید.

- برای بازی روزانه فرصت‌هایی ایجاد کنید و او را برای فعال بودن تشویق و تمجید کنید.
- مطمئن شوید که او دسترسی آسانی به توپ، طناب برای طناب زدن و سایر اسباب بازی‌هایی که پر تحرکی را تشویق می‌کنند دارد.
- مطمئن شوید که هنگام بازی کردن مراقب کودکان هستید و چه بهتر این‌که هنگام بازی کردن به او ملحق شوید. با ورزش کردن و فعال بودن برای او الگو باشید. کودکانی که می‌بینند والدینشان به طور منظم و مرتب ورزش و فعالیت‌های فیزیکی دارند و از آن لذت می‌برند احتمال بیشتری دارد که خودشان نیز این کار را انجام دهند.
- بازی‌هایی مثل قایم موشک، گرگم به هوا، لی لی و توپ بازی، او را برای بازی‌های فیزیکی پیشرفته‌تر در مدرسه آماده خواهد کرد. این سن فرصت بزرگی است برای این‌که کودکان را در معرض بازی‌های سازمان یافته مثل فوتبال مخصوص کودکان قرار دهد.
- کودک شما در بیشتر روزهای هفته به حداقل ۶۰ دقیقه بازی در روز نیاز دارد.
- تماشای تلویزیون، زمان بازی‌های کامپیوتری و زمان استفاده از کامپیوتر را به یک تا دو ساعت در روز محدود کنید.
- در اتاق خواب کودک تلویزیون نگذارید.
- کودکان را به خاطر فعال بودن تحسین کنید.

مراقبت های دیگر

نظم و انضباط

- برای کودکان هدف و محدودیت تعیین کنید، مطمئن شوید که هدف واقعی است و کاملاً برای کودک شما ملموس است.
- به او بیاموزید که کمک کردن به دیگران می تواند مفرح باشد.
- در صورت انجام کاری که نباید انجام دهد، می توانید او را در جای امن و خسته کننده ای مثل گوشه اتاق برای مدت زمان ۱ دقیقه به ازای هر یک سال سن، بگذارید که از آن محل خارج نشود. اگر کودک ۴ ساله شما به این روش ادب کردن نیاز داشت ساعت را برای ۴ دقیقه تنظیم کنید تا زمان را به شما یادآوری کند. زمان کوتاهی بعد از اتمام تادیب دنبال رفتار خوبی برای تشویق کردن او باشید.
- در مورد تربیت او کاملاً شفاف و ثابت قدم باشید. مطمئن شوید که کودکان هر چیزی را که می گویند می فهمد و دقیقاً می داند که شما چه می خواهید. مخاطب شما رفتار کودک باشد نه خود کودک، از عبارات کلی مثل: «تو یک دختر شیطان هستی» استفاده نکنید. از رفتارهای انضباطی مناسب با کودکان استفاده کنید.

مراقبت از دندان‌ها

- به کودکان آموزش دهید که چگونه دندان‌هایش را مسواک کند. از یک مسواک نرم استفاده کنید. کودکان باید هر روز، ترجیحاً قبل از خواب مسواک بزنند.

- در این سن مراقب سلامت / به‌روز برای کودکان واریش فلوراید انجام می‌دهد.

غربالگری چشم

- توصیه می‌شود کودک در سن ۴ سالگی از نظر تنبلی چشم غربالگری شود.



عادت‌های خوب

- غذا را به همراه خانواده بدون تلویزیون صرف کنید.
- یک برنامه روزمره آرام برای وقت خواب ایجاد کنید.
- کودکان دوبار در روز با خمیردندان فلوراید دار به اندازه یک نخود مسواک بزنند.

تماشای تلویزیون

- تماشای تلویزیون را به کمتر از ۲ ساعت در روز محدود کنید.
- در مورد برنامه های تلویزیونی که با هم دیده اید با اعضای خانواده تان صحبت کنید.
- در اتاق خواب کودک تلویزیون نباشد.

آماده شدن برای مدرسه

- از کودکان بخواهید در مورد روزش، دوستانش و فعالیت هایش صحبت کند.
- هر روز برای کودکان کتاب بخوانید و از او در مورد داستانهایی که می خوانید سوال کنید.
- کودکان را با خودتان به کتابخانه ببرید و اجازه دهید کتاب انتخاب کند.
- به کودکان گوش دهید و با احترام با او رفتار کنید و اصرار داشته باشید که دیگران نیز با او همین گونه رفتار کنند.
- یک عذرخواهی را مدل سازی کنید و به او کمک کنید بعد از جریحه دار کردن احساسات دیگران همین کار را انجام دهد.
- کودکان را به خاطر مهربانی کردن با دیگران تحسین کنید.



- کمک کنید که احساساتش را بیان کند.
- به کودکان این شانس را بدهید که بتواند اغلب با دیگران بازی کند.
- ثبت نام در یک مهد کودک یا فعالیت اجتماعی مناسب را در نظر داشته باشید.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۵ سالگی است

در مراقبت ۵ سالگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

- پیش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی دهان و دندان، انجام وارنیش فلوراید
- غربالگری تکامل (برای غربالگری تکامل کودک در این سن پرسشنامه استاندارد داده خواهد شد، آن را با دقت تکمیل نمایید و پس از تکمیل برای بررسی به مراقب سلامت / بهورز تحویل دهید)
- غربالگری بینایی در صورت نیاز
- غربالگری شنوایی در صورت نیاز
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک

- راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث
- معاینه کودک توسط پزشک
- معاینه کودک توسط دندانپزشک
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

کتابخانه مرکزی



9789643270073 >

ISBN 9643270073 >



9 789643 270073 >



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر معاونت سلامت، خانواده و مدارس
انبار سلامت کودکان

نکات کلیدی مراقبت مراقبت ۵ سالگی



به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور: نکات کلیدی مراقبت ۵ سالگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان.
 مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری: ۱۲ص: مصور (رنگی)؛ ۱۵ × ۱۵ س.م.
 شابک: دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸؛ ۸-۳۹-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 موضوع: کودکان - مراقبت Child care
 موضوع: کودکان - سلامتی و بهداشت Children - Health and hygiene
 رده بندی کنگره: RJ۱۰۱
 رده بندی دیویی: ۱/۶۴۹
 شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۸۸۱۲



نکات کلیدی مراقبت ۵ سالگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان
 ناشر: اندیشه ماندگار
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
 تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
 شابک: ۸-۳۹-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸
 شابک دوره: ۱-۲۵-۷۰۰۷-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۴	حمایت خانواده
۴	رشد و تکامل کودک
۵	نکاتی که به تکامل کودک شما کمک می کند
۶	تغذیه کودک
۷	ایمنی کودک
۸	فعالیت فیزیکی کودک
۹	مراقبت های دیگر
۹	خواب
۹	نظم و انضباط
۱۰	اعتماد به نفس
۱۰	مراقبت از دندان ها
۱۱	غربالگری چشم
۱۱	تماشای تلویزیون
۱۱	آماده شدن برای مدرسه

مقدمه

شما اولین آموزگار فرزندتان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه‌ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف از جمله ۵ سالگی لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه سلامت / خانه بهداشت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه‌های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید مراقبین سلامت / بهروزان و پزشکان در برابر نگرانی‌ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می‌دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۵ ساله ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکان و انجام اقدامات لازم، در آینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت‌هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی دهان و دندان، انجام وارنیش فلوراید
- غربالگری تکامل (برای غربالگری تکامل کودک در این سن پرسشنامه استاندارد داده خواهد شد، آن را با دقت تکمیل نمایید و پس از تکمیل برای بررسی به مراقب سلامت / بهروز تحویل دهید)
- غربالگری بینایی در صورت نیاز
- غربالگری شنوایی در صورت نیاز
- راهنمایی‌هایی برای تغذیه کودک

- راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک
- راهنمایی هایی برای پیشگیری از آسیب کودک
- معاینه کودک توسط پزشک
- معاینه توسط دندانپزشک
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.



حمایت خانواده

- برنامه روزانه خانوادگی داشته باشید.

رشد و تکامل کودک

در این سن کودک شما:

- بسیاری از بازی ها و فعالیت ها را انجام می دهد.
- می تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید.
- می تواند در مورد فعالیت های روزانه یا تجاربش صحبت کند.
- می تواند نقاشی بکشد.
- می تواند بدون کمک دندانش را مسواک بزند.
- می تواند به تنهایی دست و صورتش را بشوید و خشک کند.
- می تواند بدون کمک لباس هایش را عوض کند.
- می تواند افعال جمع و گذشته را به درستی بکار ببرد.
- می تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد.
- می تواند چیزهای واقعی و غیر واقعی را از هم تشخیص دهد.

- در صورتی که کودک شما هریک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ ۶۰ ماهگی را از سایت وزارت بهداشت / سایت دانشگاه / مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت دریافت نمایید. پس از تکمیل برای بررسی به بهورز / مراقب سلامت / پزشک تحویل دهید.

نکاتی که به تکامل کودک شما کمک می‌کند:

- حداقل روزی ۱۵ دقیقه برای او کتاب بخوانید.
- نوشتن و نقاشی کردن را تشویق کنید. کودکان در این سن می‌توانند اسم خودشان را بنویسند و بیشتر حروف الفبا را تشخیص دهند. فرصتی را برای او فراهم کنید که داستان‌های ساده بگوید و آهنگ‌های کودکانه بخواند.
- به کودکان بیاموزید که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.
- او را در آغوش بگیرید و تحسین کنید.
- به کودکان کمک کنید که کارهایی برای خودش انجام دهد. کارهایی از کارخانه را برای انجام دادن به او واگذار کنید و انتظار داشته باشید که آن‌ها خوب انجام شوند.
- کودکان از نظم و انضباط چیزهای بیشتری یاد می‌گیرند تا از تنبیه کردن.
- به کودکان کمک کنید تا با خشمش مقابله کند. به او بیاموزید از موقعیتی که خشمگین می‌شود بیرون آمده یا به جای دیگری برای بازی برود.
- در این سن کودک می‌تواند برای رفتن به پیش دبستانی آماده شود.
- نشانه‌های آمادگی کودکان برای رفتن به پیش دبستانی شامل این موارد است:
 - * با دیگر بچه‌ها خوب بازی می‌کند.
 - * از قوانین ساده و کوچک پیروی می‌کند، برای رسیدن نوبتش منتظر می‌ماند.

* می‌تواند برای یک نصف روز خارج از خانه بماند.

* خودش می‌تواند غذایش را بخورد.

* مستقل از دیگران می‌خواهد.

* می‌تواند به تنهایی توالت برود.

• از مراقب سلامت / بهورز خود بخواهید پرسشنامه غربالگری تکامل ۵ سالگی کودک را در اختیار شما قرار دهد و در باره نحوه تکمیل آن برایتان توضیح دهد.

تغذیه کودک

- عادت‌های خوب تغذیه را تشویق کنید. برای تشویق کودکان به خوردن، خودتان نیز از آن بخورید. غذاهای متنوعی تهیه کنید. غذاهای خاصی به طور جداگانه برای او تهیه نکنید.
- به او غذاهای سبک مغذی مثل میوه‌ها، سبزیجات، غلات، ماست، فرنی، ذرت، ساندویچ کره، آبمیوه یا پنیر بدهید. از دادن غذاهای چرب یا با شکر بالا به کودکان اجتناب کنید.
- اجازه دهید در تهیه برنامه غذایی و تهیه غذاهای ساده به شما کمک کند. او می‌تواند در چیدن میز غذا و تمیز کردن آن و درست کردن ساندویچ و ریختن غلات صبحانه کمک کند. همیشه فعالیت‌های کودکان در آشپزخانه را نظارت کنید.
- زمان غذا را به یک زمان لذت بخش تبدیل کنید.
- نوشیدن آب میوه طبیعی بیشتر از ۱۸۰ سی سی در روز نباشد. بهتر است از میوه‌های تازه استفاده کنید.
- کودک شما حداقل ۸۰۰ میلی‌گرم کلسیم ۴۰۰ واحد ویتامین د به طور روزانه نیاز دارد. شیر یک منبع غنی کلسیم و ویتامین د است.

ایمنی کودک



۷

- زمانی که قد و وزن کودکان از محدوده مجاز صندلی ایمنی کودک فراتر می‌رود، صندلی کودکان را به یک صندلی تقویت کننده‌ای که با کمربند ثابت شده است تغییر دهید. کودکان باید در صندلی عقب خودرو سوار شود و از یک صندلی حمایت کننده استفاده کند. مطمئن شوید که سایر کودکان و بزرگسالان در خودرو نیز کمربندشان را بسته‌اند.
- الگوی خوبی برای کودکان باشید. هنگام رانندگی با تلفن صحبت نکنید و پیامک ندهید.
- از کرم ضد آفتاب در خارج از خانه برای او استفاده کنید.
- یک کلاه ایمنی مناسب و خوب و تجهیزات ایمنی برای دوچرخه سواری و اسکیت تهیه کنید. مطمئن شوید که هنگام سوار شدن سه چرخه کودکان از کلاه ایمنی استفاده می‌کند. مطمئن شوید هنگام بازی با اسکیت از کلاه ایمنی و بالشتک‌های محافظ آرنج و زانو استفاده می‌کند.
- به کودکان یاد دهید چگونه بدون خطر از خیابان عبور کند. کودکان تا سن زیر ۱۰ سال آمادگی تنهایی عبور کردن از خیابان را ندارند. ایمنی در خیابان را تمرین کنید.
- اگر مناسب می‌دانید کودکان را در کلاس شنا ثبت نام کنید تا شنا کردن را بیاموزد. کنار آب مراقب کودکان باشید. مطمئن شوید هنگامی که کودکان کنار دریاچه یا رودخانه است مراقبت می‌شود و از جلیقه نجات استفاده می‌کند.
- در خانه‌تان هشدار دهنده دود سالم نصب کنید و یک نقشه فرار از آتش داشته باشید. اطفاء حریق و ایمنی از آتش را در خانه تمرین کنید.
- هنگام بازی در زمین بازی مراقب کودکان باشید. اجازه ندهید به تنهایی در خارج از خانه بازی

- کند. به او آموزش دهید که چگونه در حضور بقیه بزرگسالان احساس امنیت بکند.
- هیچ کس نباید از او بخواهد رازی را از پدر و مادرش مخفی نگاه دارد.
- هیچ کس نباید از او درخواست کند که قسمت های خصوصی (بدنش) را ببیند.
- به کودکان آموزش دهید هنگامی که یک غریبه به او نزدیک شد چه کار کند. به او هشدار دهید که هیچگاه با یک غریبه جایی نرود و چیزی از غریبه ها قبول نکند. به کودکان بیاموزید که چگونه «نه» بگویند و به بزرگسالی که اعتماد دارد بگویند.
- به کودکان بیاموزید که چگونه در کنار حیوانات ایمن باشد.
- اسم، آدرس و شماره تلفنش را تمرین کند. به او یاد بدهید در چه مواقعی و چگونه با ۱۱۰ تماس بگیرد.
- کلیه داروها، مواد شوینده و سموم را دور از دسترس کودکان نگاه دارید.
- اگر کودکان مواد سمی بلعید برای گرفتن دستورات عمل با پزشک یا اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.
- این شماره تلفن ها را کنار تلفنتان در دسترس خود داشته باشید یا در تلفن خود ذخیره کنید.

فعالیت فیزیکی کودک

- کودک شما در بیشتر روزهای هفته به حداقل ۳ ساعت بازی در روز نیاز دارد.
- فعالیت های فیزیکی به ساخت استخوان ها و عضلات قوی کمک می کند، ریسک ابتلا به بعضی از بیماری ها مثل دیابت را کاهش می دهد، انعطاف پذیری و اعتماد به نفس را افزایش می دهد.
- فعالیت ها باید سرگرم کننده باشند و او را به کشف و امتحان چیزهای جدید تشویق کنند. توسعه مهارت های حرکتی بنیادی پیش نیاز یادگیری مهارت های ورزشی در سنین بالاتر است.
- مطمئن شوید که هنگام بازی کردن مراقب کودکان هستید و بهتر است هنگام بازی کردن به او ملحق شوید. فعالیت هایی را انتخاب کنید که کودکان از آن لذت می برد.

مراقبت های دیگر

خواب

- کودک شما از یک برنامه منظم لذت خواهد برد. یک روال منظم قبل از خواب که شامل حمام کردن، مسواک زدن و کتاب خواندن است را در پیش بگیرید. از بازی های پر جنب و جوش حداقل ۳۰ دقیقه قبل از آرام گرفتن برای خواب اجتناب کنید.
- اطمینان حاصل کنید هنگام خواب نور کافی برای پیدا کردن راه دستشویی در شب برای کودکان وجود دارد.



نظم و انضباط

- در صورت انجام کاری که نباید انجام دهد، می توانید او را در جای امن و خسته کننده ای مثل گوشه اتاق برای مدت ۱ دقیقه به ازای هر یک سال سن، بگذارید که از آن محل خارج نشود. اگر کودک ۵ ساله شما به این روش ادب کردن نیاز داشت ساعت را روی ۵ دقیقه تنظیم کنید تا زمان را از یاد نبرید. زمان کوتاهی بعد از اتمام تادیب دنبال رفتار خوبی برای تشویق کردن او باشید.
- مخاطب شما رفتار کودک باشد نه خود کودک. با عبارات کلی، تشویق یا سرزنش نکنید عباراتی مثل «تو دختر خوبی هستی» یا «تو پسر شیطانی هستی» برای کودک واضح نیست. در تعاریفتان از رفتار کودک، شفاف باشید.
- هرگاه ممکن بود از پیامدهای منطقی استفاده کنید. برای کودکان توضیح دهید که هر رفتاری چه پیامدهایی دارد و با او در این باره صحبت کنید.
- متناسب با کودکان نوع رفتار تادیبی خود را مشخص کنید. از رفتارهای انضباطی برای تنبیه او استفاده نکنید، برای آموزش او استفاده کنید.

اعتماد به نفس

- در مورد پیشرفت‌ها و توانایی‌های کودکان، حمایت، توجه و اشتیاق نشان دهید.
- یک برنامه زمان بندی از کارهای ساده‌ای که او می‌تواند انجام دهد مثل: تمیز کردن اتاقش، کمک کردن در چیدن میز و ... تهیه کنید. یک سیستم پاداش داشته باشید، انعطاف پذیر باشید، ولی انتظارات و توقعاتتان ثابت باشد. از غذا بعنوان پاداش استفاده نکنید.

مراقبت از دندان‌ها

- به کودکان آموزش دهید که چگونه دندان‌هایش را مسواک کند. از یک مسواک نرم استفاده کنید. کودکان باید هر روز، ترجیحاً قبل از خواب مسواک بزنند.
- از دندانپزشک در مورد مراقبت‌هایی که برای محافظت از سطح جویدنی دندان‌های آسیا عقبی در برابر ایجاد حفره مورد نیاز است سوال کنید.
- قرارهای منظمی با دندانپزشک داشته باشید. (ممکن است کودکان به استفاده از فلوراید نیاز داشته باشند) به کودکان کمک کنید که دندان‌هایش را دو بار در روز، بعد از صبحانه و قبل از خواب مسواک بزنند.
- به اندازه یک نخود از خمیردندان فلورایددار استفاده کنید.
- به کودکان کمک کنید که روزی یک بار از نخ دندان استفاده کند.
- کودک شما باید حداقل سالی یکبار پیش دندانپزشک برود.
- ۶ ماه یکبار برای کودک واریش فلوراید انجام شود. در این سن نیز مراقب سلامت / بهورز برای او واریش فلوراید انجام می‌دهد.

غربالگری چشم

- اگر تاکنون برای او غربالگری بینایی از نظر تنبلی چشم انجام نشده است در این سن برای او انجام دهید، برای این کار به مراکز دائمی غربالگری تنبلی چشم مراجعه کنید.

تماشای تلویزیون:

- زمان دیدن برنامه های با کیفیت تلویزیون و بازی های کامپیوتری را به ۱ تا ۲ ساعت در روز محدود کنید.
- در اتاق کودکان تلویزیون نباشد، به همراه کودکان تلویزیون تماشا کنید و مراقب استفاده او از اینترنت باشید.

آماده شدن برای مدرسه

- در مورد پیش دبستانی با او صحبت کنید.
- مطمئن شوید که کودکان بعد از برگشتن از پیش دبستان به همراه یک فرد بزرگسال قابل اعتماد در یک محل امن است.
- در مورد چیزهایی که کودکان دوست دارد، در مورد نگرانی ها و احیانا فردی که رفتارش با او مهربانانه نیست با او صحبت کنید.
- زمان مراقبت بعدی کودک شما ۶ سالگی است
- مراقبت بعدی کودک برای ورود به مدرسه انجام خواهد شد.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

ISBN 978-964-01-1254-8



ISBN 978-964-01-1254-8



9789640112548



پایش مراقبت کودک دختر

در هر مراجعه به واحد بهداشتی درمانی / مطب / مرکز غربالگری کارت مراقبت کودک را به همراه داشته باشید.



نام و نام خانوادگی کودک:

تاریخ تولد: روز..... ماه..... سال.....

کد ملی کودک:

کد ملی سرپرست کودک:

مشخصات زمان تولد: وزن.....قد.....دور سر.....

هفته بارداری هنگام زایمان:

تلفن تماس:

تاریخ مراجعه بعدی: روز..... ماه..... سال.....

- برای غربالگری پس از تولد، روز سوم تا پنجم به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه سلامت / خانه بهداشت محل زندگی خود مراجعه کنید.
- در سنین ۳ تا ۵ روزگی، ۲ هفتگی، ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ ماهگی، ۲، ۳/۵، ۴، ۳ و ۵ سالگی برای مراقبت کودک خود مراجعه کنید.
- شیرمادر هیچ جایگزینی ندارد. تا پایان ۶ ماهگی کودکان را فقط با شیرمادر تغذیه کنید و پس از آن مطابق توصیه های تغذیه ای، غذای کمکی را شروع کرده و شیرمادر را تا ۲ سالگی ادامه دهید.
- در سنین ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی برای واکسیناسیون کودک خود مراجعه کنید.
- به علائم هشدار دهنده تکامل کودک در سنین مختلف توجه کنید.
- به توصیه های مراقبت از تکامل کودک عمل کنید.
- پرسشنامه غربالگری تکامل ASQ را در سنین ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۶۰ ماهگی کودکان از پزشک / مراقب سلامت / بهورز دریافت کنید. بعد از تمرین مناسب با کودکان، به سوالات این پرسشنامه به دقت پاسخ دهید و سپس تحویل دهید.

غربالگری های کودک

نام یا مهر غربالگر	نیازمند ارجاع	نتیجه غربالگری	تاریخ انجام غربالگری	آزمون غربالگر
				هیپوتیروئیدی
				فنیل کتونوری
				شنوایی
				بینایی
				معاینه چشم (رتینوپاتی نوزادی / ROP) برای کودکانی که با وزن ۲۰۰۰ گرم و کمتر متولد شده اند.

پرسشنامه ASQ	۶ ماهگی	۱۲ ماهگی	۲۴ ماهگی	۳۶ ماهگی	۶۰ ماهگی
نمره حیطة ارتباط					
نمره حیطة حرکات درشت					
نمره حیطة حرکات ظریف					
نمره حیطة حل مسئله					
نمره حیطة شخصی - اجتماعی					
وجود نگرانی در قسمت کلیات					
نمره SE:ASQ					
کودک نیازمند ارجاع					

با واکسیناسیون به موقع، سلامت کودک خود را تضمین کنید.

جدول راهنمای واکسیناسیون

نوع واکسن	سن	نوع واکسن	سن
MMR	۱۲ ماهگی	ب ب ث ژ - فلج اطفال خوراکی - هیپاتیت ب	بدو تولد
سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی - MMR	۱۸ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه *	۲ ماهگی
سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی	۶ سالگی **	فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه - فلج اطفال تزریقی	۴ ماهگی
		فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه - فلج اطفال تزریقی	۶ ماهگی

توضیحات: * واکسن پنج‌گانه شامل دیفتتری، کزاز، سیاه‌سرفه، هیپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب می‌باشد.
** پس از آخرین نوبت واکسن سه‌گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان باید تزریق شود.

جدول تقویم واکسیناسیون

نام یا مهر واکسیناتور	سریال واکسن	تاریخ مراجعه	نوع واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	سریال واکسن	تاریخ مراجعه	نوع واکسن
			بار اول	پنج‌گانه (DTP-B-Hib)			بدو تولد
			بار دوم				بدو تولد
			بار سوم	سه‌گانه (DTP/DT) توأم خردسال			بار اول
			بار اول				بار دوم
			بار دوم				بار سوم
			بار اول		سه‌گانه، سرخه، (MMR) اوپیون		
			بار دوم				یادآور ۲
			بدو تولد	هیپاتیت ب (Hep-B)			بار اول
							بار دوم

• سرماخوردگی یا اسهال خفیف مانع انجام به موقع واکسیناسیون نیست.

• قبل از ترک مرکز تاریخ واکسیناسیون بعدی را سوال کنید. پس از انجام واکسیناسیون حداقل ۲۰ دقیقه در مرکز واکسیناسیون حضور داشته باشید.

• جهت تسکین درد، بی‌قراری یا تب راهنمایی لازم را از واکسیناتور سوال فرمایید. در صورت تب بالا یا هرگونه عارضه شدید یا غیرمعمول به واحد ارائه خدمات بهداشتی درمانی مراجعه فرمایید.

بلند تابان شدن ماهگی

عید تعمیری یا اسپهبد
پایانی شمایل و قاضی
شیرخوار ۱۴۵۸ هجری قمری
۲۰ روز



شیر مادر
۲ تا ۴ بار
در شبانه روز



قطره آرد

- شیر مادر به تنهایی تا پایان ماه ششم زندگی برای تغذیه شیرخوار کافی است، ۲ تا ۳ سالگی ادامه دهید.
- از ۶ ماهگی تا پایان یک سالگی ابتدا کودکان را با شیر مادر تغذیه کنید و سپس به او غذا بدهید.
- تغذیه تکمیلی را از یک نوع ماده غذایی به مقدار ۲ تا ۴ قاشق مرباخوری ۲ بار در روز شروع کنید و سپس این مقدار را به نصف لیوان برسانید.
- اضافه کردن هر ماده غذایی جدیدی را طی ۵ روز انجام دهید.
- از ۳ به زور غذا دادن به کودکان "پرهیز کنید".

شروع ماه هفتم تا پایان ماه دهم

پایان کیهان - ۱۴۵۸ هجری قمری

خروج ماه شمایل تا پایان ماه ششم، شیر مادر، غذای کمکی که با ۲ تا ۴ قاشق مرباخوری ۲ بار در روز شروع شده و به تدریج بر حسب نیاز شیر مادر و وضعیت آن افزایش پیدا می کند، ۲ تا ۴ میان وعده غذایی
شروع ماه تابان تا پایان ماه دهم، شیر مادر، غذای کمکی ۲ تا ۳ وعده در هر وعده نصف لیوان ۱۰۰ سی سی، غذای به اندازه ماه دهم
قبل از ماه به نشود، غذای تکمیلی، غذای با افزودن گوشت کمپخت، از دادن غذای گوشت پخت با عطر غذایی
پرهیز کنید، ۱ تا ۲ میان وعده



قطره آهن
قطره آرد
یا مویز و زعفران



آب جوشیده
سود شده
عشبان
با شکر و عسل تکمیلی



فرنی آرد برنج



آرد برنج
۲ قاشق مرباخوری
هر قاشق ۵ سی سی



شیر پاستوریزه
۱۰ سی سی



خرما
پادام



آرد برنج
۲ قاشق مرباخوری
هر قاشق ۵ سی سی



پادام
۵ عدد



شیر پاستوریزه
۱۰ سی سی



پوره انواع سبزی



انواع کدو



هونج



سبب زنجبی



نخود فرنگی



روغن مایع یا کره
۱ قاشق مرباخوری
۵ سی سی



شیر پاستوریزه
۵ قاشق غذاخوری



زرده و سفیده
تخم مرغ
پخته و سفت شده



سوپه
۱ قاشق غذاخوری



برنج



حبوبات تخمسی، ماش و ...
انواع جوانه ها
بلغور گندم، رشته فرنگی، جو سوخته و ...



سویا یا مایند هونج، جعفری، شوید، کدو، کرفس و انواع کدوها
لوبیا سبز و ...



گوشت فرمز یا سفید
یا گوشت سفید مرغ یا ماهی و ...
خوب پخته و نرم شده



روغن مایع یا کره
۱ قاشق مرباخوری
۵ سی سی



گوشت فرمز یا سفید
یا گوشت سفید مرغ یا ماهی و ...
خوب پخته و نرم شده



گوشت فرمز یا سفید
یا گوشت سفید مرغ یا ماهی و ...
خوب پخته و نرم شده



روغن مایع یا کره
۱ قاشق مرباخوری
۵ سی سی



انواع کته



برنج



گوشت فرمز یا سفید



انواع ماکارونی



گوشت فرمز یا سفید



گوشت فرمز یا سفید



گوشت فرمز یا سفید



گوشت فرمز یا سفید



گوشت فرمز یا سفید



میوه و تنه ها
پوره میوه های رسیده و نرم



ماست پاستوریزه
پرچرب



پوره سبب زنجبی



نان و شیر پاستوریزه
که نمک گرفته شده



خرما پوست
گرفته شده



خرما پوست
گرفته شده



خرما پوست
گرفته شده



خرما پوست
گرفته شده



خرما پوست
گرفته شده



شروع دوازده ماهگی تا پایان پنج سالگی



- شیر مادر را بر طبق میل کودک تا ۲ سالگی ادامه دهید. تا پایان ۱۲ ماهگی ابتدا شیر مادر و سپس غذای کمکی بدهید و پس از آن ابتدا به کودک تان غذا بدهید و سپس او را با شیر مادر تغذیه کنید.
- از «به زور غذا دادن به کودک تان» پرهیز کنید.
- غذاهای متنوع شامل لبنیات، گوشت، میوه و سبزی، غلات و حبوبات بدهید.
- تا ۲ سالگی لبنیات پر چرب و پس از آن لبنیات کم چرب بدهید.
- طی روز آب تمیز و سالم به کودک بدهید.
- سه تا چهار نوبت در روز و هر نوبت تقریباً به اندازه یک لیوان به کودک غذا بدهید. (معدۀ کودک کوچک است و نیاز به دفعات بیشتری برای تغذیه دارد.)
- یک تا دو بار میان وعده مغذی در بین وعده های اصلی غذا به او بدهید.
- قطره ویتامین و آهن را تا پایان ۲ سالگی ادامه دهید.
- زمان غذا خوردن کنار کودک تان باشید.
- غذا را در قطعات کوچک آماده کرده و به کودک بدهید «تا بتواند خودش آن ها را بخورد»
- همیشه پیش از تهیه غذا و قبل از دادن غذا به کودک، دست های خود را با آب و صابون بشویید.
- پیش از دادن غذا به کودک دست و صورت او را بشویید و از ظرف و قاشق تمیز و جداگانه برای کودک استفاده کنید.
- دادن غذاهای آماده و تجارتي به کودک ضرورت ندارد، غذاهای خانگی مناسب هستند. از غذای سفره خانواده به کودک بدهید.
- به کودک تان آب میوه و نوشیدنی های تجارتي ندهید. این ها ارزش غذایی نداشته و به رشد کودک کمک نمی کنند.
- به کودک تان غذاهای غیر سالم مانند چیپس و پفک ندهید.

علائم هشدار دهنده تکامل

۹ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • به صداهای بلند پاسخ نمی دهد. • اشیای در حال حرکت را با نگاه دنبال نمی کند. • به اشخاص لبخند نمی زند. • دستش را به دهان نمی برد. • وقتی روی شکم خوابیده و او را از زمین بلند می کنیم نمی تواند سرش را بالا بیاورد. • مکیدن یا بلعیدن ضعیف دارد. 	۲ ماهگی
۱ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند سرش را ثابت نگه دارد. • نمی تواند بغضو کند یا صداهای دیگری با دهانش تولید کند. • وقتی او را به حالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار دهیم، نمی تواند با پاهایش به سمت پایین فشار وارد کند. • نمی تواند یک یا هر دو چشمش را در همه جهات حرکت دهد. 	۴ ماهگی
۱۸ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • تلاش نمی کند که دستش را به اشیایی که در دسترس قرار دارند برساند. • توجهی به مراقب خود نمی کند. • به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی دهد. • به هیچ طرف غلت نمی زند. • نمی خندد یا جیغ نمی کشد. • عضلاتش به نظر خیلی سفت می رسد. • عضلاتش به نظر خیلی شل است (مثل یک عروسک پارچه ای) 	۶ ماهگی
	<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند با کمک بنشیند. • غان و غون نمی کند (درآوردن صداهایی مانند «ماما»، «بابا»، «دادا») • در هیچ نوع بازی از جمله بازی تعاملی شرکت نمی کند. • با شنیدن اسم خودش، پاسخی نمی دهد. • به نظر نمی رسد افراد آشنا را از غریبه ها تشخیص دهد. • به طرفی که شما اشاره می کنید نگاه نمی کند. • اشیاء را دست به دست نمی کند. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند چهار دست و پا برود. • نمی تواند با کمک بایستد. • برای پیدا کردن اشیایی که می بیند شما آن ها را پنهان می کنید تلاش نمی کند. • کلمه کوتاه مثل ماما یا بابا را نمی گوید. • بای بای یا سرسری کردن را یاد نمی گیرد. • به اشیاء اشاره نمی کند. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می دهد. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • با اشاره کردن به سمت اشیاء، آن ها را به دیگران نشان نمی دهد. • نمی تواند راه برود. • موارد کاربرد اشیای آشنا را نمی داند. • نمی تواند کارهای دیگران را تقلید کند. • کلمات جدید را یاد نمی گیرد. • نمی تواند حداقل ۶ کلمه بگوید. • وقتی مراقب او را ترک می کند یا پیش او برمی گردد، توجه نمی کند یا اهمیت نمی دهد. • مهارت هایی را که قبلا به دست آورده بود از دست می دهد. 	

علائم هشدار دهنده تکامل

<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند درجا بپرد. • سایر کودکان را نادیده می‌گیرد یا به افرادی غیر از اعضای خانواده ، پاسخ نمی‌دهد. • در مقابل لباس پوشیدن ، خوابیدن یا دستشویی رفتن مقاومت می‌کند. • نمی‌تواند یک داستان مورد علاقه اش را بازگویی کند. • نمی‌تواند از دستورات ۳ مرحله ای پیروی کند. • مفهوم «همان / مشابه» و «متفاوت» را درک نمی‌کند. • از ضمائر من و تو درست استفاده نمی‌کند. • گفتار واضحی ندارد. • مهارت هایی را که قبلا به دست آورده بود از دست می‌دهد. 	۴ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • از عبارت های ۲ کلمه ای استفاده نمی‌کند (مثلا: شیر می خورم) • کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک، تلفن یا قاشق و چنگال را نمی‌داند. • قادر به انجام دستورات ساده نیست. • خودش به تنهایی راه نمی‌رود. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می‌دهد. 	۲ سالگی
<ul style="list-style-type: none"> • نمی‌تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد. • رفتارهای افراطی از خود نشان می‌دهد مثل حالت‌های غیرمعمول ترس، خجالت، افسردگی یا رفتار تهاجمی • معمولا گوشه‌گیر و غیرفعال است. • براحتی حواسش پرت می‌شود و نمی‌تواند بیش از ۵ دقیقه روی یک موضوع تمرکز کند. • به مردم پاسخ نمی‌دهد یا پاسخ سرسری می‌دهد. • قادر به انجام بسیاری از بازی‌ها و فعالیت‌ها نیست. • نمی‌تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید. • نمی‌تواند افعال جمع یا گذشته را درست بکار ببرد. • نمی‌تواند در مورد فعالیت‌های روزانه یا تجاربش صحبت کند. • نمی‌تواند نقاشی بکشد. • نمی‌تواند بدون کمک دندانش را مسواک کند، دست و صورتش را بشوید و خشک کند یا لباس بپوشد. • مهارت‌هایی که قبلا کسب کرده را از دست می‌دهد. 	۵ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • زیاد زمین می‌خورد یا نمی‌تواند از پله استفاده کند. • آبریزش دهان دارد یا گفتارش خیلی نامفهوم است. • نمی‌تواند با اسباب بازی‌های ساده مانند جورچین ساده بازی کند. • نمی‌تواند جمله بگوید. • بازی تخیلی نمی‌کند یا آن‌ها را باور می‌کند. • نمی‌خواهد با سایر کودکان یا اسباب بازی‌ها بازی کند. • تماس چشمی برقرار نمی‌کند. • مهارت‌هایی را که قبلا کسب کرده از دست می‌دهد. 	۳ سالگی

توصیه های ارتقای تکامل کودک

تولد تا یک هفته	۱ هفته تا ۶ ماه	۶ ماه تا ۹ ماه	۹ ماه تا ۱۲ ماه	۱۲ ماه تا ۲ سال	۲ سال و بزرگتر
<p>کودک شما از زمان تولد در حال یادگیری است</p>  <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)</p>	 <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)</p>	 <p>بازی: وسایل خانگی تمیز و بی خطری را به کودک خود بدهید تا دستکاری کند، به هم بزند و بیاندازد (مانند ظروف درب دار، قابلمه و قاشق فلزی)</p>	 <p>بازی: چیزهایی به کودک بدهید تا روی هم بچیند و در داخل ظرف بیاندازد و در بیاورد. نمونه اسباب بازی: اشیایی که داخل هم یا روی هم می گذارند، ظرف و گیره های لباس.</p>	 <p>بازی: به کودک کمک کنید تا اشیای را بشمارد، نام و مقایسه کند. برای او اسباب بازی های ساده بسازید. مثلاً اشیایی با رنگ ها و شکل های متفاوت برای دسته بندی، بر چسب یا تخته وایت برد و پازل.</p>	
 <p>ارتباط برقرار کنید: به چشمان کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید. زمان تغذیه با شیر مادر فرصت خوبی است. حتی یک نوزاد هم صورت شما را می بیند و صداقتان را می شنود.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به کودک خود لبخند بزنید و بخندید. با او صحبت کنید. با تقلید صدا یا زست کودکان با او مکالمه کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به صدا و علائق کودک خود پاسخ دهید. نام کودک را صدا کنید و پاسخ او را ببینید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: نام اشیای و افراد را به کودک بگویید. به او یاد بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بگوید. نمونه اسباب بازی: عروسکی با صورت</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: سوالات ساده از کودک بپرسید. به تلاش های کودک خود در صحبت کردن جواب بدهید. اشیای، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهید و درباره آن ها با او صحبت کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: او را تشویق کنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهید. به کودکان داستان، آواز و بازی یاد بدهید. در مورد تصاویر یا کتاب ها با او صحبت کنید. نمونه اسباب بازی: کتاب شکل دار</p>


به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به او نشان دهید.

از علائق کودک خود مطلع شوید و به آن ها پاسخ دهید.


تلاش کودکان را در یادگیری مهارت های جدید تحسین کنید.

نمودار دور سر برای سن از تولد تا ۲ سالگی (z-score) دختر


دور سر (سانتی متر)



نمودار وزن برای قد از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) دختر



نمودار قد برای سن از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) دختر



نمودار وزن برای سن دختر از تولد تا ۵ سالگی (z-score)

وزن (کیلوگرم)



سن (ماه)



پایش مراقبت کودک پسر

در هر مراجعه به واحد بهداشتی درمانی/مطب/مرکز غربالگری کارت مراقبت کودک را به همراه داشته باشید.



نام و نام خانوادگی کودک:

تاریخ تولد: روز..... ماه..... سال.....

کد ملی کودک:

کد ملی سرپرست کودک:

مشخصات زمان تولد: وزن.....قد.....دور سر.....

هفته بارداری هنگام زایمان:

تلفن تماس:

تاریخ مراجعه بعدی: روز..... ماه..... سال.....

- برای غربالگری پس از تولد، روز سوم تا پنجم به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه سلامت / خانه بهداشت محل زندگی خود مراجعه کنید.
- در سنین ۳ تا ۵ روزگی، ۲ هفتگی، ۱، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ ماهگی، ۲، ۵/۲، ۳، ۴ و ۵ سالگی برای مراقبت کودک خود مراجعه کنید.
- شیرمادر هیچ جایگزینی ندارد. تا پایان ۶ ماهگی کودکان را فقط با شیرمادر تغذیه کنید و پس از آن مطابق توصیه های تغذیه ای، غذای کمکی را شروع کرده و شیرمادر را تا ۲ سالگی ادامه دهید.
- در سنین ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی برای واکسیناسیون کودک خود مراجعه کنید.
- به علائم هشدار دهنده تکامل کودک در سنین مختلف توجه کنید.
- به توصیه های مراقبت از تکامل کودک عمل کنید.
- پرسشنامه غربالگر تکامل ASQ را در سنین ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۶۰ ماهگی کودکان از پزشک / مراقب سلامت / بهورز دریافت کنید. بعد از تمرین مناسب با کودکان، به سوالات این پرسشنامه به دقت پاسخ دهید و سپس تحویل دهید.

غربالگری های کودک

نام یا مهر غربالگر	نیازمند ارجاع	نتیجه غربالگری	تاریخ انجام غربالگری	آزمون غربالگر
				هیپوتیروئیدی
				فنیل کتونوری
				شنوایی
				بینایی
				معاینه چشم (رتینوپاتی نوزادی / ROP) برای کودکانی که با وزن ۲۰۰۰ گرم و کمتر متولد شده اند.

۶۰ ماهگی	۳۶ ماهگی	۲۴ ماهگی	۱۲ ماهگی	۶ ماهگی	پرسشنامه ASQ
					نمره حیطه ارتباط
					نمره حیطه حرکات درشت
					نمره حیطه حرکات ظریف
					نمره حیطه حل مسئله
					نمره حیطه شخصی-اجتماعی
					وجود نگرانی در قسمت کلیات
					نمره ASQ:SE
					کودک نیازمند ارجاع

با واکسیناسیون به موقع، سلامت کودک خود را تضمین کنید.

جدول راهنمای واکسیناسیون

سن	نوع واکسن	سن	نوع واکسن
بدو تولد	ب ب ث ژ - فلج اطفال خوراکی - هیپاتیت ب	۱۲ ماهگی	MMR
۲ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه *	۱۸ ماهگی	سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی - MMR
۴ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه - فلج اطفال تزریقی	۶ سالگی **	سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی
۶ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه - فلج اطفال تزریقی		

توضیحات: * واکسن پنج‌گانه شامل دیفتیری، کزاز، سیاه‌سرفه، هیپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب می‌باشد.
** پس از آخرین نوبت واکسن سه‌گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان باید تزریق شود.

جدول تقویم واکسیناسیون

نوع واکسن	تاریخ مراجعه	سریال واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	نوع واکسن	تاریخ مراجعه	سریال واکسن	نام یا مهر واکسیناتور
ب ب ث ژ (BCG)	بدو تولد			بار اول			
	فلج اطفال خوراکی (OPV)	بدو تولد			بار دوم		
		بار اول			بار سوم		
		بار دوم			بار اول		
		بار سوم			بار دوم		
		یادآور ۱			بار اول		
یادآور ۲			بار دوم				
فلج اطفال تزریقی (IPV)	بار اول			بار اول			
	بار دوم			بار دوم			

• سرماخوردگی یا اسهال خفیف مانع انجام به موقع واکسیناسیون نیست.

• قبل از ترک مرکز تاریخ واکسیناسیون بعدی را سوال کنید. پس از انجام واکسیناسیون حداقل ۲۰ دقیقه در مرکز واکسیناسیون حضور داشته باشید.

• جهت تسکین درد، بی‌قراری یا تب راهنمایی لازم را از واکسیناتور سوال فرمایید. در صورت تب بالا یا هرگونه عارضه شدید یا غیر معمول به واحد ارائه خدمات بهداشتی درمانی مراجعه فرمایید.

تولید لبن‌های خش خانگی

تعبیه تصفیه‌شده یا شیرپاستوریزه با پاستوریزه و پختن و تغذیه‌ی شیرمادر ۲ تا ۳ بار در روز مناسب است.



شیر مادر
۲ تا ۳ بار
در شبانه روز



قطره آرد

- شیرمادر به تنهایی تا پایان ماه ششم زندگی برای تغذیه شیرخوار کافی است. تا ۶ سالگی ادامه دهید.
- از ۶ ماهگی تا پایان یک سالگی ابتدا کودکان را با شیرمادر تغذیه کنید و سپس به او غذا بدهید.
- تغذیه تکمیلی با از یک نوع ماده غذایی به مقدار ۴ تا ۵ قاشق مرباخوری ۲ بار در روز شروع کنید و سپس این مقدار را به نصف لیوان برسانید.
- آماده کردن هر ماده غذایی جدیدی را طی ۵ روز انجام دهید.
- از ۱۲ به زود غذا دادن به کودکان "پرهیز کنید".

شروع ماه هفتم تا پایان ماه دهم

شروع به غذاهای پختنی، شیر مادر، غذای خشکی که با ۱ تا ۲ قاشق مرباخوری ۲ بار در روز شروع شده و به تدریج بر حسب سن شروع بخور مناسب و تعداد آن افزایش پیدا می‌کند. ۲ تا ۳ لیوان وعده غذایی شویخ به تنهایی تا پایان ماه دهم، شیر مادر، غذای خشکی ۲ تا ۳ وعده و هر وعده نصف لیوان ۲ تا ۳ سی. غذاهای به اندازه ماهی قبل از یک ماه به تنهایی غذاهای رنگدگشی، آبغذاها یا قطعات کوچک، به کودکان بدهید. از دادن غذاهای کوچک سفت یا قطعه خشکی پرهیز کنید. ۲ تا ۳ لیوان وعده



قطره آهن
قطره آرد
با موافق و تأیید



آب جوشیده سرد شده
مهربان
با سرخ تغذیه تکمیلی



فرنی آرد برنج



۲) قاشق مرباخوری آرد برنج
۳) شیر پاستوریزه جربجرب
۴) ۳ سی سی



جوینده



۲) قاشق مرباخوری آرد برنج
هر قاشق ۵ سی سی



پادام



شیر پاستوریزه جربجرب
۱۲ سی سی



پوره انواع سبزی



انواع کدو



خوج



سبب زمینی



نخود فرنگی



۱) قاشق مرباخوری روغن مایع یا کره
۲) ۵ قاشق غذاخوری شیر پاستوریزه



زرده و سفیده تخم مرغ پخته و سفت شده



سوپ، ا قاشق غذاخوری برنج



حیوانات دانسی، مانی ... انواع جوانه ها
بلغور گندم، رشته فرنگی، جو سوخته و ...



سبزی ها مانند خوج، جعفری، شنبلیله، کلمبر، کرفس و انواع کدوها گوناگون و ...



گوشت فریز گوشت گوسفند و ... یا گوشت سفید مرغ یا ماهی و ... خوب پخته و نرم شده



۲) ۵ قاشق مرباخوری روغن مایع یا کره



انواع کته، برنج



گوشت فریز یا سفید



انواع ماکارونی



حیوانی و غذاهای پخته، پوره میوه های رسیده و نرم



پاستوریزه جربجربجرب



پوره سبب زمینی



نارنج و شیر برنج



خرماهای پوست گرفته شده



شروع دوازده ماهگی تا پایان پنج سالگی



- شیر مادر را بر طبق میل کودک تا ۲ سالگی ادامه دهید. تا پایان ۱۲ ماهگی ابتدا شیرمادر و سپس غذای کمکی بدهید و پس از آن ابتدا به کودک تان غذا بدهید و سپس او را با شیرمادر تغذیه کنید.
- از «به زور غذا دادن به کودک تان» پرهیز کنید.
- غذاهای متنوع شامل لبنیات، گوشت، میوه و سبزی، غلات و حبوبات بدهید.
- تا ۲ سالگی لبنیات پرچرب و پس از آن لبنیات کم چرب بدهید.
- طی روز آب تمیز و سالم به کودک بدهید.
- سه تا چهار نوبت در روز و هر نوبت تقریباً به اندازه یک لیوان به کودک غذا بدهید. (معده کودک کوچک است و نیاز به دفعات بیشتری برای تغذیه دارد.)
- یک تا دو بار میان وعده مغذی در بین وعده های اصلی غذا به او بدهید.
- قطره ویتامین و آهن را تا پایان ۲ سالگی ادامه دهید.
- زمان غذا خوردن کنار کودک تان باشید.
- غذا را در قطعات کوچک آماده کرده و به کودک بدهید «تا بتواند خودش آن ها را بخورد»
- همیشه پیش از تهیه غذا و قبل از دادن غذا به کودک، دست های خود را با آب و صابون بشویید.
- پیش از دادن غذا به کودک دست و صورت او را بشویید و از ظرف و قاشق تمیز و جداگانه برای کودک استفاده کنید.
- دادن غذاهای آماده و تجارتي به کودک ضرورت ندارد، غذاهای خانگی مناسب هستند. از غذای سفره خانواده به کودک بدهید.
- به کودک تان آب میوه و نوشیدنی های تجارتي ندهید. این ها ارزش غذایی نداشته و به رشد کودک کمک نمی کنند.
- به کودک تان غذاهای غیر سالم مانند چیپس و پفک ندهید.

علائم هشدار دهنده تکامل

۹ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • به صداهای بلند پاسخ نمی‌دهد. • اشیای در حال حرکت را با نگاه دنبال نمی‌کند. • به اشخاص لبخند نمی‌زند. • دستش را به دهان نمی‌برد. • وقتی روی شکم خوابیده و او را از زمین بلند می‌کنیم نمی‌تواند سرش را بالا بیاورد. • مکیدن یا بلعیدن ضعیف دارد. 	۲ ماهگی	
۱ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • نمی‌تواند سرش را ثابت نگه دارد. • نمی‌تواند بغبغو کند یا صداهای دیگری با دهانش تولید کند. • وقتی او را به حالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار دهیم، نمی‌تواند با پاهایش به سمت پایین فشار وارد کند. • نمی‌تواند یک یا هر دو چشمش را در همه جهات حرکت دهد. 	۴ ماهگی	
۱۸ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • با اشاره کردن به سمت اشیاء، آن‌ها را به دیگران نشان نمی‌دهد. • نمی‌تواند راه برود. • موارد کاربرد اشیای آشنا را نمی‌داند. • نمی‌تواند کارهای دیگران را تقلید کند. • کلمات جدید را یاد نمی‌گیرد. • نمی‌تواند حداقل ۶ کلمه بگوید. • وقتی مراقب او را ترک می‌کند یا پیش او برمی‌گردد، توجه نمی‌کند یا اهمیت نمی‌دهد. • مهارت‌هایی را که قبلاً به دست آورده بود از دست می‌دهد. 	<ul style="list-style-type: none"> • تلاش نمی‌کند که دستش را به اشیایی که در دسترس قرار دارند برساند. • توجهی به مراقب خود نمی‌کند. • به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی‌دهد. • به هیچ طرف غلت نمی‌زند. • نمی‌خندد یا جیغ نمی‌کشد. • عضلاتش به نظر خیلی سفت می‌رسد. • عضلاتش به نظر خیلی شل است (مثل یک عروسک پارچه‌ای) 	۶ ماهگی

علائم هشدار دهنده تکامل


	۴ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • از عبارت های ۲ کلمه ای استفاده نمی کند (مثلا: شیر می خورم) • کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک، تلفن یا قاشق و چنگال را نمی داند. • قادر به انجام دستورات ساده نیست. • خودش به تنهایی راه نمی رود. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می دهد.
<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند درجا بپرد. • سایر کودکان را نادیده می گیرد یا به افرادی غیر از اعضای خانواده، پاسخ نمی دهد. • در مقابل لباس پوشیدن، خوابیدن یا دستشویی رفتن مقاومت می کند. • نمی تواند یک داستان مورد علاقه اش را بازگویی کند. • نمی تواند از دستورات ۳ مرحله ای پیروی کند. • مفهوم «همان / مشابه» و «متفاوت» را درک نمی کند. • از ضمائر من و تو درست استفاده نمی کند. • گفتار واضحی ندارد. • مهارت هایی را که قبلا به دست آورده بود از دست می دهد. 	۵ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • زیاد زمین می خورد یا نمی تواند از پله استفاده کند. • آبریزش دهان دارد یا گفتارش خیلی نامفهوم است. • نمی تواند با اسباب بازی های ساده مانند جورچین ساده بازی کند. • نمی تواند جمله بگوید. • بازی تخیلی نمی کند یا آن ها را باور می کند. • نمی خواهد با سایر کودکان یا اسباب بازی ها بازی کند. • تماس چشمی برقرار نمی کند. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می دهد.
<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد. • رفتارهای افراطی از خود نشان می دهد مثل حالت های غیرمعمول ترس، خجالت، افسردگی یا رفتار تهاجمی • معمولا گوشه گیر و غیرفعال است. • براحتی حواسش پرت می شود و نمی تواند بیش از ۵ دقیقه روی یک موضوع تمرکز کند. • به مردم پاسخ نمی دهد یا پاسخ سرسری می دهد. • قادر به انجام بسیاری از بازی ها و فعالیت ها نیست. • نمی تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید. • نمی تواند افعال جمع یا گذشته را درست بکار ببرد. • نمی تواند در مورد فعالیت های روزانه یا تجاربش صحبت کند. • نمی تواند نقاشی بکشد. • نمی تواند بدون کمک دندانش را مسواک کند، دست و صورتش را بشوید و خشک کند یا لباس بپوشد. • مهارت هایی که قبلا کسب کرده را از دست می دهد. 		

توصیه های ارتقای تکامل کودک


تولد تا یک هفته	۱ هفته تا ۶ ماه	۶ ماه تا ۹ ماه	۹ ماه تا ۱۲ ماه	۱۲ ماه تا ۲ سال	۲ سال و بزرگتر
<p>کودک شما از زمان تولد در حال یادگیری است</p>  <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)</p>	 <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)</p>	 <p>بازی: وسایل خانگی تمیز و بی خطری را به کودک خود بدهید تا دستکاری کند، به هم بزند و بیاندازد (مانند ظروف درب دار، قابلمه و قاشق فلزی)</p>	 <p>بازی: اسباب بازی مورد علاقه کودک را زیر پارچه یا جعبه پنهان کنید. ببینید آیا می تواند آن را پیدا کند. با کودک خود دالی موشه بازی کنید.</p>	 <p>بازی: چیزهایی به کودک بدهید تا روی هم بچیند و داخل ظرف بیاندازد و در بیاورد. نمونه اسباب بازی: اشیایی که داخل هم یا روی هم می گذارند، ظرف و گیره های لباس.</p>	 <p>بازی: به کودک کمک کنید تا اشیای را بشمارد، نام ببرد و مقایسه کند. براد او اسباب بازی های ساده بسازید. مثلاً اشیایی با رنگ ها و شکل های متفاوت برای دسته بندی، بر چسب یا تخته وایت برد و پازل.</p>
 <p>ارتباط برقرار کنید: به چشمان کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید. زمان تغذیه با شیر مادر فرصت خوبی است. حتی یک نوزاد هم صورت شما را می بیند و صداپتان را می شنود.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به کودک خود لبخند بزنید و بخندید. با او صحبت کنید. با تقلید صدا یا زست کودکان با او مکالمه کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به صدا و علائق کودک خود پاسخ دهید. نام کودک را صدا کنید و پاسخ او را ببینید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: نام اشیای و افراد را به کودک بگویید. به او یاد بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بگوید. نمونه اسباب بازی: عروسکی با صورت</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: سوالات ساده از کودک بپرسید. به تلاش های کودک خود در صحبت کردن جواب بدهید. اشیای، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهید و درباره آن ها با او صحبت کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: او را تشویق کنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهید. به کودکان داستان، آواز و بازی یاد بدهید. در مورد تصاویر یا کتاب ها با او صحبت کنید. نمونه اسباب بازی: کتاب شکل دار</p>
<p>به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به او نشان دهید. از علائق کودک خود مطلع شوید و به آن ها پاسخ دهید. تلاش کودکان را در یادگیری مهارت های جدید تحسین کنید.</p>					

نمودار دور سر برای سن از تولد تا ۲ سالگی (Z-score) پسر

دور سر (سانتی متر)




نمودار وزن برای قد از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) پسر




نمودار قد برای سن از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) پر

قد (سانتی متر)



سن (ماه)

نمودار وزن برای سن پسر از تولد تا ۵ سالگی (z-score)



سن (ماه)



پایش مراقبت کودک دختر*

در هر مراجعه به واحد بهداشتی درمانی/ مطب/ مرکز غربالگری کارت مراقبت کودک را به همراه داشته باشید.



نام و نام خانوادگی کودک:

تاریخ تولد: روز..... ماه..... سال.....

کد ملی کودک:

کد ملی سرپرست کودک:

مشخصات زمان تولد: وزن..... قد..... دور سر.....

هفته بارداری هنگام زایمان:

تلفن تماس:

تاریخ مراجعه بعدی: روز..... ماه..... سال.....

- غربالگری پس از تولد، روز سوم تا پنجم انجام می شود و تکرار آن در ۲، ۶ و ۱۰ هفتگی پس از تولد انجام می شود.
- در صورت ترخیص، نوزادان تا رسیدن به وزن ۲۰۰۰ گرم، هفتگی مراقبت شوند و پس از آن در ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ ماهگی و سپس در ۲، ۲/۵، ۳، ۴ و ۵ سالگی برای مراقبت کودک مراجعه کنید.
- در سنین ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی برای واکسیناسیون کودک خود مراجعه کنید.

- شیرمادر هیچ جایگزینی ندارد. تا پایان ۶ ماهگی کودکان را فقط با شیرمادر تغذیه کنید و پس از آن مطابق توصیه های تغذیه ای، غذای کمکی را شروع کرده و شیرمادر را تا دو سالگی ادامه دهید.
- به علائم هشدار دهنده تکامل کودک در سنین مختلف توجه کنید.
- به توصیه های مراقبت از تکامل کودک عمل کنید.
- پرسشنامه غربالگری تکامل ASQ را در سنین اصلاح شده ۲، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴، ۳۶، ۴۸ و ۶۰ ماهگی کودکان از پزشک / مراقب سلامت / بهورز دریافت کنید. بعد از تمرین مناسب با کودکان طبق بروشورهای دریافتی، به سوالات پرسشنامه به دقت پاسخ دهید و سپس تحویل دهید.
- سن اصلاح شده کودک را از پزشک / مراقب سلامت / بهورز سوال کنید.
- مکان نگهداری نوزاد در منزل کم نور، دنج و بدون سرو صدا باشد.
- از کارهای پرسر و صدا بر بالین نوزاد خودداری نمایید.
- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد باعث دلبستگی مادرانه، افزایش قابل توجه شیرمادر، کاهش اضطراب مادر، افزایش رشد شناختی شیرخوار، تنظیم دمای بدن، تنفس و ضربان قلب نوزاد، ارتباط متقابل مادر و شیرخوار و در نهایت سرعت رشد جسمی، ارتقای تکامل و شکوفایی استعداد های بالقوه شیرخوار می شود.

غربالگری های کودک

نام یا مهر غربالگر	نیازمند ارجاع	نتیجه غربالگری	تاریخ انجام غربالگری	آزمون غربالگر
				هیپوتیروئیدی
				فنیل کتونوری
				شنوایی
				بینایی
				معاینه چشم (رتینوپاتی نوزادی / ROP)

۶۰ ماهگی	۴۸ ماهگی	۳۶ ماهگی	۲۴ ماهگی	۱۸ ماهگی	۱۲ ماهگی	۹ ماهگی	۶ ماهگی	۲ ماهگی	پرسشنامه ASQ
									نمره حیطة ارتباط
									نمره حیطة حرکات درشت
									نمره حیطة حرکات ظریف
									نمره حیطة حل مسئله
									نمره حیطة شخصی- اجتماعی
									وجود نگرانی در قسمت کلیات
									نمره ASQ:SE
									کودک نیازمند ارجاع

با واکسیناسیون به موقع، سلامت کودک خود را تضمین کنید.

جدول راهنمای واکسیناسیون

نوع واکسن	سن	نوع واکسن	سن
MMR	۱۲ ماهگی	ب ث ژ* - فلج اطفال خوراکی - هیپاتیت ب	بدو تولد
سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی - MMR	۱۸ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه**	۲ ماهگی
سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی	۶ سالگی**	فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه - فلج اطفال تزریقی	۴ ماهگی
		فلج اطفال خوراکی - پنج‌گانه - فلج اطفال تزریقی	۶ ماهگی

توضیحات: * پس از رسیدن وزن شیرخوار به ۱۵۰۰ گرم واکسن ب ث ژ تلقیح شود. ** واکسن پنج‌گانه شامل دیفتیری، کزاز، سیاه‌سرفه، هیپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ ب می‌باشد. *** پس از آخرین نوبت واکسن سه‌گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان باید تزریق شود. توصیه می‌شود برای شیرخواران و خانواده آن‌ها که در فصول سرد سال به ۶ ماهگی رسیدند واکسن آنفلوآنزا تزریق شود.

جدول تقویم واکسیناسیون

نام یا مهر واکسیناتور	سریال واکسن	تاریخ مراجعه	نوع واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	سریال واکسن	تاریخ مراجعه	نوع واکسن
			بار اول	پنج‌گانه (DTP-Hep-B-Hib)			بدو تولد
			بار دوم				بدو تولد
			بار سوم	سه‌گانه (DTP/DT) تولم خردسال			بار اول
			بار اول				بار دوم
			بار دوم				بار سوم
			بار اول		سرخک، سرخچه، اوریون (MMR)		
			بار دوم				یادآور ۲
			بدو تولد	هیپاتیت ب (Hep-B)			بار اول
							بار دوم

• سرماخوردگی یا اسهال خفیف مانع انجام به موقع واکسیناسیون نیست.

• قبل از ترک مرکز تاریخ واکسیناسیون بعدی را سوال کنید. پس از انجام واکسیناسیون حداقل ۲۰ دقیقه در مرکز واکسیناسیون حضور داشته باشید.

• جهت تسکین درد، بی‌قراری یا تب راهنمایی لازم را از واکسیناتور سوال فرمایید. در صورت تب بالا یا هرگونه عارضه شدید یا غیر معمول به واحد ارائه خدمات بهداشتی درمانی مراجعه فرمایید.

شروع دوازده ماهگی تا پایان پنج سالگی



- شیر مادر را بر طبق میل کودک تا ۲ سالگی ادامه دهید. تا پایان ۱۲ ماهگی ابتدا شیرمادر و سپس غذای کمکی بدهید و پس از آن ابتدا به کودک تان غذا بدهید و سپس او را با شیرمادر تغذیه کنید.
- از «به زور غذا دادن به کودک تان» پرهیز کنید.
- غذاهای متنوع شامل لبنیات، گوشت، میوه و سبزی، غلات و حبوبات بدهید.
- تا ۲ سالگی لبنیات پرچرب و پس از آن لبنیات کم چرب بدهید.
- طی روز آب تمیز و سالم به کودک بدهید.
- سه تا چهار نوبت در روز و هر نوبت تقریباً به اندازه یک لیوان به کودک غذا بدهید. (معده کودک کوچک است و نیاز به دفعات بیشتری برای تغذیه دارد.)
- یک تا دو بار میان وعده مغذی در بین وعده های اصلی غذا به او بدهید.
- قطره ویتامین و آهن را تا پایان ۲ سالگی ادامه دهید.
- زمان غذا خوردن کنار کودک تان باشید.
- غذا را در قطعات کوچک آماده کرده و به کودک بدهید «تا بتواند خودش آن ها را بخورد»
- همیشه پیش از تهیه غذا و قبل از دادن غذا به کودک، دست های خود را با آب و صابون بشوید.
- پیش از دادن غذا به کودک دست و صورت او را بشوید و از ظرف و قاشق تمیز و جداگانه برای کودک استفاده کنید.
- دادن غذاهای آماده و تجارتي به کودک ضرورت ندارد، غذاهای خانگی مناسب هستند. از غذای سفره خانواده به کودک بدهید.
- به کودک تان آب میوه و نوشیدنی های تجارتي ندهید. این ها ارزش غذایی نداشته و به رشد کودک کمک نمی کنند.
- به کودک تان غذاهای غیر سالم مانند چیپس و پفک ندهید.

علائم هشدار دهنده تکامل

<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند با کمک بنشیند. • غان و غون نمی کند (درآوردن صداهایی مانند «ماما»، «بابا»، «دادا») • در هیچ نوع بازی از جمله بازی تعاملی شرکت نمی کند. • با شنیدن اسم خودش، پاسخی نمی دهد. • به نظر نمی رسد افراد آشنا را از غریبه ها تشخیص دهد. • به طرفی که شما اشاره می کنید نگاه نمی کند. • اشیا را دست به دست نمی کند. 	۹ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • به صداهای بلند پاسخ نمی دهد. • اشیای در حال حرکت را با نگاه دنبال نمی کند. • به اشخاص لبخند نمی زند. • دستش را به دهان نمی برد. • وقتی روی شکم خوابیده و او را از زمین بلند می کنیم نمی تواند سرش را بالا بیاورد. • مکیدن یا بلعیدن ضعیف دارد. 	۲ ماهگی
<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند چهار دست و پا برود. • نمی تواند با کمک بایستد. • برای پیدا کردن اشیایی که می بیند شما آن ها را پنهان می کنید تلاش نمی کند. • کلمه کوتاه مثل ماما یا بابا را نمی گوید. • بای بای یا سرسری کردن را یاد نمی گیرد. • به اشیا اشاره نمی کند. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می دهد. 	۱ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند سرش را ثابت نگه دارد. • نمی تواند بغیغو کند یا صداهای دیگری با دهانش تولید کند. • وقتی او را به حالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار دهیم، نمی تواند با پاهایش به سمت پایین فشار وارد کند. • نمی تواند یک یا هر دو چشمش را در همه جهات حرکت دهد. 	۴ ماهگی
<ul style="list-style-type: none"> • با اشاره کردن به سمت اشیا، آن ها را به دیگران نشان نمی دهد. • نمی تواند راه برود. • موارد کاربرد اشیای آشنا را نمی داند. • نمی تواند کارهای دیگران را تقلید کند. • کلمات جدید را یاد نمی گیرد. • نمی تواند حداقل ۶ کلمه بگوید. • وقتی مراقب او را ترک می کند یا پیش او برمی گردد، توجه نمی کند یا اهمیت نمی دهد. • مهارت هایی را که قبلا به دست آورده بود از دست می دهد. 	۱۸ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • تلاش نمی کند که دستش را به اشیایی که در دسترس قرار دارند برساند. • توجهی به مراقب خود نمی کند. • به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی دهد. • به هیچ طرف غلت نمی زند. • نمی خندد یا جیغ نمی کشد. • عضلاتش به نظر خیلی سفت می رسد. • عضلاتش به نظر خیلی شل است (مثل یک عروسک پارچه ای) 	۶ ماهگی

برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند، تا ۲ سالگی سن اصلاح شده آنها محاسبه شود. سن اصلاح شده کودک را از پزشک / مراقب سلامت / بهورز سوال کنید.


علائم هشدار دهنده تکامل

<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند درجا بپرد. • سایر کودکان را نادیده می‌گیرد یا به افرادی غیر از اعضای خانواده ، پاسخ نمی‌دهد. • در مقابل لباس پوشیدن ، خوابیدن یا دستشویی رفتن مقاومت می‌کند. • نمی‌تواند یک داستان مورد علاقه اش را بازگویی کند. • نمی‌تواند از دستورات ۳ مرحله ای پیروی کند. • مفهوم «همان / مشابه» و «متفاوت» را درک نمی‌کند. • از ضمائر من و تو درست استفاده نمی‌کند. • گفتار واضحی ندارد. • مهارت هایی را که قبلا به دست آورده بود از دست می‌دهد. 	۴ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • از عبارت های ۲ کلمه ای استفاده نمی‌کند (مثلا: شیر می‌خورم) • کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک ، تلفن یا قاشق و چنگال را نمی‌داند. • قادر به انجام دستورات ساده نیست. • خودش به تنهایی راه نمی‌رود. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می‌دهد. 	۲ سالگی
<ul style="list-style-type: none"> • نمی‌تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد. • رفتارهای افراطی از خود نشان می‌دهد مثل حالت‌های غیرمعمول ترس، خجالت، افسردگی یا رفتار تهاجمی • معمولا گوشه‌گیر و غیرفعال است. • براحتی حواسش پرت می‌شود و نمی‌تواند بیش از ۵ دقیقه روی یک موضوع تمرکز کند. • به مردم پاسخ نمی‌دهد یا پاسخ سرسری می‌دهد. • قادر به انجام بسیاری از بازی‌ها و فعالیت‌ها نیست. • نمی‌تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید. • نمی‌تواند افعال جمع یا گذشته را درست بکار ببرد. • نمی‌تواند در مورد فعالیت‌های روزانه یا تجاربش صحبت کند. • نمی‌تواند نقاشی بکشد. • نمی‌تواند بدون کمک دندانش را مسواک کند، دست و صورتش را بشوید و خشک کند یا لباس بپوشد. • مهارت‌هایی که قبلا کسب کرده را از دست می‌دهد. 	۵ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • زیاد زمین می‌خورد یا نمی‌تواند از پله استفاده کند. • آبریزش دهان دارد یا گفتارش خیلی نامفهوم است. • نمی‌تواند با اسباب بازی‌های ساده مانند جورچین ساده بازی کند. • نمی‌تواند جمله بگوید. • بازی تخیلی نمی‌کند یا آن‌ها را باور می‌کند. • نمی‌خواهد با سایر کودکان یا اسباب بازی‌ها بازی کند. • تماس چشمی برقرار نمی‌کند. • مهارت‌هایی را که قبلا کسب کرده از دست می‌دهد. 	۳ سالگی

توصیه های ارتقای تکامل کودک


تولد تا یک هفته	۱ هفته تا ۶ ماه	۶ ماه تا ۹ ماه	۹ ماه تا ۱۲ ماه	۱۲ ماه تا ۲ سال	۲ سال و بزرگتر
<p>کودک شما از زمان تولد در حال یادگیری است</p>  <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)</p>	 <p>بازی: وسایل خانگی تمیز و بی خطری را به کودک خود بدهید تا دستکاری کند، به هم بزند و بیاندازد (مانند ظروف درب دار، قابلمه و قاشق فلزی)</p>	 <p>بازی: اسباب بازی مورد علاقه کودک را زیر پارچه یا جعبه پنهان کنید. ببینید آیا می تواند آن را پیدا کند. با کودک خود دالی موشه بازی کنید.</p>	 <p>بازی: چیزهایی به کودک بدهید تا روی هم بچیند و داخل ظرف بیاندازد و در بیاورد. نمونه اسباب بازی: اشیایی که داخل هم یا روی هم می گذارند، ظرف و گیره های لباس.</p>	 <p>بازی: به کودک کمک کنید تا اشیای را بشمارد، نام و مقایسه کند. برای او اسباب بازی های ساده بسازید. مثلاً اشیایی با رنگ ها و شکل های متفاوت برای دسته بندی، بر چسب یا تخته وایت برد و پازل.</p>	
 <p>ارتباط برقرار کنید: به چشمان کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید. زمان تغذیه با شیر مادر فرصت خوبی است. حتی یک نوزاد هم صورت شما را می بیند و صداپتان را می شنود.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به کودک خود لبخند بزنید و بخندید. با او صحبت کنید. با تقلید صدا یا زست کودکان با او مکالمه کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به صدا و علائق کودک خود پاسخ دهید. نام کودک را صدا کنید و پاسخ او را ببینید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: نام اشیای و افراد را به کودک بگویید. به او یاد بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بگوید. نمونه اسباب بازی: عروسکی با صورت</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: سوالات ساده از کودک بپرسید. به تلاش های کودک خود در صحبت کردن جواب بدهید. اشیای، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهید و درباره آن ها با او صحبت کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: او را تشویق کنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهید. به کودکان داستان، آواز و بازی یاد بدهید. در مورد تصاویر یا کتاب ها با او صحبت کنید. نمونه اسباب بازی: کتاب شکل دار</p>
<p>به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به او نشان دهید. از علائق کودک خود مطلع شوید و به آن ها پاسخ دهید. تلاش کودکان را در یادگیری مهارت های جدید تحسین کنید.</p>					

نمودار قد و دوزیم شیرخواران از بد متولد شده دختر




سن به هفته از اولین روز گرفتن قاعدگی

INTERMENSTRUAL



نمودار دور سر برای سن از تولد تا ۲ سالگی (z-score) دختر

دور سر (سانتی متر)




برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند تا ۱۸ ماهگی سن اصلاح شده محاسبه شود.

نمودار وزن برای قد از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) دختر




نمودار قد برای سن از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) دختر



نمودار وزن برای سن دختر از تولد تا ۵ سالگی (z-score)

وزن (کیلوگرم)



برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند تا ۲۴ ماهگی سن اصلاح شده محاسبه شود.



پایش مراقبت کودک پسر*

در هر مراجعه به واحد بهداشتی درمانی / مطب / مرکز غربالگری کارت مراقبت کودک را به همراه داشته باشید.



نام و نام خانوادگی کودک:

تاریخ تولد: روز..... ماه..... سال.....

کد ملی کودک:

کد ملی سرپرست کودک:

مشخصات زمان تولد: وزن..... قد..... دور سر.....

هفته بارداری هنگام زایمان:

تلفن تماس:

تاریخ مراجعه بعدی: روز..... ماه..... سال.....

- غربالگری پس از تولد، روز سوم تا پنجم انجام می شود و تکرار آن در ۲، ۴ و ۶ هفتهگی پس از تولد انجام می شود.
- در صورت ترخیص، نوزادان تا رسیدن به وزن ۲۰۰۰ گرم، هفتهگی مراقبت شوند و پس از آن در ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ ماهگی و سپس در ۲، ۲/۵، ۳، ۴ و ۵ سالگی برای مراقبت کودک مراجعه کنید.
- در سنین ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی برای واکسیناسیون کودک خود مراجعه کنید.

- شیرمادر هیچ جایگزینی ندارد. تا پایان ۶ ماهگی کودکان را فقط با شیرمادر تغذیه کنید و پس از آن مطابق توصیه های تغذیه ای، غذای کمکی را شروع کرده و شیرمادر را تا دو سالگی ادامه دهید.
- به علائم هشدار دهنده تکامل کودک در سنین مختلف توجه کنید.
- به توصیه های مراقبت از تکامل کودک عمل کنید.
- پرسشنامه غربالگری تکامل ASQ را در سنین اصلاح شده ۲، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴، ۳۶، ۴۸ و ۶۰ ماهگی کودکان از پزشک / مراقب سلامت / بهورز دریافت کنید. بعد از تمرین مناسب با کودکان طبق بروشورهای دریافتی، به سوالات پرسشنامه به دقت پاسخ دهید و سپس تحویل دهید.
- سن اصلاح شده کودک را از پزشک / مراقب سلامت / بهورز سوال کنید.
- مکان نگهداری نوزاد در منزل کم نور، دنج و بدون سرو صدا باشد.
- از کارهای پرسرو صدا بر بالین نوزاد خودداری نمایید.
- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد باعث دلبستگی مادرانه، افزایش قابل توجه شیرمادر، کاهش اضطراب مادر، افزایش رشد شناختی شیرخوار، تنظیم دمای بدن، تنفس و ضربان قلب نوزاد، ارتباط متقابل مادر و شیرخوار و در نهایت سرعت رشد جسمی، ارتقای تکامل و شکوفایی استعداد های بالقوه شیرخوار می شود.

غربالگری های کودک

نام یا مهر غربالگر	نیازمند ارجاع	نتیجه غربالگری	تاریخ انجام غربالگری	آزمون غربالگر
				هیپوتیروئیدی
				فنیل کتونوری
				شنوایی
				بینایی
				معاینه چشم (رتینوپاتی نوزادی / ROP)

۶۰ ماهگی	۴۸ ماهگی	۳۶ ماهگی	۲۴ ماهگی	۱۸ ماهگی	۱۲ ماهگی	۹ ماهگی	۶ ماهگی	۲ ماهگی	پرسشنامه ASQ
									نمره حیطه ارتباط
									نمره حیطه حرکات درشت
									نمره حیطه حرکات ظریف
									نمره حیطه حل مسئله
									نمره حیطه شخصی- اجتماعی
									وجود نگرانی در قسمت کلیات
									نمره ASQ:SE
									کودک نیازمند ارجاع

با واکسیناسیون به موقع، سلامت کودک خود را تضمین کنید.

جدول راهنمای واکسیناسیون

سن	نوع واکسن	سن	نوع واکسن
بدو تولد	MMR	۱۲ ماهگی	ب ب ث ژ* - فلج اطفال خوراکی - هیپاتیت ب
۲ ماهگی	سه گانه - فلج اطفال خوراکی - MMR	۱۸ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج گانه**
۴ ماهگی	سه گانه - فلج اطفال خوراکی	۶ سالگی**	فلج اطفال خوراکی - پنج گانه - فلج اطفال تزریقی
۶ ماهگی			فلج اطفال خوراکی - پنج گانه - فلج اطفال تزریقی

توضیحات: * پس از رسیدن وزن شیرخوار به ۱۵۰۰ گرم واکسن ب ب ث ژ تلقیح شود. ** واکسن پنج گانه شامل دیفتیری، کزاز، سیاه سرفه، هیپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ ب می باشد. *** پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان باید تزریق شود. توصیه می شود برای شیرخواران و خانواده آن ها که در فصول سرد سال به ۶ ماهگی رسیدند واکسن آنفلوآنزا تزریق شود.

جدول تقویم واکسیناسیون

نوع واکسن	تاریخ مراجعه	سریال واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	نوع واکسن	تاریخ مراجعه	سریال واکسن	نام یا مهر واکسیناتور
ب ب ث ژ (BCG) فلج اطفال خوراکی (OPV)	بدو تولد			بار اول	پنج گانه (DTP-Hep-B-Hib)		
	بدو تولد			بار دوم			
	بار اول			بار سوم			
	بار دوم			بار اول	سه گانه (DTP/DT)		
	بار سوم			بار دوم			
	یادآور ۱			بار اول	سرخچه، اوتیون (MMR)		
یادآور ۲			بار دوم				
فلج اطفال تزریقی (IPV)	بار اول			بدو تولد	هیپاتیت ب (Hep-B)		
	بار دوم						

• سرماخوردگی یا اسهال خفیف مانع انجام به موقع واکسیناسیون نیست.

• قبل از ترک مرکز تاریخ واکسیناسیون بعدی را سوال کنید. پس از انجام واکسیناسیون حداقل ۳۰ دقیقه در مرکز واکسیناسیون حضور داشته باشید.

• جهت تسکین درد، بی قراری یا تب راهنمایی لازم را از واکسیناتور سوال فرمایید. در صورت تب بالا یا هرگونه عارضه شدید یا غیر معمول به واحد ارائه خدمات بهداشتی درمانی مراجعه فرمایید.

تولید ۱۰ پاهای شش ماهگی

تغذیه استاندارد با شیر مادر
بررسی وضعیت دندانها و بهداشت
شیر مادر ۱۲ تا ۱۸ بار در شبانه روز



شیر مادر
۱۲ تا ۱۸ بار
در شبانه روز



مکمل های
توصیه شده
تولید پروتک
۱ قطره آ-آ
۱ قطره بی-۱۲
۱ قطره آهن
۱ قطره ویتامین C

- تغذیه با شیر مادر برای تقویت سیستم ایمنی، رشد و تکامل شیرخوار تان بسیار اهمیت دارد.
- شیر مادر به تنهایی تا پایان ماه ششم زندگی برای تغذیه شیرخوار کافی است. تا ۳ سالگی ادامه دهید.
- از ۶ ماهگی تا پایان یک سالگی ابتدا کودک تان را با شیر مادر تغذیه کنید و سپس به او غذا بدهید.
- تغذیه تکمیلی را از یک نوع ماده غذایی به مقدار ۱ تا ۲ قاشق مرباخوری ۴ بار در روز شروع کنید و سپس این مقدار را به نصف ایوان برسانید.
- امشاهده کردن هر ماده غذایی جدیدی را طی ۵ روز انجام دهید.

شروع غذاه هفت ماهگی تا پایان ماه یکساله

شروع غذاه هفت ماهگی تا پایان ماه ششم: شیر مادر، غذای کمکی که تا ۲۱ ماهگی مصرف می شود و به اندازه یک برنج در روز
شیر مادر و غذاهای آن افزایش پیدا می کند. تا ۱۰ ماهگی و بعد غذای
شروع غذاه هفت ماهگی تا پایان ماه هفتم: شیر مادر، غذای کمکی ۲ تا ۳ وعده در هر وعده نصف ایوان ۱۲ تا ۱۸ ماهگی
قبل از آن به یاد نشود. غذاهای انگشتی، غذاهای با قطعات کوچک که به کودکان بدهد. از دانه های غذاهای کوچک سفت یا خنجر خشکی
برای هر کودک ۱ تا ۱۰ میان وعده



قطره آهن
یا مولتی ویتامین
قطره آ-آ



آب جوشیده
سرد شده
خمیران
یا مایع غلیظ تکمیلی



فرنی آرد برنج



۲ قاشق مرباخوری
هر قاشق ۵ سی سی



۱ قاشق مرباخوری
هر قاشق ۵ سی سی



۱ قاشق مرباخوری
هر قاشق ۵ سی سی



شیر پاستوریزه پرچرب
۲۰ سی سی



پوره انواع سبزی



انواع کدو



هویج



سبب زمینی



نخود فرنگی



۱ قاشق مرباخوری
شیر پاستوریزه
۵ قاشق غذاخوری

زرد و
سفید تخم مرغ
پخته و سفت شده



سوپ
۱ قاشق غذاخوری



حوانات رعمس، ماهی و... انواع جوانه ها
تغذیه کنند. رشته فرنگی، جودوسر و...



سبزی ها مانند هویج، جعفری، شوید،
گشنیز، کرفس و انواع کدوها
لوتیا سبز و...



گوشت فریز گوشت گوسفند و...
یا گوشت سفید مرغ یا ماهی و...
خوب پخته و نرم شده



روغن مایع یا کره
۱ قاشق مرباخوری
۵ سی سی



انواع کنه



برنج



گوشت فریز یا سفید



انواع
ماکارونی



وعده ها
پوره میوه های رسیده و نرم



عاست پاستوریزه
پرچرب



پوره سبب زمینی



نان و
شیر پاستوریزه
کم نمک



انواع فرنی و شیربرنج



خرماکی پوست
گرفته شده

شروع دوازده ماهگی تا پایان پنج سالگی



- شیرمادر را بر طبق میل کودک تا ۲ سالگی ادامه دهید. تا پایان ۱۲ ماهگی ابتدا شیرمادر و سپس غذای کمکی بدهید و پس از آن ابتدا به کودک تان غذا بدهید و سپس او را با شیرمادر تغذیه کنید.
- از «به زور غذا دادن به کودک تان» پرهیز کنید.
- غذاهای متنوع شامل لبنیات، گوشت، میوه و سبزی، غلات و حبوبات بدهید.
- تا ۲ سالگی لبنیات پر چرب و پس از آن لبنیات کم چرب بدهید.
- طی روز آب تمیز و سالم به کودک بدهید.
- سه تا چهار نوبت در روز و هر نوبت تقریباً به اندازه یک لیوان به کودک غذا بدهید. (معدة کودک کوچک است و نیاز به دفعات بیشتری برای تغذیه دارد.)
- یک تا دو بار میان وعده مغذی در بین وعده های اصلی غذا به او بدهید.
- قطره ویتامین و آهن را تا پایان ۲ سالگی ادامه دهید.
- زمان غذا خوردن کنار کودک تان باشید.
- غذا را در قطعات کوچک آماده کرده و به کودک بدهید «تا بتواند خودش آن ها را بخورد»
- همیشه پیش از تهیه غذا و قبل از دادن غذا به کودک، دست های خود را با آب و صابون بشویید.
- پیش از دادن غذا به کودک دست و صورت او را بشویید و از ظرف و قاشق تمیز و جداگانه برای کودک استفاده کنید.
- دادن غذاهای آماده و تجارتي به کودک ضرورت ندارد، غذاهای خانگی مناسب هستند. از غذای سفره خانواده به کودک بدهید.
- به کودک تان آب میوه و نوشیدنی های تجارتي ندهید. این ها ارزش غذایی نداشته و به رشد کودک کمک نمی کنند.
- به کودک تان غذاهای غیر سالم مانند چیپس و پفک ندهید.

علائم هشدار دهنده تکامل

<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند با کمک بنشیند. • غان و غون نمی کند (درآوردن صداهایی مانند «ماما»، «بابا»، «دادا») • در هیچ نوع بازی از جمله بازی تعاملی شرکت نمی کند. • با شنیدن اسم خودش، پاسخی نمی دهد. • به نظر نمی رسد افراد آشنا را از غریبه ها تشخیص دهد. • به طرفی که شما اشاره می کنید نگاه نمی کند. • اشیا را دست به دست نمی کند. 	۹ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • به صداهای بلند پاسخ نمی دهد. • اشیای در حال حرکت را با نگاه دنبال نمی کند. • به اشخاص لبخند نمی زند. • دستش را به دهان نمی برد. • وقتی روی شکم خوابیده او را از زمین بلند می کنیم نمی تواند سرش را بالا بیاورد. • مکیدن یا بلعیدن ضعیف دارد. 	۲ ماهگی
<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند چهار دست و پا برود. • نمی تواند با کمک بایستد. • برای پیدا کردن اشیایی که می بیند شما آن ها را پنهان می کنید تلاش نمی کند. • کلمه کوتاه مثل ماما یا بابا را نمی گوید. • بای بای یا سرسری کردن را یاد نمی گیرد. • به اشیا اشاره نمی کند. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می دهد. 	۱ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند سرش را ثابت نگه دارد. • نمی تواند بغیغو کند یا صداهای دیگری با دهانش تولید کند. • وقتی او را به حالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار دهیم، نمی تواند با پاهایش به سمت پایین فشار وارد کند. • نمی تواند یک یا هر دو چشمش را در همه جهات حرکت دهد. 	۴ ماهگی
<ul style="list-style-type: none"> • با اشاره کردن به سمت اشیا، آن ها را به دیگران نشان نمی دهد. • نمی تواند راه برود. • موارد کاربرد اشیای آشنا را نمی داند. • نمی تواند کارهای دیگران را تقلید کند. • کلمات جدید را یاد نمی گیرد. • نمی تواند حداقل ۶ کلمه بگوید. • وقتی مراقب او را ترک می کند یا پیش او برمی گردد، توجه نمی کند یا اهمیت نمی دهد. • مهارت هایی را که قبلا به دست آورده بود از دست می دهد. 	۱۸ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • تلاش نمی کند که دستش را به اشیایی که در دسترس قرار دارند برساند. • توجهی به مراقب خود نمی کند. • به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی دهد. • به هیچ طرف غلت نمی زند. • نمی خندد یا جیغ نمی کشد. • عضلاتش به نظر خیلی سفت می رسد. • عضلاتش به نظر خیلی شل است (مثل یک عروسک پارچه ای) 	۶ ماهگی


برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند، تا ۲ سالگی سن اصلاح شده آنها محاسبه شود. سن اصلاح شده کودک را از پزشک / مراقب سلامت / بهورز سوال کنید.


علائم هشدار دهنده تکامل

<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند درجا بپرد. • سایر کودکان را نادیده می‌گیرد یا به افرادی غیر از اعضای خانواده ، پاسخ نمی دهد. • در مقابل لباس پوشیدن ، خوابیدن یا دستشویی رفتن مقاومت می‌کند. • نمی تواند یک داستان مورد علاقه اش را بازگویی کند. • نمی تواند از دستورات ۳ مرحله‌ای پیروی کند. • مفهوم «همان / مشابه» و «متفاوت» را درک نمی‌کند. • از ضمائر من و تو درست استفاده نمی‌کند. • گفتار واضحی ندارد. • مهارت هایی را که قبلا به دست آورده بود از دست می دهد. 	۴ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • از عبارت های ۲ کلمه ای استفاده نمی‌کند (مثلا: شیر می خورم) • کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک ، تلفن یا قاشق و چنگال را نمی داند. • قادر به انجام دستورات ساده نیست. • خودش به تنهایی راه نمی رود. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می دهد. 	۲ سالگی
<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد. • رفتارهای افراطی از خود نشان می دهد مثل حالت های غیرمعمول ترس ، خجالت ، افسردگی یا رفتار تهاجمی • معمولا گوشه‌گیر و غیرفعال است. • براحتی حواسش پرت می شود و نمی تواند بیش از ۵ دقیقه روی یک موضوع تمرکز کند. • به مردم پاسخ نمی دهد یا پاسخ سرسری می دهد. • قادر به انجام بسیاری از بازی ها و فعالیت ها نیست. • نمی تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید. • نمی تواند افعال جمع یا گذشته را درست بکار ببرد. • نمی تواند در مورد فعالیت های روزانه یا تجاربش صحبت کند. • نمی تواند نقاشی بکشد. • نمی تواند بدون کمک دندانش را مسواک کند، دست و صورتش را بشوید و خشک کند یا لباس بپوشد. • مهارت هایی که قبلا کسب کرده را از دست می دهد. 	۵ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • زیاد زمین می خورد یا نمی تواند از پله استفاده کند. • آبریزش دهان دارد یا گفتارش خیلی نامفهوم است. • نمی تواند با اسباب بازی های ساده مانند جورچین ساده بازی کند. • نمی تواند جمله بگوید. • بازی تخیلی نمی کند یا آن ها را باور می‌کند. • نمی خواهد با سایر کودکان یا اسباب بازی ها بازی کند. • تماس چشمی برقرار نمی‌کند. • مهارت هایی را که قبلا کسب کرده از دست می دهد. 	۳ سالگی

توصیه های ارتقای تکامل کودک


تولد تا یک هفته	۱ هفته تا ۶ ماه	۶ ماه تا ۹ ماه	۹ ماه تا ۱۲ ماه	۱۲ ماه تا ۲ سال	۲ سال و بزرگتر
<p>کودک شما از زمان تولد در حال یادگیری است</p>  <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)</p>	 <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)</p>	 <p>بازی: وسایل خانگی تمیز و بی خطری را به کودک خود بدهید تا دستکاری کند، به هم بزند و بیاندازد (مانند ظروف درب دار، قابلمه و قاشق فلزی)</p>	 <p>بازی: چیزهایی به کودک بدهید تا روی هم بچینند و در داخل ظرف بیاندازد و در بیاورد.</p> <p>بازی: اسباب بازی مورد علاقه کودک را زیر پارچه یا جعبه پنهان کنید. ببینید آیا می تواند آن را پیدا کند. با کودک خود دالی موشه بازی کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: اسباب بازی مورد علاقه کودک را به او بدهید. به او یاد بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بگوید. نمونه اسباب بازی: عروسکی با صورت</p>	 <p>بازی: به کودک کمک کنید تا اشیای را بشمارد، نام برد و مقایسه کند. برای او اسباب بازی های ساده بسازید. مثلاً اشیایی با رنگ ها و شکل های متفاوت برای دسته بندی، برچسب یا تخته وایت برد و پازل.</p>
 <p>ارتباط برقرار کنید: به چشمان کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید. زمان تغذیه با شیر مادر فرصت خوبی است. حتی یک نوزاد هم صورت شما را می بیند و صداپتان را می شنود.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به کودک خود لبخند بزنید و بخندید. با او صحبت کنید. با تقلید صدا یا زست کودکان با او مکالمه کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به صدا و علائق کودک خود پاسخ دهید. نام کودک را صدا کنید و پاسخ او را ببینید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: نام اشیای و افراد را به کودک بگویید. به او یاد بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بگوید. نمونه اسباب بازی: عروسکی با صورت</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: سوالات ساده از کودک بپرسید. به تلاش های کودک خود در صحبت کردن جواب بدهید. اشیای، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهید و درباره آن ها با او صحبت کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: او را تشویق کنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهید. به کودکان داستان، آواز و بازی یاد بدهید. در مورد تصاویر یا کتاب ها با او صحبت کنید. نمونه اسباب بازی: کتاب شکل دار</p>
<p>به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به او نشان دهید. از علائق کودک خود مطلع شوید و به آن ها پاسخ دهید. تلاش کودکان را در یادگیری مهارت های جدید تحسین کنید.</p>					





نمودار دور سر برای سن از تولد تا ۲ سالگی (Z-score) پسر


دور سر (سانتی متر)



سن (ماه)


برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند تا ۱۸ ماهگی سن اصلاح شده محاسبه شود.

نمودار وزن برای قد از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) پسر



نمودار قد برای سن از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) پر

قد (سانتی متر)



سن (ماه)

نمودار وزن برای سن پسر از تولد تا ۵ سالگی (z-score)



برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند تا ۲۴ ماهگی سن اصلاح شده محاسبه شود.